

Tableau 4. Prévalences et évolutions de l'adoption systématique de la mesure "rester confiné à la maison le plus possible" selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (% ; données pondérées). Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2021

| Adoption systématique de la mesure "Rester confiné à la maison le plus possible" | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Période de recueil des données | Période de confinement 1 | | Postconfinement 1 | | Période de confinement 2 | | | Postconfinement 2 | | Période de confinement 3 | |
| | 30 mars-1 ^{er} avril | 4-6 mai | 13-15 mai | 19-21 oct. | 4-6 nov. | 23-25 nov. | 14-16 déc. | 18-20 janv. | 15-17 févr. | 21-23 avril. | 17-19 mai. |
| Numéro de vague d'enquête | V2 | V6 | V7 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V23 | V24 |
| Nombre de personnes interrogées | 2003 | 2000 | 2000 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 |
| Profils sociodémographiques | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Ensemble | 81,0 | 75,0 | 65,1 | 25,2 | 56,2 | 56,2 | 44,9 | 41,8 | 39,2 | 41,6 | 36,6 |
| Sexe | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | ** | *** | * |
| Homme | 76,1 | 68,8 | 58,5 | 22,8 | 52,2 | 50,7 | 39,6 | 37,3 | 35,5 | 37,3 | 34,6 |
| Femme | 85,4 | 80,7 | 71,1 | 27,4 | 59,7 | 61,1 | 49,6 | 45,9 | 42,7 | 45,6 | 38,4 |
| Age | ** | | | | * | | | | *** | | |
| De 18 à 24 ans | 80,6 | 80,5 | 72,0 | 26,3 | 59,0 | 55,9 | 52,1 | 43,4 | 30,8 | 38,1 | 31,2 |
| De 25 à 34 ans | 78,7 | 76,1 | 66,2 | 24,9 | 57,8 | 57,2 | 44,7 | 44,5 | 31,8 | 40,1 | 32,2 |
| De 35 à 49 ans | 79,9 | 73,5 | 64,1 | 28,4 | 51,2 | 58,2 | 45,0 | 39,7 | 43,0 | 45,2 | 38,4 |
| De 50 à 64 ans | 78,2 | 72,5 | 61,8 | 21,8 | 54,7 | 53,3 | 42,9 | 39,5 | 37,4 | 41,0 | 37,8 |
| 65 ans et plus | 86,7 | 76,3 | 66,2 | 25,0 | 60,7 | 56,4 | 43,9 | 44,1 | 45,5 | 40,9 | 38,4 |
| CSP en 2 classes (avec retraités et chômeurs recodés) | | | | | * | | | | | | |
| CSP + | 80,5 | 73,6 | 63,7 | 23,8 | 54,0 | 54,0 | 45,7 | 39,8 | 38,3 | 38,5 | 37,1 |
| CSP - | 78,5 | 75,3 | 64,0 | 25,5 | 54,9 | 55,3 | 40,1 | 41,7 | 38,5 | 42,2 | 34,6 |
| Situation professionnelle | *** | * | *** | * | *** | *** | *** | * | *** | *** | * |
| Travail | 75,6 | 72,2 | 61,5 | 24,2 | 51,6 | 54,2 | 40,9 | 39,2 | 34,9 | 38,0 | 34,9 |
| Etudes | 91,3 | 82,8 | 73,1 | 22,6 | 68,7 | 67,0 | 57,3 | 47,5 | 32,5 | 35,6 | 31,9 |
| Chômage | 82,8 | 80,0 | 73,2 | 33,3 | 55,5 | 52,5 | 51,4 | 51,3 | 38,6 | 55,1 | 40,4 |
| Retraite | 87,1 | 77,1 | 66,4 | 23,1 | 59,2 | 55,5 | 45,5 | 41,3 | 45,0 | 41,4 | 36,9 |
| Inactif | 91,0 | 79,1 | 75,1 | 34,2 | 71,4 | 71,1 | 58,2 | 49,7 | 54,5 | 60,6 | 48,1 |
| Situation financière perçue | | | *** | * | * | | | ** | *** | *** | * |
| Bonne situation financière | 81,2 | 75,3 | 64,8 | 22,6 | 53,5 | 54,7 | 43,5 | 41,5 | 39,4 | 38,4 | 34,0 |
| Situation financière juste | 80,2 | 77,9 | 62,6 | 24,4 | 60,1 | 56,7 | 47,7 | 37,3 | 38,7 | 41,6 | 38,5 |
| Situation financière très difficile | 81,6 | 77,6 | 70,2 | 32,9 | 56,9 | 59,0 | 44,8 | 48,7 | 39,7 | 51,4 | 41,8 |
| Littératie en santé (évaluation de l'information en santé) ¹ | *** | *** | ** | * | ** | | * | * | ** | ** | * |
| Faible (< médiane) | 77,9 | 73,1 | 61,7 | 23,4 | 51,9 | 54,0 | 41,9 | 38,2 | 37,8 | 38,2 | 32,8 |
| Bonne (≥ médiane) | 83,3 | 76,7 | 68,4 | 27,1 | 60,1 | 57,9 | 47,6 | 44,7 | 40,7 | 44,8 | 40,2 |
| Vit seul | ** | | ** | | *** | | | | | | |
| Non | 81,8 | 75,6 | 65,6 | 25,1 | 55,2 | 56,1 | 44,4 | 41,5 | 38,9 | 41,3 | 36,8 |
| Oui | 78,2 | 73,1 | 63,6 | 25,6 | 59,5 | 56,6 | 46,7 | 42,8 | 40,6 | 42,9 | 36,0 |
| Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins | | | * | | * | | | | | | |
| Non | 80,8 | 75,7 | 65,5 | 24,0 | 57,9 | 55,4 | 44,4 | 40,8 | 39,3 | 41,6 | 35,9 |
| Oui | 81,5 | 73,5 | 64,3 | 28,1 | 51,9 | 57,8 | 45,9 | 44,4 | 39,0 | 41,7 | 38,4 |
| Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19 ² | | | ** | * | * | | * | ** | ** | ** | * |
| Non | -- | -- | 65,2 | 22,7 | 54,4 | 54,6 | 42,5 | 41,1 | 36,9 | 39,9 | 35,3 |
| Oui | -- | -- | 65,0 | 29,5 | 59,3 | 59,1 | 49,2 | 43,1 | 43,5 | 45,0 | 39,1 |
| Antécédents de trouble psychologique | | | ** | | * | | | ** | ** | ** | * |
| Non | 80,8 | 74,9 | 65,1 | 24,3 | 54,9 | 55,5 | 45,1 | 40,9 | 37,3 | 41,7 | 36,7 |
| Oui | 81,8 | 75,8 | 65,3 | 29,3 | 62,2 | 59,7 | 43,7 | 45,3 | 47,3 | 41,3 | 36,2 |
| Conditions de vie liées à l'épidémie | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Condition de travail (population active) | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | * | * | * | ** |
| En télétravail | 83,4 | 77,5 | 73,7 | 31,9 | 64,9 | 65,2 | 58,3 | 49,3 | 44,4 | 46,5 | 48,2 |
| En entreprise | 57,6 | 62,5 | 53,3 | 22,5 | 46,2 | 50,7 | 35,8 | 36,7 | 33,0 | 35,8 | 32,2 |
| Au chômage partiel | 81,2 | 78,6 | 68,5 | 50,6 | 67,9 | 68,4 | 60,8 | 38,6 | 45,3 | 32,7 | 28,6 |
| En arrêt de travail | 90,1 | 81,7 | 75,2 | 32,5 | 71,3 | 59,2 | 55,4 | 47,0 | 38,8 | 50,3 | 40,6 |
| Logement avec forte promiscuité | | | * | | * | | | * | * | * | * |
| Non | 81,2 | 75,2 | 64,9 | 24,9 | 56,5 | 55,9 | 44,3 | 41,7 | 39,4 | 40,7 | 35,7 |
| Oui | 78,1 | 72,7 | 67,9 | 28,8 | 52,2 | 59,2 | 50,8 | 43,8 | 37,9 | 52,2 | 46,1 |
| Avoir un soutien moral ou affectif | ** | * | * | | * | | *** | * | * | * | * |
| Non | 77,7 | 74,2 | 62,7 | 24,2 | 54,5 | 53,6 | 41,5 | 39,4 | 39,5 | 40,1 | 36,6 |
| Oui | 83,3 | 75,7 | 67,8 | 26,6 | 57,6 | 58,7 | 49,3 | 43,9 | 39,0 | 43,2 | 36,6 |
| Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19 | | | * | | * | | | * | * | * | * |
| Non | 80,5 | 75,1 | 64,8 | 24,9 | -- | 55,7 | 44,7 | 41,6 | 38,8 | 36,5 | 33,8 |
| Oui | 83,4 | 74,8 | 67,0 | 26,7 | -- | 57,8 | 45,5 | 42,6 | 39,3 | 43,0 | 37,3 |
| Anxiété ³ | | | ** | *** | | | | * | * | * | * |
| Pas d'anxiété | 82,6 | 75,2 | 62,6 | 21,9 | 55,0 | 55,2 | 44,1 | 40,5 | 38,0 | 40,5 | 34,6 |
| Anxiété probable | 77,4 | 72,5 | 68,1 | 28,4 | 58,1 | 56,7 | 43,1 | 40,9 | 36,2 | 40,6 | 37,3 |
| Anxiété certaine | 80,5 | 77,0 | 70,7 | 33,2 | 57,4 | 58,7 | 48,9 | 46,9 | 45,1 | 45,4 | 41,7 |
| Dépression ³ | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | * | * | * | * |
| Pas de dépression | 82,6 | 74,1 | 63,6 | 22,5 | 56,1 | 56,2 | 44,1 | 43,2 | 37,4 | 39,8 | 34,3 |
| Dépression probable | 77,1 | 76,1 | 68,5 | 28,2 | 52,3 | 50,5 | 42,7 | 36,1 | 38,9 | 42,3 | 34,8 |
| Dépression certaine | 80,8 | 76,5 | 68,0 | 33,1 | 60,6 | 61,9 | 49,6 | 45,1 | 44,0 | 45,1 | 45,8 |

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%). Les pourcentages en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les pourcentages en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.

Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques et liées aux conditions de vie pendant l'épidémie (colonne de gauche) et l'adoption systématique de la mesure "rester confiné à la maison le plus possible" pour chacune des vagues : *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ La littératie en santé désigne la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information pour prendre des décisions concernant leur santé (échelle Health Literacy Questionnaire)

² Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphysème ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30).

³ HAD : Hospital Anxiety and Depression scale.

Lecture du tableau :

Ex. : La proportion de personnes dans une situation financière très difficile adoptant systématiquement la mesure "rester confiné à la maison le plus possible" présente une évolution défavorable entre la vague 6 (77,6%) et la vague 7 (70,2%). En revanche, elle présente une évolution favorable entre vague 16 (32,9%) et vague 17 (56,9%).