

Tableau 6. Déterminants cognitifs et affectifs associés à l'anxiété, la dépression, aux problèmes de sommeil et aux pensées suicidaires (associations ; données pondérées)
 Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021



	Anxiété (score > 10 sur l'échelle HAD ¹)								Dépression (score > 10 sur l'échelle HAD ¹)								Problèmes de sommeil (au cours des 8 derniers jours)								Pensées suicidaires (au cours des 12 derniers mois)			
	Période de recueil des données		2020		2021		2021		2020		2021		2021		2020		2021		2021		2020		2021		2021			
	nov-2020	nov-2020	janv-2021	fév-2021	mars-2021	avr-2021	mai-2021	juin-2021	nov-2020	nov-2020	janv-2021	fév-2021	mars-2021	avr-2021	mai-2021	nov-2020	nov-2020	janv-2021	fév-2021	mars-2021	avr-2021	mai-2021	fév-2021	mars-2021	avr-2021	mai-2021		
	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V21	V22	V23	V24			
Nombre de personnes interrogées	2000	2000	2000	2000	2001	2001	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2001	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2001	2000	2000	2001	2001	2000			
Déterminants cognitifs																												
Mesures de prévention perçues comme peu efficaces	***	***						***	**						---	***												
Mesures de prévention perçues comme contraignantes	***	***						***	***						---	---												
Moindre approbation et adoption des mesures de prévention par les proches (norme sociale perçue)	---	---						**	---						---	---												
Se sentir peu capable d'adopter les mesures de prévention	---	**						---	*						---	---												
Percevoir la COVID-19 comme grave	***	***						*	---						---	---												
Se sentir vulnérable au risque d'infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2)	**	***						*	***						*	*												
Déterminants affectifs																												
Inquiétude à l'égard de la santé	***	***	***	***	***	***	***	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Inquiétude à l'égard de la situation économique	**	*	*	*	---	*	---	*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Frustration	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Colère	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Déprime	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Solitude	---	---	---	*	**	**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Isolément	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Peur	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Impuissance	**	***	---	---	---	---	*	**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Notes : Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).
 - Pour chaque vague, l'association entre le facteur cognitif et les indicateurs (anxiété, dépression, sommeil) est testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique, et des autres facteurs cognitifs (modèles de régression logistique, test de Wald au seuil de .05). ***, p<0,001 ; **, p<0,01 ; *, p<0,05 ; -, association non significative (p>0,05).
 - Pour chaque vague, l'association entre le facteur affectif et les indicateurs (anxiété, dépression, sommeil, pensées suicidaires) est testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique, et des autres facteurs affectifs (modèles de régression logistique, test de Wald au seuil de .05). ***, p<0,001 ; **, p<0,01 ; *, p<0,05 ; -, association non significative (p>0,05).
¹HAD : Hospital Anxiety and Depression scale.
 Ø déterminant affectif non introduit dans le modèle d'analyse.

Lecture du tableau :
 Ex. : En vague 17, l'inquiétude à l'égard de la situation économique était significativement associée aux problèmes de sommeil (p < 0,01), après ajustement sur toutes les autres variables (sociodémographiques, liées à la situation épidémique et affectives).