


ENTRED

Échantillon National Témoin
Représentatif des personnes Diabétiques



Résultats détaillés du questionnaire médecin Par type de diabète et traitement

Réalisé par :

Isabelle ROMON

Sandrine FOSSE

Anne FAGOT-CAMPAGNA

Pour le comité scientifique ENTRED

Date de mise à jour : 1^{er} Août 2005

Pour commentaires : entred@invs.sante.fr

Entret - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

1. Prévalence des complications macrovasculaires

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
Angor (symptomatique ou non)	Manquant	(4) 0.2%	[0.0-0.5]			(4) 0.3%	[0.0-0.5]	(4) 1.3%	[0.0-2.5]
	Non	(1468) 85.4%	[83.8-87.1]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1316) 84.7%	[83.0-86.5]	(242) 75.6%	[70.9-80.3]
	Oui	(246) 14.3%	[12.7-16.0]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(233) 15.0%	[13.2-16.8]	(74) 23.1%	[18.5-27.7]
Infarctus	Manquant	(22) 1.3%	[0.7-1.8]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(20) 1.3%	[0.7-1.8]	(7) 2.2%	[0.6-3.8]
	Non	(1568) 91.3%	[89.9-92.6]	(115) 96.6%	[93.4-99.9]	(1411) 90.9%	[89.4-92.3]	(279) 87.2%	[83.5-90.8]
	Oui	(128) 7.5%	[6.2-8.7]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(122) 7.9%	[6.5-9.2]	(34) 10.6%	[7.2-14.0]
Revascularisation coronaire	Manquant	(38) 2.2%	[1.5-2.9]			(37) 2.4%	[1.6-3.1]	(12) 3.8%	[1.7-5.8]
	Non	(1577) 91.8%	[90.5-93.1]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1423) 91.6%	[90.3-93.0]	(279) 87.2%	[83.5-90.8]
	Oui	(103) 6.0%	[4.9-7.1]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(93) 6.0%	[4.8-7.2]	(29) 9.1%	[5.9-12.2]
Infarctus ou angor	Manquant	(18) 1.0%	[0.6-1.5]			(17) 1.1%	[0.6-1.6]	(7) 2.2%	[0.6-3.8]
	Non	(1425) 82.9%	[81.2-84.7]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1274) 82.0%	[80.1-83.9]	(233) 72.8%	[67.9-77.7]
	Oui	(275) 16.0%	[14.3-17.7]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(262) 16.9%	[15.0-18.7]	(80) 25.0%	[20.3-29.7]
Infarctus, angor ou revascularisation coronaire	Manquant	(27) 1.6%	[1.0-2.2]			(26) 1.7%	[1.0-2.3]	(9) 2.8%	[1.0-4.6]
	Non	(1409) 82.0%	[80.2-83.8]	(110) 92.4%	[87.7-97.2]	(1259) 81.1%	[79.1-83.0]	(228) 71.3%	[66.3-76.2]
	Oui	(282) 16.4%	[14.7-18.2]	(9) 7.6%	[2.8-12.3]	(268) 17.3%	[15.4-19.1]	(83) 25.9%	[21.1-30.7]
Accident vasculaire cérébral	Manquant	(32) 1.9%	[1.2-2.5]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(30) 1.9%	[1.2-2.6]	(9) 2.8%	[1.0-4.6]
	Non	(1607) 93.5%	[92.4-94.7]	(115) 96.6%	[93.4-99.9]	(1447) 93.2%	[91.9-94.4]	(290) 90.6%	[87.4-93.8]
	Oui	(79) 4.6%	[3.6-5.6]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(76) 4.9%	[3.8-6.0]	(21) 6.6%	[3.8-9.3]
Artériopathie des membres inférieurs (ulcère artériel, claudication, pontage/angioplastie aortique ou des membres inférieurs)	Manquant	(233) 13.6%	[11.9-15.2]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(220) 14.2%	[12.4-15.9]	(47) 14.7%	[10.8-18.6]
	Non	(1381) 80.4%	[78.5-82.3]	(105) 88.2%	[82.4-94.0]	(1238) 79.7%	[77.7-81.7]	(247) 77.2%	[72.6-81.8]
	Oui	(104) 6.1%	[4.9-7.2]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(95) 6.1%	[4.9-7.3]	(26) 8.1%	[5.1-11.1]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

1. Prévalence des complications macrovasculaires

	ENSEMBLE N = 1718	TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Au moins une complication macrovasculaire	Manquant	(212) 12.3%	[10.8-13.9]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(198) 12.7%	[11.1-14.4]
	Non	(1122) 65.3%	[63.1-67.6]	(96) 80.7%	[73.6-87.8]	(994) 64.0%	[61.6-66.4]
	Oui	(384) 22.4%	[20.4-24.3]	(15) 12.6%	[6.6-18.6]	(361) 23.2%	[21.1-25.3]
						(37) 11.6%	[8.1-15.1]
						(176) 55.0%	[49.5-60.5]
						(107) 33.4%	[28.3-38.6]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

2. Prévalence des complications microvasculaires

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Mal perforant plantaire	Manquant	(125) 7.3%	[6.0-8.5]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(116) 7.5%	[6.2-8.8]	(20) 6.3%	[3.6-8.9]
	Non	(1568) 91.3%	[89.9-92.6]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1418) 91.3%	[89.9-92.7]	(290) 90.6%	[87.4-93.8]
	Oui	(25) 1.5%	[0.9-2.0]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(19) 1.2%	[0.7-1.8]	(10) 3.1%	[1.2-5.0]
Amputation des membres inférieurs	Manquant	(48) 2.8%	[2.0-3.6]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(46) 3.0%	[2.1-3.8]	(12) 3.8%	[1.7-5.8]
	Non	(1652) 96.2%	[95.2-97.1]	(117) 98.3%	[96.0-100.0]	(1493) 96.1%	[95.2-97.1]	(300) 93.8%	[91.1-96.4]
	Oui	(18) 1.0%	[0.6-1.5]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(14) 0.9%	[0.4-1.4]	(8) 2.5%	[0.8-4.2]
Au moins une complication neurologique	Manquant	(162) 9.4%	[8.0-10.8]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(152) 9.8%	[8.3-11.3]	(27) 8.4%	[5.4-11.5]
	Non	(1520) 88.5%	[87.0-90.0]	(110) 92.4%	[87.7-97.2]	(1372) 88.3%	[86.7-89.9]	(278) 86.9%	[83.2-90.6]
	Oui	(36) 2.1%	[1.4-2.8]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(29) 1.9%	[1.2-2.5]	(15) 4.7%	[2.4-7.0]
Niveau de lésion podologique (sans prise en compte des déformations en grade 2)	Manquant	(814) 47.4%	[45.0-49.7]	(33) 27.7%	[19.7-35.8]	(768) 49.5%	[47.0-51.9]	(128) 40.0%	[34.6-45.4]
	Grade 0	(725) 42.2%	[39.9-44.5]	(68) 57.1%	[48.3-66.0]	(635) 40.9%	[38.4-43.3]	(130) 40.6%	[35.2-46.0]
	Grade 1	(112) 6.5%	[5.4-7.7]	(13) 10.9%	[5.3-16.5]	(94) 6.1%	[4.9-7.2]	(34) 10.6%	[7.2-14.0]
	Grade 2	(21) 1.2%	[0.7-1.7]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(18) 1.2%	[0.6-1.7]	(10) 3.1%	[1.2-5.0]
	Grade 3	(46) 2.7%	[1.9-3.4]	(4) 3.4%	[0.1-6.6]	(38) 2.4%	[1.7-3.2]	(18) 5.6%	[3.1-8.1]
Niveau de lésion podologique (prise en compte des déformations en grade 2)	Manquant	(812) 47.3%	[44.9-49.6]	(34) 28.6%	[20.5-36.7]	(765) 49.3%	[46.8-51.7]	(127) 39.7%	[34.3-45.0]
	Grade 0	(725) 42.2%	[39.9-44.5]	(68) 57.1%	[48.3-66.0]	(635) 40.9%	[38.4-43.3]	(130) 40.6%	[35.2-46.0]
	Grade 1	(75) 4.4%	[3.4-5.3]	(11) 9.2%	[4.0-14.4]	(63) 4.1%	[3.1-5.0]	(19) 5.9%	[3.3-8.5]
	Grade 2	(60) 3.5%	[2.6-4.4]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(52) 3.3%	[2.5-4.2]	(26) 8.1%	[5.1-11.1]
	Grade 3	(46) 2.7%	[1.9-3.4]	(4) 3.4%	[0.1-6.6]	(38) 2.4%	[1.7-3.2]	(18) 5.6%	[3.1-8.1]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

2. Prévalence des complications microvasculaires

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinsés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
Rétinopathie diabétique	Manquant	(555) 32.3%	[30.1-34.5]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(525) 33.8%	[31.5-36.2]	(83) 25.9%	[21.1-30.7]
	Non	(993) 57.8%	[55.5-60.1]	(68) 57.1%	[48.3-66.0]	(900) 58.0%	[55.5-60.4]	(165) 51.6%	[46.1-57.0]
	Oui	(170) 9.9%	[8.5-11.3]	(33) 27.7%	[19.7-35.8]	(128) 8.2%	[6.9-9.6]	(72) 22.5%	[17.9-27.1]
Cécité	Manquant	(49) 2.9%	[2.1-3.6]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(47) 3.0%	[2.2-3.9]	(11) 3.4%	[1.4-5.4]
	Non	(1645) 95.8%	[94.8-96.7]	(115) 96.6%	[93.4-99.9]	(1486) 95.7%	[94.7-96.7]	(299) 93.4%	[90.7-96.2]
	Oui	(24) 1.4%	[0.8-2.0]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(20) 1.3%	[0.7-1.8]	(10) 3.1%	[1.2-5.0]
Photocoagulation (laser)	Manquant	(532) 31.0%	[28.8-33.2]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(502) 32.3%	[30.0-34.7]	(81) 25.3%	[20.5-30.1]
	Non	(1108) 64.5%	[62.2-66.8]	(80) 67.2%	[58.8-75.7]	(999) 64.3%	[61.9-66.7]	(210) 65.6%	[60.4-70.8]
	Oui	(78) 4.5%	[3.6-5.5]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(52) 3.3%	[2.5-4.2]	(29) 9.1%	[5.9-12.2]
Au moins une complication ophthalmologique	Manquant	(607) 35.3%	[33.1-37.6]	(17) 14.3%	[8.0-20.6]	(576) 37.1%	[34.7-39.5]	(92) 28.8%	[23.8-33.7]
	Non	(913) 53.1%	[50.8-55.5]	(66) 55.5%	[46.5-64.4]	(825) 53.1%	[50.6-55.6]	(151) 47.2%	[41.7-52.7]
	Oui	(198) 11.5%	[10.0-13.0]	(36) 30.3%	[22.0-38.5]	(152) 9.8%	[8.3-11.3]	(77) 24.1%	[19.4-28.7]
Dialyse ou greffe rénale	Manquant	(46) 2.7%	[1.9-3.4]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(44) 2.8%	[2.0-3.7]	(12) 3.8%	[1.7-5.8]
	Non	(1664) 96.9%	[96.0-97.7]	(115) 96.6%	[93.4-99.9]	(1506) 97.0%	[96.1-97.8]	(305) 95.3%	[93.0-97.6]
	Oui	(8) 0.5%	[0.1-0.8]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(3) 0.2%	[0.0-0.4]	(3) 0.9%	[0.0-2.0]
Insuffisance rénale (DFG<60 ml/min/1.73m ²)	Manquant	(155) 9.0%	[7.7-10.4]	(14) 11.8%	[6.0-17.6]	(136) 8.8%	[7.4-10.2]	(26) 8.1%	[5.1-11.1]
	Non	(1264) 73.6%	[71.5-75.7]	(96) 80.7%	[73.6-87.8]	(1131) 72.8%	[70.6-75.0]	(213) 66.6%	[61.4-71.7]
	Oui	(299) 17.4%	[15.6-19.2]	(9) 7.6%	[2.8-12.3]	(286) 18.4%	[16.5-20.3]	(81) 25.3%	[20.5-30.1]
Microalbuminurie ou protéinurie	Manquant	(717) 41.7%	[39.4-44.1]	(29) 24.4%	[16.7-32.1]	(670) 43.1%	[40.7-45.6]	(114) 35.6%	[30.4-40.9]
	Non	(801) 46.6%	[44.3-49.0]	(71) 59.7%	[50.8-68.5]	(710) 45.7%	[43.2-48.2]	(145) 45.3%	[39.9-50.8]
	Oui	(200) 11.6%	[10.1-13.2]	(19) 16.0%	[9.4-22.5]	(173) 11.1%	[9.6-12.7]	(61) 19.1%	[14.8-23.4]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

2. Prévalence des complications microvasculaires

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Au moins une complication rénale	Manquant	(625) 36.4%	[34.1-38.7]	(30) 25.2%	[17.4-33.0]	(578) 37.2%	[34.8-39.6]	(82) 25.6%	[20.8-30.4]
	Non	(634) 36.9%	[34.6-39.2]	(66) 55.5%	[46.5-64.4]	(552) 35.5%	[33.2-37.9]	(110) 34.4%	[29.2-39.6]
	Oui	(459) 26.7%	[24.6-28.8]	(23) 19.3%	[12.2-26.4]	(423) 27.2%	[25.0-29.5]	(128) 40.0%	[34.6-45.4]
Au moins une complication microvasculaire (neurologique, ophtalmologique, rénale)	Manquant	(752) 43.8%	[41.4-46.1]	(31) 26.1%	[18.2-33.9]	(702) 45.2%	[42.7-47.7]	(84) 26.3%	[21.4-31.1]
	Non	(392) 22.8%	[20.8-24.8]	(38) 31.9%	[23.6-40.3]	(343) 22.1%	[20.0-24.1]	(68) 21.3%	[16.8-25.7]
	Oui	(574) 33.4%	[31.2-35.6]	(50) 42.0%	[33.1-50.9]	(508) 32.7%	[30.4-35.0]	(168) 52.5%	[47.0-58.0]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie I. Variables synthétiques

3. Prévalence des complications

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Au moins une complication micro ou macrovasculaire	Manquant	(629) 36.6%	[34.3-38.9]	(29) 24.4%	[16.7-32.1]	(582) 37.5%	[35.1-39.9]	(62) 19.4%	[15.0-23.7]
	Non	(303) 17.6%	[15.8-19.4]	(34) 28.6%	[20.5-36.7]	(262) 16.9%	[15.0-18.7]	(50) 15.6%	[11.6-19.6]
	Oui	(786) 45.8%	[43.4-48.1]	(56) 47.1%	[38.1-56.0]	(709) 45.7%	[43.2-48.1]	(208) 65.0%	[59.8-70.2]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

1. Description générale

	ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Age du patient	63.4*	[62.9 - 64.0]	43.5*	[41.1 - 45.9]	65.1*	[64.6 - 65.7]	67.4*	[66.2 - 68.5]
Sexe du patient	Femme	(770) 44.8%	[42.5-47.2]	(58) 48.7%	[39.8-57.7]	(694) 44.7%	[42.2-47.2]	(164) 51.3% [45.8-56.7]
	Homme	(948) 55.2%	[52.8-57.5]	(61) 51.3%	[42.3-60.2]	(859) 55.3%	[52.8-57.8]	(156) 48.8% [43.3-54.2]
Éducation aux complications faite	Non	4.2%	[3.2-5.2]	1.8%	[0.0-4.2]	4.5%	[3.4-5.6]	2.4% [0.6-4.1]
	Oui	95.8%	[94.8-96.8]	98.2%	[95.8-100.0]	95.5%	[94.4-96.6]	97.6% [95.9-99.4]
Diététique hypocalorique prescrite	Non	9.9%	[8.4-11.3]	39.3%	[30.2-48.3]	7.4%	[6.1-8.8]	9.4% [6.1-12.7]
	Oui	90.1%	[88.7-91.6]	60.7%	[51.7-69.8]	92.6%	[91.2-93.9]	90.6% [87.3-93.9]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

2. Complication majeures

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
Infarctus du myocarde	Manquant	(22)	1.3%	[0.7-1.8]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(20)	1.3%
	Oui en 2001	(14)	0.8%	[0.4-1.2]				(14)	0.9%
	Oui ancien	(114)	6.6%	[5.5-7.8]	(3)	2.5%	[0.0-5.3]	(108)	7.0%
	Non	(1568)	91.3%	[89.9-92.6]	(115)	96.6%	[93.4-99.9]	(1411)	90.9%
Accident vasculaire cérébral	Manquant	(32)	1.9%	[1.2-2.5]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(30)	1.9%
	Oui en 2001	(21)	1.2%	[0.7-1.7]				(21)	1.4%
	Oui ancien	(58)	3.4%	[2.5-4.2]	(3)	2.5%	[0.0-5.3]	(55)	3.5%
	Non	(1607)	93.5%	[92.4-94.7]	(115)	96.6%	[93.4-99.9]	(1447)	93.2%
Insuffisance coronaire	Manquant	(38)	2.2%	[1.5-2.9]				(37)	2.4%
	Oui en 2001	(56)	3.3%	[2.4-4.1]	(2)	1.7%	[0.0-4.0]	(53)	3.4%
	Oui ancien	(174)	10.1%	[8.7-11.6]	(6)	5.0%	[1.1-9.0]	(164)	10.6%
	Non	(1450)	84.4%	[82.7-86.1]	(111)	93.3%	[88.8-97.8]	(1299)	83.6%
Revascularisation coronaire	Manquant	(38)	2.2%	[1.5-2.9]				(37)	2.4%
	Oui en 2001	(24)	1.4%	[0.8-2.0]	(2)	1.7%	[0.0-4.0]	(22)	1.4%
	Oui ancien	(79)	4.6%	[3.6-5.6]	(6)	5.0%	[1.1-9.0]	(71)	4.6%
	Non	(1577)	91.8%	[90.5-93.1]	(111)	93.3%	[88.8-97.8]	(1423)	91.6%
Cécité	Manquant	(49)	2.9%	[2.1-3.6]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(47)	3.0%
	Oui en 2001	(6)	0.3%	[0.1-0.6]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(5)	0.3%
	Oui ancien	(18)	1.0%	[0.6-1.5]	(2)	1.7%	[0.0-4.0]	(15)	1.0%
	Non	(1645)	95.8%	[94.8-96.7]	(115)	96.6%	[93.4-99.9]	(1486)	95.7%
								[94.7-96.7]	[299)
								93.4%	[90.7-96.2]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement
Partie II. Items du questionnaire médecin
2. Complication majeures

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718		N = 119		N = 1553		N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Dialyse ou greffe rénale	Manquant	(46) 2.7%	[1.9-3.4]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(44) 2.8%	[2.0-3.7]	(12) 3.8%	[1.7-5.8]
	Oui en 2001	(2) 0.1%	[0.0-0.3]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(1) 0.1%	[0.0-0.2]	(1) 0.3%	[0.0-0.9]
	Oui ancien	(6) 0.3%	[0.1-0.6]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(2) 0.1%	[0.0-0.3]	(2) 0.6%	[0.0-1.5]
	Non	(1664) 96.9%	[96.0-97.7]	(115) 96.6%	[93.4-99.9]	(1506) 97.0%	[96.1-97.8]	(305) 95.3%	[93.0-97.6]
Amputation au dessus de la cheville	Manquant	(48) 2.8%	[2.0-3.6]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(46) 3.0%	[2.1-3.8]	(13) 4.1%	[1.9-6.2]
	Oui en 2001	(1) 0.1%	[0.0-0.2]			(1) 0.1%	[0.0-0.2]	(1) 0.3%	[0.0-0.9]
	Oui ancien	(7) 0.4%	[0.1-0.7]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(6) 0.4%	[0.1-0.7]	(2) 0.6%	[0.0-1.5]
	Non	(1662) 96.7%	[95.9-97.6]	(117) 98.3%	[96.0-100.0]	(1500) 96.6%	[95.7-97.5]	(304) 95.0%	[92.6-97.4]
Amputation en dessous de la cheville	Manquant	(52) 3.0%	[2.2-3.8]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(49) 3.2%	[2.3-4.0]	(14) 4.4%	[2.1-6.6]
	Oui en 2001	(3) 0.2%	[0.0-0.4]			(3) 0.2%	[0.0-0.4]	(1) 0.3%	[0.0-0.9]
	Oui ancien	(7) 0.4%	[0.1-0.7]			(4) 0.3%	[0.0-0.5]	(4) 1.3%	[0.0-2.5]
	Non	(1656) 96.4%	[95.5-97.3]	(117) 98.3%	[96.0-100.0]	(1497) 96.4%	[95.5-97.3]	(301) 94.1%	[91.5-96.7]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

3. Valeurs de mesures les plus récentes en 2001

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
BMI en classes (kg/m ²)	Manquant	(176) 10.2%	[8.8-11.7]	(11) 9.2%	[4.0-14.4]	(158) 10.2%	[8.7-11.7]	(33) 10.3%	[7.0-13.6]
	Normal <25	(375) 21.8%	[19.9-23.8]	(64) 53.8%	[44.8-62.7]	(297) 19.1%	[17.2-21.1]	(77) 24.1%	[19.4-28.7]
	Surpoids 25-29	(609) 35.4%	[33.2-37.7]	(32) 26.9%	[18.9-34.9]	(564) 36.3%	[33.9-38.7]	(95) 29.7%	[24.7-34.7]
	Obèse ≥30	(558) 32.5%	[30.3-34.7]	(12) 10.1%	[4.7-15.5]	(534) 34.4%	[32.0-36.7]	(115) 35.9%	[30.7-41.2]
Pression artérielle (mmHg)	Manquant	(65) 3.8%	[2.9-4.7]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(58) 3.7%	[2.8-4.7]	(13) 4.1%	[1.9-6.2]
	<130/80	(161) 9.4%	[8.0-10.7]	(37) 31.1%	[22.8-39.4]	(117) 7.5%	[6.2-8.8]	(28) 8.8%	[5.7-11.8]
	[130/80-140/90[(617) 35.9%	[33.6-38.2]	(49) 41.2%	[32.3-50.0]	(551) 35.5%	[33.1-37.9]	(102) 31.9%	[26.8-37.0]
	[140/90-160/95[(743) 43.2%	[40.9-45.6]	(23) 19.3%	[12.2-26.4]	(704) 45.3%	[42.9-47.8]	(149) 46.6%	[41.1-52.0]
	≥160/95	(132) 7.7%	[6.4-8.9]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(123) 7.9%	[6.6-9.3]	(28) 8.8%	[5.7-11.8]
PA≥140/80 mmHg	Manquant	(65) 3.8%	[2.9-4.7]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(58) 3.7%	[2.8-4.7]	(13) 4.1%	[1.9-6.2]
	Non	(1155) 67.2%	[65.0-69.4]	(89) 74.8%	[67.0-82.6]	(1032) 66.5%	[64.1-68.8]	(220) 68.8%	[63.7-73.8]
	Oui	(498) 29.0%	[26.8-31.1]	(25) 21.0%	[13.7-28.3]	(463) 29.8%	[27.5-32.1]	(87) 27.2%	[22.3-32.1]
HbA1c (%)	Manquant	(136) 7.9%	[6.6-9.2]	(4) 3.4%	[0.1-6.6]	(127) 8.2%	[6.8-9.5]	(18) 5.6%	[3.1-8.1]
	< 6,5	(377) 21.9%	[20.0-23.9]	(11) 9.2%	[4.0-14.4]	(361) 23.2%	[21.1-25.3]	(26) 8.1%	[5.1-11.1]
	[6,5-7[(281) 16.4%	[14.6-18.1]	(8) 6.7%	[2.2-11.2]	(264) 17.0%	[15.1-18.9]	(38) 11.9%	[8.3-15.4]
	[7-8[(452) 26.3%	[24.2-28.4]	(46) 38.7%	[29.9-47.4]	(394) 25.4%	[23.2-27.5]	(83) 25.9%	[21.1-30.7]
	[8-10[(378) 22.0%	[20.0-24.0]	(43) 36.1%	[27.5-44.8]	(324) 20.9%	[18.8-22.9]	(120) 37.5%	[32.2-42.8]
	≥10	(94) 5.5%	[4.4-6.5]	(7) 5.9%	[1.7-10.1]	(83) 5.3%	[4.2-6.5]	(35) 10.9%	[7.5-14.4]
	Créatininémie (mg/l)	9.9*	[9.7 - 10.1]	9.6*	[8.7 - 10.6]	9.9*	[9.7 - 10.1]	10.8*	[10.1 - 11.4]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

3. Valeurs de mesures les plus récentes en 2001

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
DFG – MDRD (ml/min/1.73m ²)	Manquant	(155)	9.0%	[7.7-10.4]	(14)	11.8%	[6.0-17.6]	(136)	8.8%
	≥ 90	(417)	24.3%	[22.2-26.3]	(51)	42.9%	[34.0-51.7]	(350)	22.5%
	[60-90[(847)	49.3%	[46.9-51.7]	(45)	37.8%	[29.1-46.5]	(781)	50.3%
	[30-60[(280)	16.3%	[14.6-18.0]	(7)	5.9%	[1.7-10.1]	(270)	17.4%
	[15-30[(13)	0.8%	[0.3-1.2]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(12)	0.8%
	<15	(6)	0.3%	[0.1-0.6]	(1)	0.8%	[0.0-2.5]	(4)	0.3%
Albuminurie	Manquant	(717)	41.7%	[39.4-44.1]	(29)	24.4%	[16.7-32.1]	(670)	43.1%
	Normale (<30 mg/24h)	(801)	46.6%	[44.3-49.0]	(71)	59.7%	[50.8-68.5]	(710)	45.7%
	Micro (30-300 mg/24h)	(160)	9.3%	[7.9-10.7]	(15)	12.6%	[6.6-18.6]	(138)	8.9%
	Protéinurie (≥300 mg/24h)	(40)	2.3%	[1.6-3.0]	(4)	3.4%	[0.1-6.6]	(35)	2.3%
HDL (g/l)	Manquant	(635)	37.0%	[34.7-39.2]	(37)	31.1%	[22.8-39.4]	(579)	37.3%
	<0,35	(82)	4.8%	[3.8-5.8]	(2)	1.7%	[0.0-4.0]	(76)	4.9%
	[0,35-0,4[(104)	6.1%	[4.9-7.2]	(5)	4.2%	[0.6-7.8]	(97)	6.2%
	[0,4-0,45[(155)	9.0%	[7.7-10.4]	(5)	4.2%	[0.6-7.8]	(144)	9.3%
	≥0,45	(742)	43.2%	[40.8-45.5]	(70)	58.8%	[50.0-67.7]	(657)	42.3%
LDL (g/l)	Manquant	(671)	39.1%	[36.7-41.4]	(38)	31.9%	[23.6-40.3]	(610)	39.3%
	<1	(232)	13.5%	[11.9-15.1]	(24)	20.2%	[13.0-27.4]	(200)	12.9%
	[1-1,3[(380)	22.1%	[20.2-24.1]	(36)	30.3%	[22.0-38.5]	(338)	21.8%
	[1,3-1,6[(295)	17.2%	[15.4-19.0]	(12)	10.1%	[4.7-15.5]	(276)	17.8%
	≥1,6	(140)	8.1%	[6.9-9.4]	(9)	7.6%	[2.8-12.3]	(129)	8.3%

Entered - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

3. Valeurs de mesures les plus récentes en 2001

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718		N = 119		N = 1553		N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Triglycérides (g/l)	Manquant	(251) 14.6%	[12.9-16.3]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(229) 14.7%	[13.0-16.5]	(58) 18.1%	[13.9-22.3]
	<1	(413) 24.0%	[22.0-26.1]	(59) 49.6%	[40.6-58.6]	(335) 21.6%	[19.5-23.6]	(78) 24.4%	[19.7-29.1]
	[1-1,5[(452) 26.3%	[24.2-28.4]	(27) 22.7%	[15.2-30.2]	(415) 26.7%	[24.5-28.9]	(80) 25.0%	[20.3-29.7]
	[1,5-2[(302) 17.6%	[15.8-19.4]	(12) 10.1%	[4.7-15.5]	(287) 18.5%	[16.5-20.4]	(40) 12.5%	[8.9-16.1]
	[2-2,5[(124) 7.2%	[6.0-8.4]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(120) 7.7%	[6.4-9.1]	(24) 7.5%	[4.6-10.4]
	≥2,5	(176) 10.2%	[8.8-11.7]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(167) 10.8%	[9.2-12.3]	(40) 12.5%	[8.9-16.1]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

4. Facteurs de risque

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
Hypertrophie ventriculaire gauche (Sokolov)	Manquant	(326) 19.0%	[17.1-20.8]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(295) 19.0%	[17.0-20.9]	(56) 17.5%	[13.3-21.7]
	Non	(1258) 73.2%	[71.1-75.3]	(98) 82.4%	[75.5-89.2]	(1126) 72.5%	[70.3-74.7]	(221) 69.1%	[64.0-74.1]
	Oui	(134) 7.8%	[6.5-9.1]			(132) 8.5%	[7.1-9.9]	(43) 13.4%	[9.7-17.2]
Maladie cardiovasculaire avant 65 ans chez les parents au 1er degré	Manquant	(625) 36.4%	[34.1-38.7]	(27) 22.7%	[15.2-30.2]	(582) 37.5%	[35.1-39.9]	(133) 41.6%	[36.2-47.0]
	Non	(889) 51.7%	[49.4-54.1]	(85) 71.4%	[63.3-79.5]	(778) 50.1%	[47.6-52.6]	(151) 47.2%	[41.7-52.7]
	Oui	(204) 11.9%	[10.3-13.4]	(7) 5.9%	[1.7-10.1]	(193) 12.4%	[10.8-14.1]	(36) 11.3%	[7.8-14.7]
Diabète chez les parents au 1er degré	Manquant	(581) 33.8%	[31.6-36.1]	(16) 13.4%	[7.3-19.6]	(557) 35.9%	[33.5-38.3]	(118) 36.9%	[31.6-42.2]
	Non	(756) 44.0%	[41.7-46.4]	(85) 71.4%	[63.3-79.5]	(641) 41.3%	[38.8-43.7]	(121) 37.8%	[32.5-43.1]
	Oui	(381) 22.2%	[20.2-24.1]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(355) 22.9%	[20.8-24.9]	(81) 25.3%	[20.5-30.1]
Tabac	Manquant	(111) 6.5%	[5.3-7.6]	(11) 9.2%	[4.0-14.4]	(99) 6.4%	[5.2-7.6]	(24) 7.5%	[4.6-10.4]
	Non	(1399) 81.4%	[79.6-83.3]	(86) 72.3%	[64.2-80.3]	(1280) 82.4%	[80.5-84.3]	(262) 81.9%	[77.7-86.1]
	Oui	(208) 12.1%	[10.6-13.6]	(22) 18.5%	[11.5-25.5]	(174) 11.2%	[9.6-12.8]	(34) 10.6%	[7.2-14.0]
Alcool	Manquant	(203) 11.8%	[10.3-13.3]	(16) 13.4%	[7.3-19.6]	(184) 11.8%	[10.2-13.5]	(35) 10.9%	[7.5-14.4]
	Non	(1184) 68.9%	[66.7-71.1]	(93) 78.2%	[70.7-85.6]	(1060) 68.3%	[65.9-70.6]	(242) 75.6%	[70.9-80.3]
	Oui	(331) 19.3%	[17.4-21.1]	(10) 8.4%	[3.4-13.4]	(309) 19.9%	[17.9-21.9]	(43) 13.4%	[9.7-17.2]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

5. Symptômes en 2001

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Angor	Manquant	(48) 2.8%	[2.0-3.6]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(44) 2.8%	[2.0-3.7]	(15) 4.7%	[2.4-7.0]
	Non	(1553) 90.4%	[89.0-91.8]	(114) 95.8%	[92.2-99.4]	(1395) 89.8%	[88.3-91.3]	(274) 85.6%	[81.8-89.5]
	Oui	(117) 6.8%	[5.6-8.0]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(114) 7.3%	[6.0-8.6]	(31) 9.7%	[6.4-12.9]
Claudication	Manquant	(52) 3.0%	[2.2-3.8]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(50) 3.2%	[2.3-4.1]	(19) 5.9%	[3.3-8.5]
	Non	(1581) 92.0%	[90.7-93.3]	(112) 94.1%	[89.9-98.3]	(1426) 91.8%	[90.5-93.2]	(280) 87.5%	[83.9-91.1]
	Oui	(85) 4.9%	[3.9-6.0]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(77) 5.0%	[3.9-6.0]	(21) 6.6%	[3.8-9.3]
Hypotension orthostatique	Manquant	(69) 4.0%	[3.1-4.9]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(59) 3.8%	[2.8-4.7]	(14) 4.4%	[2.1-6.6]
	Non	(1612) 93.8%	[92.7-95.0]	(107) 89.9%	[84.5-95.3]	(1464) 94.3%	[93.1-95.4]	(297) 92.8%	[90.0-95.6]
	Oui	(37) 2.2%	[1.5-2.8]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(30) 1.9%	[1.2-2.6]	(9) 2.8%	[1.0-4.6]
Douleurs ou paresthésies des membres inférieurs	Manquant	(81) 4.7%	[3.7-5.7]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(75) 4.8%	[3.8-5.9]	(18) 5.6%	[3.1-8.1]
	Non	(1359) 79.1%	[77.2-81.0]	(102) 85.7%	[79.4-92.0]	(1222) 78.7%	[76.6-80.7]	(215) 67.2%	[62.0-72.3]
	Oui	(278) 16.2%	[14.4-17.9]	(12) 10.1%	[4.7-15.5]	(256) 16.5%	[14.6-18.3]	(87) 27.2%	[22.3-32.1]
Si hommes, dysérection	Manquant	(367) 38.7%	[35.6-41.8]	(18) 29.5%	[18.1-41.0]	(338) 39.3%	[36.1-42.6]	(75) 48.1%	[40.2-55.9]
	Non	(379) 40.0%	[36.9-43.1]	(35) 57.4%	[45.0-69.8]	(333) 38.8%	[35.5-42.0]	(37) 23.7%	[17.0-30.4]
	Oui	(202) 21.3%	[18.7-23.9]	(8) 13.1%	[4.6-21.6]	(188) 21.9%	[19.1-24.7]	(44) 28.2%	[21.1-35.3]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

6. Examen des yeux en 2001

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Examen des yeux en 2001	Manquant	(82) 4.8%	[3.8-5.8]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(74) 4.8%	[3.7-5.8]	(18) 5.6%	[3.1-8.1]
	Non	(514) 29.9%	[27.8-32.1]	(19) 16.0%	[9.4-22.5]	(484) 31.2%	[28.9-33.5]	(56) 17.5%	[13.3-21.7]
	Oui	(1122) 65.3%	[63.1-67.6]	(95) 79.8%	[72.6-87.0]	(995) 64.1%	[61.7-66.5]	(246) 76.9%	[72.3-81.5]
Compte-rendu transmis	Manquant	(476) 27.7%	[25.6-29.8]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(447) 28.8%	[26.5-31.0]	(70) 21.9%	[17.3-26.4]
	Non	(660) 38.4%	[36.1-40.7]	(31) 26.1%	[18.2-33.9]	(611) 39.3%	[36.9-41.8]	(121) 37.8%	[32.5-43.1]
	Oui	(582) 33.9%	[31.6-36.1]	(67) 56.3%	[47.4-65.2]	(495) 31.9%	[29.6-34.2]	(129) 40.3%	[34.9-45.7]
Photocoagulation	Manquant	(532) 31.0%	[28.8-33.2]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(502) 32.3%	[30.0-34.7]	(81) 25.3%	[20.5-30.1]
	Non	(1108) 64.5%	[62.2-66.8]	(80) 67.2%	[58.8-75.7]	(999) 64.3%	[61.9-66.7]	(210) 65.6%	[60.4-70.8]
	Oui	(78) 4.5%	[3.6-5.5]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(52) 3.3%	[2.5-4.2]	(29) 9.1%	[5.9-12.2]
Vitrectomie	Manquant	(543) 31.6%	[29.4-33.8]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(510) 32.8%	[30.5-35.2]	(84) 26.3%	[21.4-31.1]
	Non	(1161) 67.6%	[65.4-69.8]	(93) 78.2%	[70.7-85.6]	(1034) 66.6%	[64.2-68.9]	(232) 72.5%	[67.6-77.4]
	Oui	(14) 0.8%	[0.4-1.2]	(5) 4.2%	[0.6-7.8]	(9) 0.6%	[0.2-1.0]	(4) 1.3%	[0.0-2.5]
Cataracte	Manquant	(552) 32.1%	[29.9-34.3]	(21) 17.6%	[10.8-24.5]	(521) 33.5%	[31.2-35.9]	(89) 27.8%	[22.9-32.7]
	Non	(1007) 58.6%	[56.3-60.9]	(89) 74.8%	[67.0-82.6]	(887) 57.1%	[54.7-59.6]	(184) 57.5%	[52.1-62.9]
	Oui	(159) 9.3%	[7.9-10.6]	(9) 7.6%	[2.8-12.3]	(145) 9.3%	[7.9-10.8]	(47) 14.7%	[10.8-18.6]
Rétinopathie diabétique	Manquant	(555) 32.3%	[30.1-34.5]	(18) 15.1%	[8.7-21.6]	(525) 33.8%	[31.5-36.2]	(83) 25.9%	[21.1-30.7]
	Non	(993) 57.8%	[55.5-60.1]	(68) 57.1%	[48.3-66.0]	(900) 58.0%	[55.5-60.4]	(165) 51.6%	[46.1-57.0]
	Oui	(170) 9.9%	[8.5-11.3]	(33) 27.7%	[19.7-35.8]	(128) 8.2%	[6.9-9.6]	(72) 22.5%	[17.9-27.1]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

7. Examen des pieds en 2001

		ENSEMBLE N = 1718		TYPE 1 N = 119		TYPE 2 N = 1553		dont TYPE 2 insulinés N = 320	
		(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%	(Effectif) %	IC 95%
Examen des pieds en 2001	Manquant	(73) 4.2%	[3.3-5.2]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(68) 4.4%	[3.4-5.4]	(12) 3.8%	[1.7-5.8]
	Non	(186) 10.8%	[9.4-12.3]	(7) 5.9%	[1.7-10.1]	(174) 11.2%	[9.6-12.8]	(21) 6.6%	[3.8-9.3]
	Oui	(1459) 84.9%	[83.2-86.6]	(110) 92.4%	[87.7-97.2]	(1311) 84.4%	[82.6-86.2]	(287) 89.7%	[86.4-93.0]
Déformation , hyperkératose des pieds	Manquant	(177) 10.3%	[8.9-11.7]	(12) 10.1%	[4.7-15.5]	(162) 10.4%	[8.9-12.0]	(28) 8.8%	[5.7-11.8]
	Non	(1273) 74.1%	[72.0-76.2]	(100) 84.0%	[77.5-90.6]	(1140) 73.4%	[71.2-75.6]	(214) 66.9%	[61.7-72.0]
	Oui	(268) 15.6%	[13.9-17.3]	(7) 5.9%	[1.7-10.1]	(251) 16.2%	[14.3-18.0]	(78) 24.4%	[19.7-29.1]
Mal perforant plantaire cictré en 2001	Manquant	(130) 7.6%	[6.3-8.8]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(121) 7.8%	[6.5-9.1]	(23) 7.2%	[4.4-10.0]
	Non	(1566) 91.2%	[89.8-92.5]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1416) 91.2%	[89.8-92.6]	(290) 90.6%	[87.4-93.8]
	Oui	(22) 1.3%	[0.7-1.8]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(16) 1.0%	[0.5-1.5]	(7) 2.2%	[0.6-3.8]
Mal perforant plantaire aigu en 2001	Manquant	(220) 12.8%	[11.2-14.4]	(10) 8.4%	[3.4-13.4]	(207) 13.3%	[11.6-15.0]	(38) 11.9%	[8.3-15.4]
	Non	(1488) 86.6%	[85.0-88.2]	(108) 90.8%	[85.6-96.0]	(1338) 86.2%	[84.4-87.9]	(277) 86.6%	[82.8-90.3]
	Oui	(10) 0.6%	[0.2-0.9]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(8) 0.5%	[0.2-0.9]	(5) 1.6%	[0.2-2.9]
Ulcère artériel des membres inférieurs cictré en 2001	Manquant	(172) 10.0%	[8.6-11.4]	(7) 5.9%	[1.7-10.1]	(161) 10.4%	[8.9-11.9]	(27) 8.4%	[5.4-11.5]
	Non	(1538) 89.5%	[88.1-91.0]	(112) 94.1%	[89.9-98.3]	(1385) 89.2%	[87.6-90.7]	(292) 91.3%	[88.2-94.3]
	Oui	(8) 0.5%	[0.1-0.8]			(7) 0.5%	[0.1-0.8]	(1) 0.3%	[0.0-0.9]
Ulcère artériel des membres inférieurs aigu en 2001	Manquant	(259) 15.1%	[13.4-16.8]	(9) 7.6%	[2.8-12.3]	(245) 15.8%	[14.0-17.6]	(40) 12.5%	[8.9-16.1]
	Non	(1450) 84.4%	[82.7-86.1]	(109) 91.6%	[86.6-96.6]	(1300) 83.7%	[81.9-85.5]	(277) 86.6%	[82.8-90.3]
	Oui	(9) 0.5%	[0.2-0.9]	(1) 0.8%	[0.0-2.5]	(8) 0.5%	[0.2-0.9]	(3) 0.9%	[0.0-2.0]
Sensibilité vibratoire au diapason anormale	Manquant	(558) 32.5%	[30.3-34.7]	(24) 20.2%	[13.0-27.4]	(526) 33.9%	[31.5-36.2]	(94) 29.4%	[24.4-34.4]
	Non	(1022) 59.5%	[57.2-61.8]	(80) 67.2%	[58.8-75.7]	(914) 58.9%	[56.4-61.3]	(177) 55.3%	[49.9-60.8]
	Oui	(138) 8.0%	[6.7-9.3]	(15) 12.6%	[6.6-18.6]	(113) 7.3%	[6.0-8.6]	(49) 15.3%	[11.4-19.3]

Entred - Résultats détaillés du questionnaire médecin, par type de diabète et traitement

Partie II. Items du questionnaire médecin

7. Examen des pieds en 2001

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 1718	(Effectif) %	IC 95%	N = 119	(Effectif) %	IC 95%	N = 1553	(Effectif) %
Monofilament de 10 g non perçu	Manquant	(738) 43.0%	[40.6-45.3]	(30) 25.2%	[17.4-33.0]	(696) 44.8%	[42.3-47.3]	(114) 35.6%	[30.4-40.9]
	Non	(874) 50.9%	[48.5-53.2]	(78) 65.5%	[57.0-74.1]	(770) 49.6%	[47.1-52.1]	(168) 52.5%	[47.0-58.0]
	Oui	(106) 6.2%	[5.0-7.3]	(11) 9.2%	[4.0-14.4]	(87) 5.6%	[4.5-6.7]	(38) 11.9%	[8.3-15.4]
Absence des 2 pouls	Manquant	(155) 9.0%	[7.7-10.4]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(142) 9.1%	[7.7-10.6]	(29) 9.1%	[5.9-12.2]
	Non	(1479) 86.1%	[84.5-87.7]	(110) 92.4%	[87.7-97.2]	(1332) 85.8%	[84.0-87.5]	(263) 82.2%	[78.0-86.4]
	Oui	(84) 4.9%	[3.9-5.9]	(3) 2.5%	[0.0-5.3]	(79) 5.1%	[4.0-6.2]	(28) 8.8%	[5.7-11.8]
Pontage / angioplastie des membres inférieurs	Manquant	(157) 9.1%	[7.8-10.5]	(6) 5.0%	[1.1-9.0]	(145) 9.3%	[7.9-10.8]	(30) 9.4%	[6.2-12.6]
	Non	(1522) 88.6%	[87.1-90.1]	(111) 93.3%	[88.8-97.8]	(1373) 88.4%	[86.8-90.0]	(281) 87.8%	[84.2-91.4]
	Oui	(39) 2.3%	[1.6-3.0]	(2) 1.7%	[0.0-4.0]	(35) 2.3%	[1.5-3.0]	(9) 2.8%	[1.0-4.6]