

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 708	3 497	4 211	2 226	2 545	1 271	1 666
	55-59 ans	6 824	3 059	3 765	535	582	2 524	3 183
	60-64 ans	7 741	3 452	4 289	450	508	3 002	3 781
	65-69 ans	8 755	4 004	4 751	408	376	3 596	4 375
	70-74 ans	5 882	2 584	3 298	199	231	2 385	3 067
	50-74 ans	36 910	16 596	20 314	3 818	4 242	12 778	16 072
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	455	224	231	162	156	62	75
	55-59 ans	436	198	238	49	51	149	187
	60-64 ans	439	192	247	24	33	168	214
	65-69 ans	515	228	287	35	32	193	255
	70-74 ans	422	186	236	25	22	161	214
	50-74 ans	2 267	1 028	1 239	295	294	733	945
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	292	140	152	94	96	46	56
	55-59 ans	301	130	171	31	33	99	138
	60-64 ans	311	133	178	17	18	116	160
	65-69 ans	379	161	218	18	20	143	198
	70-74 ans	304	127	177	14	13	113	164
	50-74 ans	1 587	691	896	174	180	517	716
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	163	84	79	68	60	16	19
	55-59 ans	135	68	67	18	18	50	49
	60-64 ans	128	59	69	7	15	52	54
	65-69 ans	136	67	69	17	12	50	57
	70-74 ans	118	59	59	11	9	48	50
	50-74 ans	680	337	343	121	114	216	229
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 545	3 413	4 132	2 158	2 485	1 255	1 647
	55-59 ans	6 689	2 991	3 698	517	564	2 474	3 134
	60-64 ans	7 613	3 393	4 220	443	493	2 950	3 727
	65-69 ans	8 619	3 937	4 682	391	364	3 546	4 318
	70-74 ans	5 764	2 525	3 239	188	222	2 337	3 017
	50-74 ans	36 230	16 259	19 971	3 697	4 128	12 562	15 843
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	297	174	123	112	79	62	44
	55-59 ans	261	147	114	32	25	115	89
	60-64 ans	348	205	143	36	26	169	117
	65-69 ans	485	291	194	41	14	250	180

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	315	184	131	19	10	165	121
	50-74 ans	1 706	1 001	705	240	154	761	551
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	295	174	121	112	77	62	44
	55-59 ans	260	147	113	32	25	115	88
	60-64 ans	342	201	141	35	26	166	115
	65-69 ans	478	287	191	41	14	246	177
	70-74 ans	310	180	130	19	9	161	121
	50-74 ans	1 685	989	696	239	151	750	545
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	274	159	115	102	72	57	43
	55-59 ans	247	140	107	29	24	111	83
	60-64 ans	322	192	130	31	24	161	106
	65-69 ans	455	271	184	38	14	233	170
	70-74 ans	281	161	120	17	8	144	112
	50-74 ans	1 579	923	656	217	142	706	514
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	271	157	114	100	71	57	43
	55-59 ans	246	139	107	29	24	110	83
	60-64 ans	320	191	129	30	24	161	105
	65-69 ans	450	268	182	38	13	230	169
	70-74 ans	281	161	120	17	8	144	112
	50-74 ans	1 568	916	652	214	140	702	512
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	274	159	115	102	72	57	43
	55-59 ans	247	140	107	29	24	111	83
	60-64 ans	322	192	130	31	24	161	106
	65-69 ans	451	268	183	37	13	231	170
	70-74 ans	281	161	120	17	8	144	112
	50-74 ans	1 575	920	655	216	141	704	514
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	274	159	115	102	72	57	43
	55-59 ans	247	140	107	29	24	111	83
	60-64 ans	321	191	130	31	24	160	106
	65-69 ans	454	270	184	38	14	232	170
	70-74 ans	280	161	119	17	8	144	111
	50-74 ans	1 576	921	655	217	142	704	513
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	274	159	115	102	72	57	43
	55-59 ans	248	140	108	29	24	111	84
	60-64 ans	324	194	130	32	24	162	106
	65-69 ans	459	273	186	38	14	235	172
	70-74 ans	285	165	120	17	8	148	112
	50-74 ans	1 590	931	659	218	142	713	517
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	96	43	53	23	33	20	20
	55-59 ans	75	38	37	5	6	33	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	74	27	47	6	4	21	43
	65-69 ans	105	48	57	2	8	46	49
	70-74 ans	62	33	29	4	2	29	27
	50-74 ans	412	189	223	40	53	149	170
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	24	14	10	9	8	5	2
	55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
	60-64 ans	10	3	7	0	0	3	7
	65-69 ans	29	16	13	5	0	11	13
	70-74 ans	15	6	9	1	0	5	9
	50-74 ans	97	48	49	16	9	32	40
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	56	33	23	20	13	13	10
	55-59 ans	55	31	24	11	7	20	17
	60-64 ans	68	36	32	6	8	30	24
	65-69 ans	114	68	46	13	1	55	45
	70-74 ans	75	42	33	2	3	40	30
	50-74 ans	368	210	158	52	32	158	126
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	79	57	22	43	14	14	8
	55-59 ans	78	50	28	7	7	43	21
	60-64 ans	136	107	29	14	9	93	20
	65-69 ans	162	111	51	12	4	99	47
	70-74 ans	98	60	38	9	2	51	36
	50-74 ans	553	385	168	85	36	300	132
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	19	11	8	5	3	6	5
	65-69 ans	31	19	12	5	0	14	12
	70-74 ans	27	20	7	1	0	19	7
	50-74 ans	99	63	36	19	7	44	29
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	5	3	3	0	2	3
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	37	22	15	4	2	18	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	135	90	45	63	27	27	18
	55-59 ans	133	81	52	18	14	63	38
	60-64 ans	204	143	61	20	17	123	44
	65-69 ans	276	179	97	25	5	154	92
	70-74 ans	173	102	71	11	5	91	66
	50-74 ans	921	595	326	137	68	458	258

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	79	57	22	43	14	14	8
	55-59 ans	78	50	28	7	7	43	21
	60-64 ans	136	107	29	14	9	93	20
	65-69 ans	162	111	51	12	4	99	47
	70-74 ans	98	60	38	9	2	51	36
	50-74 ans	553	385	168	85	36	300	132
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	69	51	18	39	13	12	5
	55-59 ans	69	43	26	7	7	36	19
	60-64 ans	118	92	26	13	8	79	18
	65-69 ans	136	93	43	10	4	83	39
	70-74 ans	82	50	32	8	2	42	30
	50-74 ans	474	329	145	77	34	252	111
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	85	63	22	47	14	16	8
	55-59 ans	89	58	31	11	8	47	23
	60-64 ans	140	110	30	15	9	95	21
	65-69 ans	163	115	48	15	4	100	44
	70-74 ans	101	63	38	8	3	55	35
	50-74 ans	578	409	169	96	38	313	131
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	19	11	8	5	3	6	5
	65-69 ans	31	19	12	5	0	14	12
	70-74 ans	27	20	7	1	0	19	7
	50-74 ans	99	63	36	19	7	44	29
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	18	10	8	4	3	6	5
	65-69 ans	27	17	10	4	0	13	10
	70-74 ans	24	18	6	1	0	17	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	90	57	33	16	7	41	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	8	2	6	1	1	1	5
	65-69 ans	15	11	4	2	0	9	4
	70-74 ans	10	8	2	0	0	8	2
	50-74 ans	42	26	16	6	3	20	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	3	1	2	3
	60-64 ans	9	7	2	2	2	5	0
	65-69 ans	11	5	6	2	0	3	6
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	46	29	17	9	4	20	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	7	5	2	1	2	4	0
	65-69 ans	10	4	6	2	0	2	6
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	39	22	17	7	4	15	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	7	7	0	2	0	5	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	8	7	2	1	6	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	13	8	5	3	1	5	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	14	7	7	4	2	3	5
	60-64 ans	17	9	8	3	3	6	5
	65-69 ans	22	13	9	3	0	10	9
	70-74 ans	22	16	6	1	0	15	6
	50-74 ans	81	49	32	14	7	35	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	23	15	8	8	2	7	6

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 03 - Allier

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,4	5,5	7,3	6,1	4,9	4,5
	55-59 ans	6,4	6,5	6,3	9,2	8,8	5,9	5,9
	60-64 ans	5,7	5,6	5,8	5,3	6,5	5,6	5,7
	65-69 ans	5,9	5,7	6,0	8,6	8,5	5,4	5,8
	70-74 ans	7,2	7,2	7,2	12,6	9,5	6,8	7,0
	50-74 ans	6,1	6,2	6,1	7,7	6,9	5,7	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,9	3,1	2,4	1,3	1,1
	55-59 ans	2,0	2,2	1,8	3,4	3,1	2,0	1,5
	60-64 ans	1,7	1,7	1,6	1,6	3,0	1,7	1,4
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	4,2	3,2	1,4	1,3
	70-74 ans	2,0	2,3	1,8	5,5	3,9	2,0	1,6
	50-74 ans	1,8	2,0	1,7	3,2	2,7	1,7	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	62,5	65,8	58,0	61,5	74,2	74,7
	55-59 ans	69,0	65,7	71,8	63,3	64,7	66,4	73,8
	60-64 ans	70,8	69,3	72,1	70,8	54,5	69,0	74,8
	65-69 ans	73,6	70,6	76,0	51,4	62,5	74,1	77,6
	70-74 ans	72,0	68,3	75,0	56,0	59,1	70,2	76,6
	50-74 ans	70,0	67,2	72,3	59,0	61,2	70,5	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	5,1	3,0	5,2	3,2	4,9	2,7
	55-59 ans	3,9	4,9	3,1	6,2	4,4	4,6	2,8
	60-64 ans	4,6	6,0	3,4	8,1	5,3	5,7	3,1
	65-69 ans	5,6	7,4	4,1	10,5	3,8	7,1	4,2
	70-74 ans	5,5	7,3	4,0	10,1	4,5	7,1	4,0
	50-74 ans	4,7	6,2	3,5	6,5	3,7	6,1	3,5
50-74 ans **	4,6	5,9	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100,0	98,4	100,0	97,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9
	60-64 ans	98,3	98,0	98,6	97,2	100,0	98,2	98,3
	65-69 ans	98,6	98,6	98,5	100,0	100,0	98,4	98,3
	70-74 ans	98,4	97,8	99,2	100,0	90,0	97,6	100,0
	50-74 ans	98,8	98,8	98,7	99,6	98,1	98,6	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	91,4	95,0	91,1	93,5	91,9	97,7
	55-59 ans	95,0	95,2	94,7	90,6	96,0	96,5	94,3
	60-64 ans	94,2	95,5	92,2	88,6	92,3	97,0	92,2
	65-69 ans	95,2	94,4	96,3	92,7	100,0	94,7	96,0
	70-74 ans	90,6	89,4	92,3	89,5	88,9	89,4	92,6
	50-74 ans	93,7	93,3	94,3	90,8	94,0	94,1	94,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,7	99,1	98,0	98,6	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	60-64 ans	99,4	99,5	99,2	96,8	100,0	100,0	99,1
	65-69 ans	98,9	98,9	98,9	100,0	92,9	98,7	99,4
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,3	99,2	99,4	98,6	98,6	99,4	99,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	2
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	2
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	98	108	96	109	102	105
	55-59 ans	100	100	99	97	90	101	101
	60-64 ans	99	100	99	102	101	99	98
	65-69 ans	102	107	95	144	104	101	94
	70-74 ans	94	101	85	76	85	104	85
	50-74 ans	100	102	97	104	103	101	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83,5 (57-116)	83 (57-110)	85 (58-138)	77,5 (55-103)	81,5 (56,5-138,5)	88 (61-119)	88 (73-138)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (56-109)	78 (56,5-106,5)	69 (53-117)	87 (49-108)	56 (44,5-81)	77 (57-106)	76 (57-131)
	60-64 ans	79,5 (56-112)	82 (60,5-118)	73,5 (53-110)	80 (55-131)	71,5 (55,5-115)	82 (61-118)	76 (53-108)
	65-69 ans	78 (56-116)	79 (58-118)	76 (54-110)	81,5 (60-167)	102,5 (61-145)	79 (58-115)	75,5 (54-108)
	70-74 ans	76 (55-109)	78 (55-123)	71 (53,5-102,5)	60 (51-96)	70,5 (48-96,5)	80,5 (55-124)	71 (53,5-103)
	50-74 ans	78 (56-112)	81 (57-115)	76 (54-110)	78 (55-115)	73,5 (55-123)	81 (57-115)	76 (54-109)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,4	2,9	1,6	4,5	1,3	0,0	2,3
	55-59 ans	1,9	2,0	1,8	6,3	0,0	0,9	2,2
	60-64 ans	1,1	0,5	2,1	2,8	3,8	0,0	1,7
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	70-74 ans	1,6	2,2	0,8	0,0	0,0	2,4	0,8
	50-74 ans	1,3	1,5	1,1	3,3	1,3	0,9	1,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	65-69 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0
	70-74 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	100,0	99,7	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,0	27,0	46,1	22,5	45,8	35,1	46,5
	55-59 ans	30,2	27,1	34,3	17,2	25,0	29,7	36,9
	60-64 ans	22,8	13,9	36,2	18,8	16,7	13,0	40,6
	65-69 ans	22,9	17,6	30,6	5,3	57,1	19,6	28,5
	70-74 ans	21,8	20,0	24,2	23,5	25,0	19,6	24,1
	50-74 ans	25,9	20,3	33,8	18,3	37,3	20,9	32,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,8	8,8	8,7	8,8	11,1	8,8	4,7
	55-59 ans	7,7	6,4	9,3	3,4	4,2	7,2	10,7
	60-64 ans	3,1	1,5	5,4	0,0	0,0	1,9	6,6
	65-69 ans	6,3	5,9	7,0	13,2	0,0	4,7	7,6
	70-74 ans	5,3	3,6	7,5	5,9	0,0	3,4	8,0
	50-74 ans	6,1	5,2	7,4	7,3	6,3	4,5	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,4	20,8	20,0	19,6	18,1	22,8	23,3
	55-59 ans	22,2	22,1	22,2	37,9	29,2	18,0	20,2
	60-64 ans	21,0	18,6	24,6	18,8	33,3	18,5	22,6
	65-69 ans	24,8	24,9	24,7	34,2	7,1	23,4	26,2
	70-74 ans	26,3	25,5	27,5	11,8	37,5	27,0	26,8
	50-74 ans	23,1	22,6	24,0	23,9	22,5	22,2	24,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,8	35,8	19,1	42,2	19,4	24,6	18,6
	55-59 ans	31,5	35,7	25,9	24,1	29,2	38,7	25,0
	60-64 ans	42,0	55,2	22,3	43,8	37,5	57,4	18,9
	65-69 ans	35,3	40,7	27,4	31,6	28,6	42,1	27,3
	70-74 ans	34,4	36,4	31,7	52,9	25,0	34,5	32,1
	50-74 ans	34,8	41,4	25,5	39,0	25,4	42,1	25,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	3,8	1,7	3,9	2,8	3,5	0,0
	55-59 ans	5,6	5,0	6,5	13,8	8,3	2,7	6,0
	60-64 ans	5,9	5,7	6,2	15,6	12,5	3,7	4,7
	65-69 ans	6,8	7,0	6,5	13,2	0,0	6,0	7,0
	70-74 ans	9,5	12,1	5,8	5,9	0,0	12,8	6,3
	50-74 ans	6,2	6,8	5,5	8,7	4,9	6,2	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	3,1	2,6	2,9	0,0	3,5	7,0
	55-59 ans	2,0	2,1	1,9	3,4	4,2	1,8	1,2
	60-64 ans	2,5	2,1	3,1	0,0	0,0	2,5	3,8
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	0,0	0,0	3,4	2,9
	70-74 ans	1,1	1,2	0,8	0,0	12,5	1,4	0,0
	50-74 ans	2,3	2,4	2,3	1,8	1,4	2,5	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,6	0,5	0,8	0,0	0,0	0,6	0,9
	65-69 ans	0,9	1,1	0,5	2,6	0,0	0,9	0,6
	70-74 ans	1,4	1,2	1,7	0,0	0,0	1,4	1,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	0,5	0,7	0,8	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,6	1,0	0,0	3,1	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,3	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	17,9	26,4	10,9	29,2	10,9	21,5	10,9
	55-59 ans	19,9	27,1	14,1	34,8	24,8	25,5	12,1
	60-64 ans	26,8	42,1	14,5	45,1	34,5	41,7	11,8
	65-69 ans	32,0	45,5	20,7	63,9	13,7	43,4	21,3
	70-74 ans	30,0	40,4	21,9	58,5	22,5	38,9	21,9
	50-74 ans	25,4	36,6	16,3	37,1	16,5	36,5	16,3
	50-74 ans **	24,7	34,7	15,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	16,7	5,3	19,9	5,6	11,2	4,9
	55-59 ans	11,7	16,7	7,6	13,5	12,4	17,4	6,7
	60-64 ans	17,9	31,5	6,9	31,6	18,3	31,5	5,4
	65-69 ans	18,8	28,2	10,9	30,7	11,0	27,9	10,9
	70-74 ans	17,0	23,8	11,7	47,9	9,0	21,8	11,9
	50-74 ans	15,3	23,7	8,4	23,0	8,7	23,9	8,3
	50-74 ans **	15,0	22,5	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	14,9	4,4	18,1	5,2	9,6	3,0
	55-59 ans	10,3	14,4	7,0	13,5	12,4	14,6	6,1
	60-64 ans	15,5	27,1	6,2	29,3	16,2	26,8	4,8
	65-69 ans	15,8	23,6	9,2	25,6	11,0	23,4	9,0
	70-74 ans	14,2	19,8	9,9	42,6	9,0	18,0	9,9
	50-74 ans	13,1	20,2	7,3	20,8	8,2	20,1	7,0
	50-74 ans **	12,9	19,4	7,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	18,5	5,3	21,8	5,6	12,7	4,9
	55-59 ans	13,3	19,4	8,4	21,3	14,2	19,0	7,3
	60-64 ans	18,4	32,4	7,1	33,9	18,3	32,2	5,6
	65-69 ans	18,9	29,2	10,3	38,4	11,0	28,2	10,2
	70-74 ans	17,5	25,0	11,7	42,6	13,5	23,5	11,6
	50-74 ans	16,0	25,2	8,5	26,0	9,2	24,9	8,3
	50-74 ans **	15,8	24,2	8,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,8	0,5	1,9	0,8	1,6	0,0
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	7,7	3,5	1,2	1,6
	60-64 ans	2,5	3,2	1,9	11,3	6,1	2,0	1,3
	65-69 ans	3,6	4,8	2,6	12,8	0,0	3,9	2,8
	70-74 ans	4,7	7,9	2,2	5,3	0,0	8,1	2,3
	50-74 ans	2,7	3,9	1,8	5,1	1,7	3,5	1,8
	50-74 ans **	2,6	3,5	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,1	60,0	50,0	66,7	50,0	50,0	0,0
	55-59 ans	35,7	28,6	42,9	25,0	50,0	33,3	40,0
	60-64 ans	44,4	20,0	75,0	25,0	33,3	16,7	100,0
	65-69 ans	55,6	64,7	40,0	50,0	0,0	69,2	40,0
	70-74 ans	41,7	44,4	33,3	0,0	0,0	47,1	33,3
	50-74 ans	46,7	45,6	48,5	37,5	42,9	48,8	50,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)