

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 26 - Drome

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 283	4 302	4 981	3 026	3 406	1 276	1 575
	55-59 ans	8 451	3 837	4 614	884	1 044	2 953	3 570
	60-64 ans	8 626	3 908	4 718	860	982	3 048	3 736
	65-69 ans	8 499	3 792	4 707	770	861	3 022	3 846
	70-74 ans	6 085	2 754	3 331	450	495	2 304	2 836
	50-74 ans	40 944	18 593	22 351	5 990	6 788	12 603	15 563
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	675	338	337	250	242	88	95
	55-59 ans	610	283	327	73	80	210	247
	60-64 ans	592	247	345	61	72	186	273
	65-69 ans	661	291	370	59	83	232	287
	70-74 ans	519	256	263	41	51	215	212
	50-74 ans	3 057	1 415	1 642	484	528	931	1 114
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	527	256	271	184	191	72	80
	55-59 ans	474	221	253	50	50	171	203
	60-64 ans	496	206	290	48	54	158	236
	65-69 ans	541	240	301	41	56	199	245
	70-74 ans	406	192	214	23	39	169	175
	50-74 ans	2 444	1 115	1 329	346	390	769	939
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	148	82	66	66	51	16	15
	55-59 ans	136	62	74	23	30	39	44
	60-64 ans	96	41	55	13	18	28	37
	65-69 ans	120	51	69	18	27	33	42
	70-74 ans	113	64	49	18	12	46	37
	50-74 ans	613	300	313	138	138	162	175
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 135	4 220	4 915	2 960	3 355	1 260	1 560
	55-59 ans	8 315	3 775	4 540	861	1 014	2 914	3 526
	60-64 ans	8 530	3 867	4 663	847	964	3 020	3 699
	65-69 ans	8 379	3 741	4 638	752	834	2 989	3 804
	70-74 ans	5 972	2 690	3 282	432	483	2 258	2 799
	50-74 ans	40 331	18 293	22 038	5 852	6 650	12 441	15 388
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	304	163	141	120	102	43	39
	55-59 ans	295	166	129	42	36	124	93
	60-64 ans	390	225	165	63	31	162	134
	65-69 ans	431	277	154	67	32	210	122

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	324	182	142	33	34	149	108
	50-74 ans	1 744	1 013	731	325	235	688	496
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	302	163	139	120	102	43	37
	55-59 ans	292	164	128	42	36	122	92
	60-64 ans	386	224	162	63	29	161	133
	65-69 ans	425	273	152	66	31	207	121
	70-74 ans	318	179	139	32	34	147	105
	50-74 ans	1 723	1 003	720	323	232	680	488
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	283	153	130	112	96	41	34
	55-59 ans	277	159	118	39	33	120	85
	60-64 ans	370	214	156	61	28	153	128
	65-69 ans	399	254	145	56	30	198	115
	70-74 ans	293	171	122	31	28	140	94
	50-74 ans	1 622	951	671	299	215	652	456
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	279	150	129	109	96	41	33
	55-59 ans	273	157	116	38	33	119	83
	60-64 ans	361	207	154	57	28	150	126
	65-69 ans	383	247	136	56	29	191	107
	70-74 ans	278	162	116	28	27	134	89
	50-74 ans	1 574	923	651	288	213	635	438
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 26 - Drome

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	282	152	130	111	96	41	34
	55-59 ans	277	159	118	39	33	120	85
	60-64 ans	367	211	156	59	28	152	128
	65-69 ans	393	252	141	56	29	196	112
	70-74 ans	289	170	119	31	27	139	92
	50-74 ans	1 608	944	664	296	213	648	451
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	2	7	1	0	1	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	283	153	130	112	96	41	34
	55-59 ans	277	159	118	39	33	120	85
	60-64 ans	369	213	156	60	28	153	128
	65-69 ans	396	254	142	56	30	198	112
	70-74 ans	288	169	119	31	27	138	92
	50-74 ans	1 613	948	665	298	214	650	451
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	285	153	132	112	96	41	36
	55-59 ans	277	159	118	39	33	120	85
	60-64 ans	372	214	158	61	28	153	130
	65-69 ans	401	255	146	57	30	198	116
	70-74 ans	296	172	124	31	28	141	96
	50-74 ans	1 631	953	678	300	215	653	463
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	126	57	69	37	50	20	19
	55-59 ans	99	51	48	10	17	41	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	112	54	58	18	13	36	45
	65-69 ans	123	61	62	13	8	48	54
	70-74 ans	95	45	50	6	12	39	38
	50-74 ans	555	268	287	84	100	184	187
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	11	6	10	5	1	1
	55-59 ans	15	6	9	1	4	5	5
	60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
	65-69 ans	17	10	7	3	1	7	6
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	69	38	31	16	11	22	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	41	26	15	20	12	6	3
	55-59 ans	41	24	17	7	5	17	12
	60-64 ans	61	30	31	5	5	25	26
	65-69 ans	61	43	18	9	6	34	12
	70-74 ans	40	23	17	2	3	21	14
	50-74 ans	244	146	98	43	31	103	67
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	80	47	33	34	22	13	11
	55-59 ans	103	71	32	17	5	54	27
	60-64 ans	142	95	47	28	7	67	40
	65-69 ans	152	106	46	22	13	84	33
	70-74 ans	105	70	35	10	7	60	28
	50-74 ans	582	389	193	111	54	278	139
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	19	11	8	10	6	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	6	11	4	2	2	9
	60-64 ans	36	22	14	7	3	15	11
	65-69 ans	44	32	12	10	2	22	10
	70-74 ans	46	30	16	11	5	19	11
	50-74 ans	162	101	61	42	18	59	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	121	73	48	54	34	19	14
	55-59 ans	144	95	49	24	10	71	39
	60-64 ans	203	125	78	33	12	92	66
	65-69 ans	213	149	64	31	19	118	45
	70-74 ans	145	93	52	12	10	81	42
	50-74 ans	826	535	291	154	85	381	206

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 26 - Drome

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	80	47	33	34	22	13	11
	55-59 ans	103	71	32	17	5	54	27
	60-64 ans	142	95	47	28	7	67	40
	65-69 ans	152	106	46	22	13	84	33
	70-74 ans	105	70	35	10	7	60	28
	50-74 ans	582	389	193	111	54	278	139
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	67	38	29	30	20	8	9
	55-59 ans	80	56	24	15	4	41	20
	60-64 ans	106	70	36	25	4	45	32
	65-69 ans	127	89	38	20	10	69	28
	70-74 ans	81	51	30	7	6	44	24
	50-74 ans	461	304	157	97	44	207	113
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	78	46	32	34	22	12	10
	55-59 ans	99	69	30	18	5	51	25
	60-64 ans	124	81	43	27	5	54	38
	65-69 ans	151	109	42	23	13	86	29
	70-74 ans	97	64	33	9	7	55	26
	50-74 ans	549	369	180	111	52	258	128
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	11	8	10	6	1	2
	55-59 ans	18	7	11	4	2	3	9
	60-64 ans	36	22	14	7	3	15	11
	65-69 ans	44	32	12	10	2	22	10
	70-74 ans	46	30	16	11	5	19	11
	50-74 ans	163	102	61	42	18	60	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	9	8	8	6	1	2
	55-59 ans	17	7	10	4	2	3	8
	60-64 ans	34	21	13	7	3	14	10
	65-69 ans	41	31	10	9	1	22	9
	70-74 ans	42	26	16	10	5	16	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 26 - Drome

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	151	94	57	38	17	56	40
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	12	6	6	5	4	1	2
	55-59 ans	12	4	8	3	2	1	6
	60-64 ans	24	15	9	5	1	10	8
	65-69 ans	23	18	5	5	1	13	4
	70-74 ans	27	17	10	8	3	9	7
	50-74 ans	98	60	38	26	11	34	27
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2
	65-69 ans	18	13	5	4	0	9	5
	70-74 ans	15	9	6	2	2	7	4
	50-74 ans	53	34	19	12	6	22	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	14	10	4	2	0	8	4
	70-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
	50-74 ans	42	26	16	9	4	17	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	11	8	3	3	2	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	12	6	6	3	0	3	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 26 - Drome

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	16	10	6	1	4	9	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	7	4	0	1
	55-59 ans	13	5	8	2	2	3	6
	60-64 ans	17	10	7	5	2	5	5
	65-69 ans	29	21	8	8	1	13	7
	70-74 ans	30	16	14	7	4	9	10
	50-74 ans	101	59	42	29	13	30	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	16	9	7	5	1	4	6
	70-74 ans	14	3	11	1	4	2	7
	50-74 ans	59	30	29	13	9	17	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,9	6,8	8,3	7,1	6,9	6,0
	55-59 ans	7,2	7,4	7,1	8,3	7,7	7,1	6,9
	60-64 ans	6,9	6,3	7,3	7,1	7,3	6,1	7,3
	65-69 ans	7,8	7,7	7,9	7,7	9,6	7,7	7,5
	70-74 ans	8,5	9,3	7,9	9,1	10,3	9,3	7,5
	50-74 ans	7,5	7,6	7,3	8,1	7,8	7,4	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,3	2,2	1,5	1,3	1,0
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	2,6	2,9	1,3	1,2
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	1,5	1,8	0,9	1,0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	2,3	3,1	1,1	1,1
	70-74 ans	1,9	2,3	1,5	4,0	2,4	2,0	1,3
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	2,3	2,0	1,3	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,1	75,7	80,4	73,6	78,9	81,8	84,2
	55-59 ans	77,7	78,1	77,4	68,5	62,5	81,4	82,2
	60-64 ans	83,8	83,4	84,1	78,7	75,0	84,9	86,4
	65-69 ans	81,8	82,5	81,4	69,5	67,5	85,8	85,4
	70-74 ans	78,2	75,0	81,4	56,1	76,5	78,6	82,5
	50-74 ans	79,9	78,8	80,9	71,5	73,9	82,6	84,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,9	4,1	3,0	3,4	2,5
	55-59 ans	3,5	4,4	2,8	4,9	3,6	4,3	2,6
	60-64 ans	4,6	5,8	3,5	7,4	3,2	5,4	3,6
	65-69 ans	5,1	7,4	3,3	8,9	3,8	7,0	3,2
	70-74 ans	5,4	6,8	4,3	7,6	7,0	6,6	3,9
	50-74 ans	4,3	5,5	3,3	5,6	3,5	5,5	3,2
50-74 ans **	4,3	5,3	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	94,9
	55-59 ans	99,0	98,8	99,2	100,0	100,0	98,4	98,9
	60-64 ans	99,0	99,6	98,2	100,0	93,5	99,4	99,3
	65-69 ans	98,6	98,6	98,7	98,5	96,9	98,6	99,2
	70-74 ans	98,1	98,4	97,9	97,0	100,0	98,7	97,2
	50-74 ans	98,8	99,0	98,5	99,4	98,7	98,8	98,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 26 - Drome

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,7	93,9	93,5	93,3	94,1	95,3	91,9
	55-59 ans	94,9	97,0	92,2	92,9	91,7	98,4	92,4
	60-64 ans	95,9	95,5	96,3	96,8	96,6	95,0	96,2
	65-69 ans	93,9	93,0	95,4	84,8	96,8	95,7	95,0
	70-74 ans	92,1	95,5	87,8	96,9	82,4	95,2	89,5
	50-74 ans	94,1	94,8	93,2	92,6	92,7	95,9	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,0	99,2	97,3	100,0	100,0	97,1
	55-59 ans	98,6	98,7	98,3	97,4	100,0	99,2	97,6
	60-64 ans	97,6	96,7	98,7	93,4	100,0	98,0	98,4
	65-69 ans	96,0	97,2	93,8	100,0	96,7	96,5	93,0
	70-74 ans	94,9	94,7	95,1	90,3	96,4	95,7	94,7
	50-74 ans	97,0	97,1	97,0	96,3	99,1	97,4	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	122	120	124	121	115	115
	55-59 ans	106	107	104	122	118	102	99
	60-64 ans	108	107	109	125	116	100	108
	65-69 ans	108	111	103	114	91	110	106
	70-74 ans	110	108	113	116	113	106	114
	50-74 ans	110	111	110	121	115	106	107
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93 (62-135)	94 (61-133)	91 (63-136)	95 (60,5-144)	92,5 (63-140,5)	90 (68-123)	89 (61-125)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	83 (61-122)	83 (61-125)	82,5 (60-122)	79 (61-126)	95 (60-122)	86,5 (61-123,5)	82 (61-117)
	60-64 ans	88 (62-125)	83 (61-122)	93 (65,5-128,5)	83 (60-133)	89 (61,5-118,5)	83 (62-115)	94,5 (66,5-129,5)
	65-69 ans	89 (61-123)	92,5 (62-131)	86 (58-112)	94,5 (67-135,5)	80,5 (50-97)	90,5 (60-128)	88 (60-118)
	70-74 ans	90 (66-128)	84 (66-127)	96 (68-128)	82 (68-155)	91,5 (76-122,5)	87 (62,5-124)	97 (62-129)
	50-74 ans	89 (62-125)	88 (62-128)	90 (62-123)	90 (63-136)	90 (62-123)	87 (61-124)	89,5 (62-123,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,6	4,3	2,8	4,2	2,9	4,7	2,6
	55-59 ans	2,0	1,8	2,3	2,4	0,0	1,6	3,2
	60-64 ans	3,1	3,6	2,4	1,6	3,2	4,3	2,2
	65-69 ans	3,7	3,2	4,5	7,5	3,1	1,9	4,9
	70-74 ans	4,3	1,6	7,7	3,0	11,8	1,3	6,5
	50-74 ans	3,4	3,0	4,0	4,0	3,8	2,5	4,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	97,4
	70-74 ans	98,3	98,8	97,5	100,0	96,4	98,6	97,9
	50-74 ans	99,4	99,7	99,1	99,7	99,5	99,7	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,2	37,3	52,3	33,0	52,1	48,8	52,8
	55-59 ans	35,7	32,1	40,7	25,6	51,5	34,2	36,5
	60-64 ans	30,1	25,2	36,7	29,5	46,4	23,5	34,6
	65-69 ans	30,7	23,9	42,5	22,8	26,7	24,2	46,6
	70-74 ans	32,1	26,2	40,3	19,4	42,9	27,7	39,6
	50-74 ans	34,0	28,1	42,3	28,0	46,5	28,2	40,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,0	7,2	4,5	8,9	5,2	2,4	2,8
	55-59 ans	5,4	3,8	7,6	2,6	12,1	4,2	5,9
	60-64 ans	3,5	4,2	2,5	3,3	0,0	4,6	3,1
	65-69 ans	4,2	3,9	4,8	5,3	3,3	3,5	5,2
	70-74 ans	2,4	1,2	4,0	0,0	3,6	1,4	4,2
	50-74 ans	4,2	4,0	4,6	5,3	5,1	3,4	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,6	1,6	0,0	0,7	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,1	0,3	0,0	0,5	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,4	17,0	11,4	17,9	12,5	14,6	8,3
	55-59 ans	14,8	15,1	14,4	17,9	15,2	14,2	14,1
	60-64 ans	16,4	14,0	19,6	8,2	17,9	16,3	20,0
	65-69 ans	15,2	16,9	12,3	15,8	20,0	17,2	10,3
	70-74 ans	13,5	13,4	13,7	6,5	10,7	14,9	14,6
	50-74 ans	15,0	15,3	14,5	14,3	14,4	15,8	14,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,1	30,7	25,0	30,4	22,9	31,7	30,6
	55-59 ans	37,2	44,7	27,1	43,6	15,2	45,0	31,8
	60-64 ans	38,2	44,4	29,7	45,9	25,0	43,8	30,8
	65-69 ans	37,9	41,6	31,5	38,6	43,3	42,4	28,4
	70-74 ans	35,5	40,7	28,2	32,3	25,0	42,6	29,2
	50-74 ans	35,7	40,8	28,5	37,0	25,1	42,6	30,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	7,2	6,1	8,9	6,3	2,4	5,6
	55-59 ans	6,1	3,8	9,3	10,3	6,1	1,7	10,6
	60-64 ans	9,7	10,3	8,9	11,5	10,7	9,8	8,5
	65-69 ans	11,0	12,5	8,2	17,5	6,7	11,1	8,6
	70-74 ans	15,5	17,4	12,9	35,5	17,9	13,5	11,5
	50-74 ans	9,9	10,6	9,0	14,0	8,4	9,0	9,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	0,0	0,0	1,3	1,5
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	1,0	1,2	0,8	6,5	0,0	0,0	1,0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,4	1,0	0,0	0,5	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
	60-64 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	65-69 ans	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0	0,5	0,9
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,2	17,3	9,8	18,2	10,1	15,1	9,0
	55-59 ans	17,3	25,2	10,8	27,9	9,9	24,4	11,1
	60-64 ans	23,8	32,3	16,7	39,0	12,4	30,5	17,8
	65-69 ans	25,4	39,8	13,8	41,2	22,8	39,5	11,8
	70-74 ans	24,3	34,6	15,8	27,8	20,7	35,9	15,0
	50-74 ans	20,5	29,2	13,2	26,3	12,8	30,6	13,4
	50-74 ans **	20,3	28,2	13,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,1	6,7	11,5	6,6	10,3	7,1
	55-59 ans	12,4	18,8	7,0	19,7	4,9	18,5	7,7
	60-64 ans	16,6	24,6	10,1	33,1	7,3	22,2	10,8
	65-69 ans	18,1	28,3	9,9	29,3	15,6	28,1	8,7
	70-74 ans	17,6	26,0	10,7	23,1	14,5	26,6	10,0
	50-74 ans	14,4	21,3	8,8	19,0	8,1	22,3	9,0
	50-74 ans **	14,3	20,5	8,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,0	5,9	10,1	6,0	6,3	5,8
	55-59 ans	9,6	14,8	5,3	17,4	3,9	14,1	5,7
	60-64 ans	12,4	18,1	7,7	29,5	4,1	14,9	8,7
	65-69 ans	15,2	23,8	8,2	26,6	12,0	23,1	7,4
	70-74 ans	13,6	19,0	9,1	16,2	12,4	19,5	8,6
	50-74 ans	11,4	16,6	7,1	16,6	6,6	16,6	7,3
	50-74 ans **	11,3	15,9	7,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 26 - Drome

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	10,9	6,5	11,5	6,6	9,5	6,4
	55-59 ans	11,9	18,3	6,6	20,9	4,9	17,5	7,1
	60-64 ans	14,5	20,9	9,2	31,9	5,2	17,9	10,3
	65-69 ans	18,0	29,1	9,1	30,6	15,6	28,8	7,6
	70-74 ans	16,2	23,8	10,1	20,8	14,5	24,4	9,3
	50-74 ans	13,6	20,2	8,2	19,0	7,8	20,7	8,3
	50-74 ans **	13,4	19,3	8,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,6	1,6	3,4	1,8	0,8	1,3
	55-59 ans	2,2	1,9	2,4	4,6	2,0	1,0	2,6
	60-64 ans	4,2	5,7	3,0	8,3	3,1	5,0	3,0
	65-69 ans	5,3	8,6	2,6	13,3	2,4	7,4	2,6
	70-74 ans	7,7	11,2	4,9	25,5	10,4	8,4	3,9
	50-74 ans	4,0	5,6	2,8	7,2	2,7	4,8	2,8
	50-74 ans **	3,9	5,1	2,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	70,6	66,7	75,0	62,5	66,7	100,0	100,0
	55-59 ans	70,6	57,1	80,0	75,0	100,0	33,3	75,0
	60-64 ans	70,6	71,4	69,2	71,4	33,3	71,4	80,0
	65-69 ans	56,1	58,1	50,0	55,6	100,0	59,1	44,4
	70-74 ans	64,3	65,4	62,5	80,0	60,0	56,3	63,6
	50-74 ans	64,9	63,8	66,7	68,4	64,7	60,7	67,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)