Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 467	6 354	7 113	4 448	4 801	1 906	2 312
(quei qu'en son le resultat)	55-59 ans	11 153	5 058	6 095	1 228	1 353	3 830	4 742
	60-64 ans	11 571	5 208	6 363	1 136	1 152	4 072	5 211
	65-69 ans	11 474	5 254	6 220	917	908	4 337	5 312
	70-74 ans	7 099	3 283	3 816	396	906 417	4 33 <i>1</i> 2 887	3 399
	50-74 ans	54 764	25 157	29 607	8 125	8 631	17 032	20 976
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non	30-74 alls	54 704	25 157	29 007	6 123	0 031	17 032	20 97 0
analysable (NA)	50-54 ans	855	437	418	325	304	112	114
	55-59 ans	746	346	400	98	108	248	292
	60-64 ans	718	315	403	90	93	225	310
	65-69 ans	661	302	359	82	63	220	296
	70-74 ans	481	207	274	45	45	162	229
	50-74 ans	3 461	1 607	1 854	640	613	967	1 241
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à								
un test NA	50-54 ans	741	384	357	283	248	101	109
	55-59 ans	657	305	352	82	93	223	259
	60-64 ans	654	283	371	75	77	208	294
	65-69 ans	583	272	311	68	46	204	265
	70-74 ans	362	150	212	28	31	122	181
	50-74 ans	2 997	1 394	1 603	536	495	858	1 108
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	114	53	61	42	56	11	5
	55-59 ans	89	41	48	16	15	25	33
	60-64 ans	64	32	32	15	16	17	16
	65-69 ans	78	30	48	14	17	16	31
	70-74 ans	119	57	62	17	14	40	48
	50-74 ans	464	213	251	104	118	109	133
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 353	6 301	7 052	4 406	4 745	1 895	2 307
The Themse as personness aspected (area an test analysasis)	55-59 ans	11 064	5 017	6 047	1 212	1 338	3 805	4 709
	60-64 ans	11 507	5 176	6 331	1 121	1 136	4 055	5 195
	65-69 ans	11 396	5 224	6 172	903	891	4 321	5 281
	70-74 ans	6 980	3 226	3 754	379	403	2 847	3 351
	50-74 ans	54 300	24 944	29 356	8 021	8 513	16 923	20 843
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	565	307	258	216	190	91	68
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	491	278	213	87	64	191	149
	60-64 ans	619	350	269	86	57	264	212
	65-69 ans	608	361	247	81	49	280	198
				=			==0	.00

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	•
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	480	275	205	40	38	235	167
	50-74 ans	2 763	1 571	1 192	510	398	1 061	794
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	562	307	255	216	187	91	68
	55-59 ans	484	274	210	87	63	187	147
	60-64 ans	606	341	265	82	57	259	208
	65-69 ans	592	351	241	79	47	272	194
	70-74 ans	465	266	199	40	38	226	161
	50-74 ans	2 709	1 539	1 170	504	392	1 035	778
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	515	279	236	196	174	83	62
	55-59 ans	455	254	201	78	59	176	142
	60-64 ans	563	315	248	71	51	244	197
	65-69 ans	553	325	228	71	42	254	186
	70-74 ans	426	246	180	35	35	211	145
	50-74 ans	2 512	1 419	1 093	451	361	968	732
400 N I I I I I I I I I I I I I I I I I I	50.54	400	050	040	4-7-7	101	70	50
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	469	253	216	177	164	76	52
	55-59 ans	416	234	182	75	53	159	129
	60-64 ans	513	290	223	67	47	223	176
	65-69 ans	496	293	203	61	37	232	166
	70-74 ans	380	220	160	29	28	191	132
A40 N. I. I.	50-74 ans	2 274	1 290	984	409	329	881	655
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	C
' '	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	C
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	C
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant			-	•	-	_	-	
entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	509	274	235	193	174	81	61
	55-59 ans	448	252	196	76	58	176	138
	60-64 ans	548	308	240	69	49	239	191
	65-69 ans	543	321	222	70	41	251	181
	70-74 ans	410	238	172	34	33	204	139
	50-74 ans	2 458	1 393	1 065	442	355	951	710
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une			_			•		
autre exploration colique	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	7	2	5	2	1	0	4
	60-64 ans	15	7	8	2	2	5	6
	65-69 ans	10	4	6	1	1	3	5
	70-74 ans	16	8	8	1	2	7	6
	50-74 ans	54	26	28	9	6	17	22
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique	50.54	2	•	0	•	4	•	
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	9	6	3	3	0	3	3
	65-69 ans	11	6	5	2	2	4	3
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	39	21	18	5	4	16	14
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	511	277	234	194	174	83	60
	55-59 ans	453	253	200	78	58	175	142
	60-64 ans	560	315	245	71	50	244	195
	65-69 ans	548	320	228	69	42	251	186
	70-74 ans	420	242	178	34	35	208	143
	50-74 ans	2 492	1 407	1 085	446	359	961	726
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre)	50-54 ans	517	279	238	196	175	83	63
	55-59 ans	460	256	204	78	60	178	144
	60-64 ans	572	321	251	74	51	247	200
	65-69 ans	564	331	233	73	44	258	189
	70-74 ans	438	253	185	35	35	218	150
	50-74 ans	2 551	1 440	1 111	456	365	984	746
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	247	108	139	78	104	30	35
	55-59 ans	194	86	108	18	28	68	80

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	204	86	118	12	25	74	93
	65-69 ans	187	77	110	15	18	62	92
	70-74 ans	156	72	84	10	17	62	67
	50-74 ans	988	429	559	133	192	296	367
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de	50.54	00	4.4	4.4	_	0	0	_
moins de 10 mm	50-54 ans	22	11	11	5	6	6	5
	55-59 ans	13	10	3	2	1	8	2
	60-64 ans	22	9	13	•	0	8	13
	65-69 ans	15	9	6	2	1	7	5
	70-74 ans	18	12	6	0	1	12	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-74 ans	90	51	39	10	9	41	30
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	70	51	19	31	14	20	5
	55-59 ans	78	54	24	21	10	33	14
	60-64 ans	109	72	37	22	11	50	26
	65-69 ans	104	73	31	16	2	57	29
	70-74 ans	82	56	26	9	3	47	23
	50-74 ans	443	306	137	99	40	207	97
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	141	88	53	65	40	23	13
od datio) dyani dotosto da monto un ddonomo dvanoo	55-59 ans	138	85	53	30	18	55	35
	60-64 ans	177	126	51	31	9	95	42
	65-69 ans	183	123	60	24	17	99	43
	70-74 ans	123	76	47	8	10	68	37
	50-74 ans	762	498	264	158	94	340	170
	30-7 - 7 ans	702	730	204	130	94	340	170
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	12	12	9	9	3	3

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	15	9	5	2	10	7
	60-64 ans	46	23	23	6	4	17	19
	65-69 ans	57	35	22	13	6	22	16
	70-74 ans	44	26	18	5	3	21	15
	50-74 ans	195	111	84	38	24	73	60
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	4	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	2	5	1	2	1	3
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	33	19	14	8	3	11	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie					_	_		
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	19	14	5	4	1	10	4
A27. Nambro do paragnas quant au maine un adánamo dátactá	50-54 ans	211	139	72	96	54	43	18
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans 55-59 ans	216	139	77	96 51	28	43 88	49
	60-64 ans	286	198	88		20	145	68
	65-69 ans	287	196	91	53 40	19	156	72
	70-74 ans	287 205	132	73	17	13	115	60
	50-74 ans	1 205	804	401	257	134	547	267

Effectifs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou								
présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	141	88	53	65	40	23	13
	55-59 ans	138	85	53	30	18	55	35
	60-64 ans	177	126	51	31	9	95	42
	65-69 ans	183	123	60	24	17	99	43
	70-74 ans	123	76	47	8	10	68	37
	50-74 ans	762	498	264	158	94	340	170
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	128	82	46	59	35	23	11
	55-59 ans	122	76	46	28	17	48	29
	60-64 ans	158	114	44	30	8	84	36
	65-69 ans	159	106	53	21	15	85	38
	70-74 ans	107	68	39	8	7	60	32
	50-74 ans	674	446	228	146	82	300	146
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	148	98	50	71	39	27	11
a. g. a.a.)	55-59 ans	146	97	49	33	18	64	31
	60-64 ans	187	138	49	37	9	101	40
	65-69 ans	197	135	62	30	16	105	46
	70-74 ans	129	85	44	12	8	73	36
	50-74 ans	807	553	254	183	90	370	164
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	12	12	9	9	3	3
7.20 Trombro do porosimios dyant an odinosi dotocto	55-59 ans	24	15	9	5	2	10	7
	60-64 ans	46	23	23	6	4	17	19
	65-69 ans	57	35	22	13	6	22	16
	70-74 ans	44	26	18	5	3	21	15
	50-74 ans	195	111	84	38	24	73	60
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade	00 1 1 4.10			•				
peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des	50.54	2-			_	-	-	
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	12	10	9	9	3	1
	55-59 ans	22	13	9	4	2	9	7
	60-64 ans	43	23	20	6	2	17	18
	65-69 ans	56	34	22	13	6	21	16
	70-74 ans	42	24	18	4	3	20	15

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	185	106	79	36	22	70	57
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	50.54	-		•			4	
inconnu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	19	8	11	4	2	4	9
	65-69 ans	23	15	8	7	3	8	5
	70-74 ans	13	7	6	0	2	7	4
400 N 1 TW	50-74 ans	71	40	31	15	10	25	21
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	8	7	6	7	2	0
(Stade incomin exclus)	55-59 ans			-		1		
		13	7	6	3	•	4	5
	60-64 ans	24	15	9	2	0	13	9
	65-69 ans	33	19	14	6	3	13	11
	70-74 ans	29	17	12	4	1	13	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM	50-74 ans	114	66	48	21	12	45	36
connu	50-54 ans	12	7	5	5	5	2	0
Ostilla	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	14	6	8	0	0	6	8
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	17	10	7	3	1	7	6
	50-74 ans	62	32	30	11	8	21	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
, to 1 1 to more the personness processing an early contains an early	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	10	9	1	2	0	7	1
	65-69 ans	17	10	7	3	2	7	5
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	52	34	18	10	4	24	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	00 1 1 4.10	02	•		.,	·•	_,	
1	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	21	10	11	2	2	8	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Sub	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	21	10	11	4	3	6	8
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	3	2	1	1
A00 N	50.54	04	4.4	40		•		
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	11	10	8	9	3	1
	55-59 ans	21	12	9	3	2	9	/
	60-64 ans	42	23	19	6	2	17	17
	65-69 ans	54	33	21	13	5	20	16
	70-74 ans	41	23	18	4	3	19	15
	50-74 ans	179	102	77	34	21	68	56
A40- Perdus de vue	50-54 ans	37	24	13	17	10	7	3
	55-59 ans	22	15	7	7	3	8	4
	60-64 ans	23	13	10	7	5	6	5
	65-69 ans	22	16	6	3	2	13	4
	70-74 ans	17	12	5	4	1	8	4
	50-74 ans	121	80	41	38	21	42	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total					Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable	F0 F4 and	0.0	6.0	F 0	7.0	0.0	F 0	4.0
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans 55-59 ans	6,3	6,9	5,9	7,3	6,3	5,9	4,9
	60-64 ans	6,7	6,8	6,6	8,0	8,0	6,5	6,2
	65-69 ans	6,2	6,0	6,3	7,9	8,1	5,5	5,9
	70-74 ans	5,8 6,8	5,7 6,3	5,8	8,9	6,9 10,8	5,1 5,6	5,6 6,7
		•	•	7,2	11,4	•	•	5, <i>7</i>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi	50-74 ans	6,3	6,4	6,3	7,9	7,1	5,7	5,9
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	0,9	1,2	0,6	0,2
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	1,3	1,1	0,7	0,7
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	1,3	1,4	0,4	0,3
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	1,5	1,9	0,4	0,6
	70-74 ans	1,7	1,7	1,6	4,3	3,4	1,4	1,4
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,3	1,4	0,6	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un		•	•	,	•	,	,	•
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	86,7	87,9	85,4	87,1	81,6	90,2	95,6
	55-59 ans	88,1	88,2	88,0	83,7	86,1	89,9	88,7
	60-64 ans	91,1	89,8	92,1	83,3	82,8	92,4	94,8
	65-69 ans	88,2	90,1	86,6	82,9	73,0	92,7	89,5
	70-74 ans	75,3	72,5	77,4	62,2	68,9	75,3	79,0
	50-74 ans	86,6	86,7	86,5	83,8	80,8	88,7	89,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes	50.54	4.0	4.0	0.7	4.0	4.0	4.0	2.2
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	4,9	3,7	4,9	4,0	4,8	2,9
	55-59 ans	4,4	5,5	3,5	7,2	4,8	5,0	3,2
	60-64 ans	5,4	6,8	4,2	7,7	5,0	6,5	4,1
	65-69 ans	5,3	6,9	4,0	9,0	5,5	6,5	3,7
	70-74 ans	6,9	8,5	5,5	10,6	9,4	8,3	5,0
	50-74 ans 50-74 ans **	5,1	6,3	4,1	6,4	4,7	6,3	3,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant	50-74 ans ***	5,1	6,2	4,1	-	-	-	-
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	98,4	100,0	100,0
5	55-59 ans	98,6	98,6	98,6	100,0	98,4	97,9	98,7
	60-64 ans	97,9	97,4	98,5	95,3	100,0	98,1	98,1
	65-69 ans	97,4	97,2	97,6	97,5	95,9	97,1	98,0
	70-74 ans	96,9	96,7	97,1	100,0	100,0	96,2	96,4
	50-74 ans	98,0	98,0	98,2	98,8	98,5	97,5	98,0
		,-	, -	, -	,-	, -	- ,-	,-

Indicateurs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
DOC Deuroentere de nerconnec quent eu une coloccenie envic								
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,6	90,9	92,5	90,7	93,0	91,2	91,2
un test positii (pariii les personnes engistes à la osioscopie)	55-59 ans	94,0	92,7	95,7	89,7	93,7	94,1	96,6
	60-64 ans	92,9	92,4	93,6	86,6	89,5	94,2	94,7
	65-69 ans	93,4	92,6	94,6	89,9	89,4	93,4	95,9
	70-74 ans	91,6	92,5	90,5	87,5	92,1	93,4	90,1
	50-74 ans	92,7	92,3 92,2	93,4	89,5	92,1	93,5	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie	30-74 alls	92,1	92,2	33,4	69,5	92,1	93,3	34,1
complète	50-54 ans	91,1	90,7	91,5	90,3	94,3	91,6	83,9
·	55-59 ans	91,4	92,1	90,5	96,2	89,8	90,3	90,8
	60-64 ans	91,1	92,1	89,9	94,4	92,2	91,4	89,3
	65-69 ans	89,7	90,2	89,0	85,9	88,1	91,3	89,2
	70-74 ans	89,2	89,4	88,9	82,9	80,0	90,5	91,0
	50-74 ans	90,5	90,9	90,0	90,7	91,1	91,0	89,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient		,-	,-		,-	, -	- 1,0	,-
(en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	3	5	4	4	3
	60-64 ans	4	4	4	5	3	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	3
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au								
patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50.54	405	407	400	4.40	405	404	400
jours)	50-54 ans	135	137	132	143	135	124	123
	55-59 ans	114	114	115	128	114	107	116
	60-64 ans	120	115	127	119	133	114	125
	65-69 ans	111	107	117	121	127	103	115
	70-74 ans	109	111	105	137	101	107	106
COA Délai médian (O1 O2) entre la réquitat divin tant et la	50-74 ans	118	117	120	132	127	109	117
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105 (69-150)	110 (72-154)	102 (62,5-146,5)	106,5 (70-157)	105 (62-150)	118 (80-147)	91 (67-137)
coloscopic (on Jours)	30-34 ans	103 (09-130)	110 (12-134)	102 (02,0-140,0)	100,5 (10-131)	100 (02-100)	110 (00-147)	91 (01-131)

Indicateurs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	94 (67-132)	92,5 (62-131)	97 (71-132)	86,5 (55-134)	90 (63-137)	93,5 (63-126,5)	103,5 (74-132)
	60-64 ans	95 (68-138)	93 (68-139)	96 (69-133)	91 (67-160)	92 (76-145)	93 (68-134)	97 (67-133)
	65-69 ans	96 (61-133)	94 (62-129)	98,5 (57,5-142)	100,5 (65-151)	113,5 (55-160)	92 (62-125)	98 (60-139)
	70-74 ans	95 (57-130)	96 (60-129)	94 (53-130)	96 (62-171)	84 (47-149)	96 (59-126)	96,5 (57-127)
	50-74 ans	96 (64-137)	96 (65-136)	98 (63-139)	99 (67-154)	100 (62-148)	95 (64-129)	97 (63-133)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	7,8	5,0	7,9	5,3	7,7	4,4
	55-59 ans	4,5	5,4	3,3	8,0	4,7	4,2	2,7
	60-64 ans	3,7	3,7	3,7	8,1	8,8	2,3	2,4
	65-69 ans	3,6	4,4	2,4	3,7	4,1	4,6	2,0
	70-74 ans	3,5	4,4	2,4	10,0	2,6	3,4	2,4
	50-74 ans	4,4	5,1	3,4	7,5	5,3	4,0	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	99,2	99,3	99,2	99,0	100,0	100,0	96,8
	55-59 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	98,3	99,4	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	98,0	100,0	99,0
	65-69 ans	99,1	98,5	100,0	97,2	100,0	98,8	100,0
	70-74 ans	98,6	98,4	98,9	97,1	100,0	98,6	98,6
	50-74 ans	99,2	99,2	99,3	98,9	99,4	99,3	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54	47.0	20.7	50.4	20.0	50.4	20.4	55.0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,8	38,7	58,4	39,8	59,4	36,1	55,6
	55-59 ans	42,2	33,6	52,9	23,1	46,7	38,2	55,6
	60-64 ans	35,7	26,8	47,0	16,2	49,0	30,0	46,5
	65-69 ans	33,2	23,3	47,2	20,5	40,9	24,0	48,7
	70-74 ans	35,6	28,5	45,4	28,6	48,6	28,4	44,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-74 ans	38,7	29,8	50,3	29,2	52,6	30,1	49,2
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	3,9	4,6	2,6	3,4	7,2	7,9
	55-59 ans	2,8	3,9	1,5	2,6	1,7	4,5	1,4
	60-64 ans	3,8	2,8	5,2	1,4	0,0	3,2	6,5
	65-69 ans	2,7	2,7	2,6	2,7	2,3	2,7	2,6
	70-74 ans	4,1	4,7	3,2	0,0	2,9	5,5	3,3
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	2,2	2,5	4,2	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un		.,.	.,.	-7-	,	,-	,	,-
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	1,4	0,0	0,4	0,0

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome non avancé	50-54 ans	13,5	18,3	8,0	15,8	8,0	24,1	7,9
addition from available	55-59 ans	17,0	21,1	11,8	26,9	16,7	18,5	9,7
	60-64 ans	19,1	22,4	14,7	29,7	21,6	20,2	13,0
	65-69 ans	18,4	22,1	13,3	21,9	4,5	22,1	15,3
	70-74 ans	18,7	22,1	14,1	25,7	8,6	21,6	15,3
	50-74 ans	17,4	21,3	12,3	21,7	11,0	21,0	13,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	55 1 1 4.1.5	,.	,0	,•	,.	,•	,0	10,0
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé	50-54 ans	27,3	31,5	22,3	33,2	22,9	27,7	20,6
	55-59 ans	30,0	33,2	26,0	38,5	30,0	30,9	24,3
	60-64 ans	30,9	39,3	20,3	41,9	17,6	38,5	21,0
	65-69 ans	32,4	37,2	25,8	32,9	38,6	38,4	22,8
	70-74 ans	28,1	30,0	25,4	22,9	28,6	31,2	24,7
	50-74 ans	29,9	34,6	23,8	34,6	25,8	34,6	22,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54	4.0	4.0	5.0	4.0	F.4	2.2	4.0
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	4,3	5,0	4,6	5,1	3,6	4,8
	55-59 ans	5,2	5,9	4,4	6,4	3,3	5,6	4,9
	60-64 ans	8,0	7,2	9,2	8,1	7,8	6,9	9,5
	65-69 ans	10,1	10,6	9,4	17,8	13,6	8,5	8,5
	70-74 ans	10,0	10,3	9,7	14,3	8,6	9,6	10,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-74 ans	7,6	7,7	7,6	8,3	6,6	7,4	8,0
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de								
lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
, , , , ,	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3
				,	,	,-		,
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI	50-54 ans	4.0	4.4	0.4	2.0	0.0	0.0	4.0
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)		1,0	1,4	0,4	2,0	0,0	0,0	1,6
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,6	0,7

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,2	0,6	2,0	1,4	3,9	0,4	1,5
	65-69 ans	1,8	1,8	1,7	2,7	0,0	1,6	2,1
	70-74 ans	2,1	2,4	1,6	2,9	2,9	2,3	1,3
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,8	0,8	1,1	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8,0	1,1	0,4	1,0	0,0	1,2	1,6
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	1,7	0,6	0,0
	60-64 ans	0,5	0,3	0,8	0,0	0,0	0,4	1,0
	65-69 ans	0,9	1,5	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0
	70-74 ans	1,1	1,6	0,5	2,9	0,0	1,4	0,7
	50-74 ans	0,7	1,0	0,5	0,9	0,3	1,0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,8	22,1	10,2	21,8	11,4	22,7	7,8
biti- Taux d'adenomes detectes pour 1000 personnes depistees	55-59 ans	19,5	27,7	12,7	42,1	20,9	23,1	10,4
	60-64 ans	24,9	38,3	13,9	47,3	17,6	35,8	13,1
	65-69 ans	25,2	37,5	14,7	44,3	21,3	36,1	13,6
	70-74 ans	29,4	40,9	19,4	44,3 44,9	32,3	40,4	17,9
	50-74 ans	29,4	32,2	13,7	32,0	15,7	32,3	12,8
	50-74 ans **	22,2	31,8	13,7	32,0	15,7	32,3	12,6
	30-74 alls	22,4	31,0	13,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 :								
adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	14,0	7,5	14,8	8,4	12,1	5,6
	55-59 ans	12,5	16,9	8,8	24,8	13,5	14,5	7,4
	60-64 ans	15,4	24,3	8,1	27,7	7,9	23,4	8,1
	65-69 ans	16,1	23,5	9,7	26,6	19,1	22,9	8,1
	70-74 ans	17,6	23,6	12,5	21,1	24,8	23,9	11,0
	50-74 ans	14,0	20,0	9,0	19,7	11,0	20,1	8,2
	50-74 ans **	14,1	19,6	9,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :	50.54	0.0	40.0	0.5	40.4	7.4	40.4	4.0
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	13,0	6,5	13,4	7,4	12,1	4,8
	55-59 ans	11,0	15,1	7,6	23,1	12,7	12,6	6,2
	60-64 ans	13,7	22,0	6,9	26,8	7,0	20,7	6,9
	65-69 ans	14,0	20,3	8,6	23,3	16,8	19,7	7,2
	70-74 ans	15,3	21,1	10,4	21,1	17,4	21,1	9,5
	50-74 ans	12,4	17,9	7,8	18,2	9,6	17,7	7,0
	50-74 ans **	12,5	17,6	7,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période 2016-2017	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	11,1	15,6	7,1	16,1	8,2	14,2	4,8
	55-59 ans	13,2	19,3	8,1	27,2	13,5	16,8	6,6
	60-64 ans	16,3	26,7	7,7	33,0	7,9	24,9	7,7
	65-69 ans	17,3	25,8	10,0	33,2	18,0	24,3	8,7
	70-74 ans	18,5	26,3	11,7	31,7	19,9	25,6	10,7
	50-74 ans	14,9	22,2	8,7	22,8	10,6	21,9	7,9
	50-74 ans **	15,0	21,9	8,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,0	1,9	1,6	1,3
	55-59 ans	2,2	3,0	1,5	4,1	1,5	2,6	1,5
	60-64 ans	4,0	4,4	3,6	5,4	3,5	4,2	3,7
	65-69 ans	5,0	6,7	3,6	14,4	6,7	5,1	3,0
	70-74 ans	6,3	8,1	4,8	13,2	7,4	7,4	4,5
	50-74 ans	3,6	4,4	2,9	4,7	2,8	4,3	2,9
	50-74 ans **	3,5	4,3	2,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	31,8	33,3	30,0	33,3	22,2	33,3	100,0
	55-59 ans	40,9	46,2	33,3	25,0	50,0	55,6	28,6
	60-64 ans	44,2	34,8	55,0	66,7	100,0	23,5	50,0
	65-69 ans	41,1	44,1	36,4	53,8	50,0	38,1	31,3
	70-74 ans	31,0	29,2	33,3	0,0	66,7	35,0	26,7
	50-74 ans	38,4	37,7	39,2	41,7	45,5	35,7	36,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)