

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 29 - Finistère

1/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes    | Total         |               | Dépistage initial <sup>s</sup> |               | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                  |               | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes        | Hommes                              | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 19 549        | 9 138         | 10 411        | 6 205                          | 6 883         | 2 933                               | 3 528         |
|   | 55-59 ans        | 16 501        | 7 754         | 8 747         | 1 860                          | 2 070         | 5 894                               | 6 677         |
|   | 60-64 ans        | 17 823        | 8 251         | 9 572         | 1 472                          | 1 679         | 6 779                               | 7 893         |
|   | 65-69 ans        | 18 746        | 8 528         | 10 218        | 1 221                          | 1 238         | 7 307                               | 8 980         |
|   | 70-74 ans        | 11 803        | 5 294         | 6 509         | 528                            | 592           | 4 766                               | 5 917         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>84 422</b> | <b>38 965</b> | <b>45 457</b> | <b>11 286</b>                  | <b>12 462</b> | <b>27 679</b>                       | <b>32 995</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 1 670         | 832           | 838           | 644                            | 635           | 188                                 | 203           |
|   | 55-59 ans        | 1 332         | 663           | 669           | 201                            | 209           | 462                                 | 460           |
|   | 60-64 ans        | 1 273         | 579           | 694           | 149                            | 153           | 430                                 | 541           |
|   | 65-69 ans        | 1 385         | 624           | 761           | 117                            | 126           | 507                                 | 635           |
|   | 70-74 ans        | 968           | 420           | 548           | 50                             | 62            | 370                                 | 486           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6 628</b>  | <b>3 118</b>  | <b>3 510</b>  | <b>1 161</b>                   | <b>1 185</b>  | <b>1 957</b>                        | <b>2 325</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 1 179         | 580           | 599           | 430                            | 435           | 150                                 | 164           |
|   | 55-59 ans        | 1 026         | 508           | 518           | 140                            | 138           | 368                                 | 380           |
|   | 60-64 ans        | 981           | 446           | 535           | 104                            | 110           | 342                                 | 425           |
|   | 65-69 ans        | 1 091         | 498           | 593           | 81                             | 79            | 417                                 | 514           |
|   | 70-74 ans        | 679           | 303           | 376           | 28                             | 33            | 275                                 | 343           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 956</b>  | <b>2 335</b>  | <b>2 621</b>  | <b>783</b>                     | <b>795</b>    | <b>1 552</b>                        | <b>1 826</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 491           | 252           | 239           | 214                            | 200           | 38                                  | 39            |
|   | 55-59 ans        | 306           | 155           | 151           | 61                             | 71            | 94                                  | 80            |
|   | 60-64 ans        | 292           | 133           | 159           | 45                             | 43            | 88                                  | 116           |
|   | 65-69 ans        | 294           | 126           | 168           | 36                             | 47            | 90                                  | 121           |
|   | 70-74 ans        | 289           | 117           | 172           | 22                             | 29            | 95                                  | 143           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 672</b>  | <b>783</b>    | <b>889</b>    | <b>378</b>                     | <b>390</b>    | <b>405</b>                          | <b>499</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 19 058        | 8 886         | 10 172        | 5 991                          | 6 683         | 2 895                               | 3 489         |
|   | 55-59 ans        | 16 195        | 7 599         | 8 596         | 1 799                          | 1 999         | 5 800                               | 6 597         |
|   | 60-64 ans        | 17 531        | 8 118         | 9 413         | 1 427                          | 1 636         | 6 691                               | 7 777         |
|   | 65-69 ans        | 18 452        | 8 402         | 10 050        | 1 185                          | 1 191         | 7 217                               | 8 859         |
|   | 70-74 ans        | 11 514        | 5 177         | 6 337         | 506                            | 563           | 4 671                               | 5 774         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>82 750</b> | <b>38 182</b> | <b>44 568</b> | <b>10 908</b>                  | <b>12 072</b> | <b>27 274</b>                       | <b>32 496</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 669           | 392           | 277           | 271                            | 179           | 121                                 | 98            |
|   | 55-59 ans        | 645           | 396           | 249           | 108                            | 59            | 288                                 | 190           |
|   | 60-64 ans        | 733           | 441           | 292           | 81                             | 59            | 360                                 | 233           |
|   | 65-69 ans        | 924           | 572           | 352           | 120                            | 58            | 452                                 | 294           |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 29 - Finistère

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|   |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
|   | 70-74 ans        | 669          | 367          | 302          | 49                             | 35         | 318                                 | 267          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 640</b> | <b>2 168</b> | <b>1 472</b> | <b>629</b>                     | <b>390</b> | <b>1 539</b>                        | <b>1 082</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 664          | 389          | 275          | 269                            | 178        | 120                                 | 97           |
|   | 55-59 ans        | 642          | 395          | 247          | 107                            | 59         | 288                                 | 188          |
|   | 60-64 ans        | 725          | 438          | 287          | 80                             | 56         | 358                                 | 231          |
|   | 65-69 ans        | 919          | 571          | 348          | 120                            | 57         | 451                                 | 291          |
|   | 70-74 ans        | 662          | 365          | 297          | 49                             | 34         | 316                                 | 263          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 612</b> | <b>2 158</b> | <b>1 454</b> | <b>625</b>                     | <b>384</b> | <b>1 533</b>                        | <b>1 070</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 633          | 372          | 261          | 258                            | 169        | 114                                 | 92           |
|   | 55-59 ans        | 598          | 367          | 231          | 94                             | 54         | 273                                 | 177          |
|   | 60-64 ans        | 691          | 418          | 273          | 71                             | 53         | 347                                 | 220          |
|   | 65-69 ans        | 870          | 546          | 324          | 112                            | 51         | 434                                 | 273          |
|   | 70-74 ans        | 624          | 346          | 278          | 44                             | 31         | 302                                 | 247          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 416</b> | <b>2 049</b> | <b>1 367</b> | <b>579</b>                     | <b>358</b> | <b>1 470</b>                        | <b>1 009</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 618          | 362          | 256          | 251                            | 165        | 111                                 | 91           |
|   | 55-59 ans        | 584          | 360          | 224          | 93                             | 53         | 267                                 | 171          |
|   | 60-64 ans        | 668          | 404          | 264          | 69                             | 52         | 335                                 | 212          |
|   | 65-69 ans        | 854          | 540          | 314          | 111                            | 47         | 429                                 | 267          |
|   | 70-74 ans        | 600          | 333          | 267          | 37                             | 31         | 296                                 | 236          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 324</b> | <b>1 999</b> | <b>1 325</b> | <b>561</b>                     | <b>348</b> | <b>1 438</b>                        | <b>977</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>     |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>     |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 29 - Finistère

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|  |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 633          | 372          | 261          | 258                            | 169        | 114                                 | 92           |
|  | 55-59 ans        | 593          | 365          | 228          | 94                             | 53         | 271                                 | 175          |
|  | 60-64 ans        | 687          | 418          | 269          | 71                             | 52         | 347                                 | 217          |
|  | 65-69 ans        | 865          | 545          | 320          | 112                            | 49         | 433                                 | 271          |
|  | 70-74 ans        | 619          | 344          | 275          | 42                             | 31         | 302                                 | 244          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 397</b> | <b>2 044</b> | <b>1 353</b> | <b>577</b>                     | <b>354</b> | <b>1 467</b>                        | <b>999</b>   |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|  | 55-59 ans        | 5            | 2            | 3            | 0                              | 1          | 2                                   | 2            |
|  | 60-64 ans        | 4            | 0            | 4            | 0                              | 1          | 0                                   | 3            |
|  | 65-69 ans        | 5            | 1            | 4            | 0                              | 2          | 1                                   | 2            |
|  | 70-74 ans        | 5            | 2            | 3            | 2                              | 0          | 0                                   | 3            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>19</b>    | <b>5</b>     | <b>14</b>    | <b>2</b>                       | <b>4</b>   | <b>3</b>                            | <b>10</b>    |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 2            | 2            | 0            | 0                              | 0          | 2                                   | 0            |
|  | 55-59 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                              | 0          | 1                                   | 0            |
|  | 60-64 ans        | 5            | 4            | 1            | 2                              | 1          | 2                                   | 0            |
|  | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|  | 70-74 ans        | 3            | 1            | 2            | 0                              | 1          | 1                                   | 1            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>11</b>    | <b>8</b>     | <b>3</b>     | <b>2</b>                       | <b>2</b>   | <b>6</b>                            | <b>1</b>     |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   | 50-54 ans        | 633          | 372          | 261          | 258                            | 169        | 114                                 | 92           |
|  | 55-59 ans        | 598          | 367          | 231          | 94                             | 54         | 273                                 | 177          |
|  | 60-64 ans        | 691          | 418          | 273          | 71                             | 53         | 347                                 | 220          |
|  | 65-69 ans        | 870          | 546          | 324          | 112                            | 51         | 434                                 | 273          |
|  | 70-74 ans        | 624          | 346          | 278          | 44                             | 31         | 302                                 | 247          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 416</b> | <b>2 049</b> | <b>1 367</b> | <b>579</b>                     | <b>358</b> | <b>1 470</b>                        | <b>1 009</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 635          | 374          | 261          | 258                            | 169        | 116                                 | 92           |
|  | 55-59 ans        | 599          | 368          | 231          | 94                             | 54         | 274                                 | 177          |
|  | 60-64 ans        | 696          | 422          | 274          | 73                             | 54         | 349                                 | 220          |
|  | 65-69 ans        | 870          | 546          | 324          | 112                            | 51         | 434                                 | 273          |
|  | 70-74 ans        | 627          | 347          | 280          | 44                             | 32         | 303                                 | 248          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 427</b> | <b>2 057</b> | <b>1 370</b> | <b>581</b>                     | <b>360</b> | <b>1 476</b>                        | <b>1 010</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       | 50-54 ans        | 243          | 129          | 114          | 87                             | 72         | 42                                  | 42           |
|  | 55-59 ans        | 184          | 92           | 92           | 16                             | 22         | 76                                  | 70           |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 29 - Finistère

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |              | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | 60-64 ans        | 175          | 73         | 102        | 13                             | 21         | 60                                  | 81         |
|   | 65-69 ans        | 186          | 93         | 93         | 17                             | 12         | 76                                  | 81         |
|   | 70-74 ans        | 117          | 54         | 63         | 11                             | 9          | 43                                  | 54         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>905</b>   | <b>441</b> | <b>464</b> | <b>144</b>                     | <b>136</b> | <b>297</b>                          | <b>328</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 64           | 41         | 23         | 27                             | 16         | 14                                  | 7          |
|   | 55-59 ans        | 58           | 34         | 24         | 11                             | 8          | 23                                  | 16         |
|   | 60-64 ans        | 59           | 34         | 25         | 5                              | 1          | 29                                  | 24         |
|   | 65-69 ans        | 73           | 44         | 29         | 5                              | 3          | 39                                  | 26         |
|   | 70-74 ans        | 41           | 23         | 18         | 2                              | 2          | 21                                  | 16         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>295</b>   | <b>176</b> | <b>119</b> | <b>50</b>                      | <b>30</b>  | <b>126</b>                          | <b>89</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 6            | 3          | 3          | 3                              | 0          | 0                                   | 3          |
|   | 55-59 ans        | 7            | 4          | 3          | 2                              | 1          | 2                                   | 2          |
|   | 60-64 ans        | 9            | 7          | 2          | 2                              | 0          | 5                                   | 2          |
|   | 65-69 ans        | 9            | 8          | 1          | 0                              | 1          | 8                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 8            | 6          | 2          | 0                              | 0          | 6                                   | 2          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>39</b>    | <b>28</b>  | <b>11</b>  | <b>7</b>                       | <b>2</b>   | <b>21</b>                           | <b>9</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 115          | 72         | 43         | 49                             | 30         | 23                                  | 13         |
|   | 55-59 ans        | 118          | 79         | 39         | 22                             | 12         | 57                                  | 27         |
|   | 60-64 ans        | 130          | 88         | 42         | 10                             | 8          | 78                                  | 34         |
|   | 65-69 ans        | 177          | 118        | 59         | 26                             | 8          | 92                                  | 51         |
|   | 70-74 ans        | 146          | 87         | 59         | 8                              | 8          | 79                                  | 51         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>686</b>   | <b>444</b> | <b>242</b> | <b>115</b>                     | <b>66</b>  | <b>329</b>                          | <b>176</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 152          | 98         | 54         | 71                             | 37         | 27                                  | 17         |
|   | 55-59 ans        | 153          | 109        | 44         | 32                             | 6          | 77                                  | 38         |
|   | 60-64 ans        | 254          | 172        | 82         | 37                             | 22         | 135                                 | 60         |
|   | 65-69 ans        | 293          | 200        | 93         | 43                             | 18         | 157                                 | 75         |
|   | 70-74 ans        | 203          | 114        | 89         | 13                             | 9          | 101                                 | 80         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 055</b> | <b>693</b> | <b>362</b> | <b>196</b>                     | <b>92</b>  | <b>497</b>                          | <b>270</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 37           | 21         | 16         | 12                             | 8          | 9                                   | 8          |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 29 - Finistère

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total        |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |              | Hommes       | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | 55-59 ans        | 64           | 41           | 23         | 9                              | 5          | 32                                  | 18         |
|   | 60-64 ans        | 63           | 45           | 18         | 5                              | 1          | 40                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 105          | 67           | 38         | 16                             | 7          | 51                                  | 31         |
|   | 70-74 ans        | 85           | 48           | 37         | 8                              | 4          | 40                                  | 33         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>354</b>   | <b>222</b>   | <b>132</b> | <b>50</b>                      | <b>25</b>  | <b>172</b>                          | <b>107</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)     | 50-54 ans        | 12           | 5            | 7          | 5                              | 6          | 0                                   | 1          |
|   | 55-59 ans        | 11           | 7            | 4          | 2                              | 0          | 5                                   | 4          |
|   | 60-64 ans        | 5            | 2            | 3          | 1                              | 1          | 1                                   | 2          |
|   | 65-69 ans        | 17           | 9            | 8          | 3                              | 2          | 6                                   | 6          |
|   | 70-74 ans        | 15           | 7            | 8          | 2                              | 0          | 5                                   | 8          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>60</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>  | <b>13</b>                      | <b>9</b>   | <b>17</b>                           | <b>21</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 6            | 5            | 1          | 4                              | 0          | 1                                   | 1          |
|   | 55-59 ans        | 4            | 2            | 2          | 0                              | 0          | 2                                   | 2          |
|   | 60-64 ans        | 1            | 1            | 0          | 0                              | 0          | 1                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 9            | 6            | 3          | 2                              | 0          | 4                                   | 3          |
|   | 70-74 ans        | 12           | 8            | 4          | 0                              | 0          | 8                                   | 4          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>32</b>    | <b>22</b>    | <b>10</b>  | <b>6</b>                       | <b>0</b>   | <b>16</b>                           | <b>10</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 1            | 1            | 0          | 0                              | 0          | 1                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0            | 0            | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>1</b>                            | <b>0</b>   |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 267          | 170          | 97         | 120                            | 67         | 50                                  | 30         |
|   | 55-59 ans        | 271          | 188          | 83         | 54                             | 18         | 134                                 | 65         |
|   | 60-64 ans        | 384          | 260          | 124        | 47                             | 30         | 213                                 | 94         |
|   | 65-69 ans        | 470          | 318          | 152        | 69                             | 26         | 249                                 | 126        |
|   | 70-74 ans        | 349          | 201          | 148        | 21                             | 17         | 180                                 | 131        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 741</b> | <b>1 137</b> | <b>604</b> | <b>311</b>                     | <b>158</b> | <b>826</b>                          | <b>446</b> |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 29 - Finistère

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |              | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes     |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)           | 50-54 ans        | 152          | 98         | 54         | 71                             | 37        | 27                                  | 17         |
|   | 55-59 ans        | 153          | 109        | 44         | 32                             | 6         | 77                                  | 38         |
|   | 60-64 ans        | 254          | 172        | 82         | 37                             | 22        | 135                                 | 60         |
|   | 65-69 ans        | 293          | 200        | 93         | 43                             | 18        | 157                                 | 75         |
|   | 70-74 ans        | 203          | 114        | 89         | 13                             | 9         | 101                                 | 80         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 055</b> | <b>693</b> | <b>362</b> | <b>196</b>                     | <b>92</b> | <b>497</b>                          | <b>270</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 135          | 85         | 50         | 60                             | 35        | 25                                  | 15         |
|   | 55-59 ans        | 130          | 91         | 39         | 27                             | 5         | 64                                  | 34         |
|   | 60-64 ans        | 200          | 135        | 65         | 30                             | 18        | 105                                 | 47         |
|   | 65-69 ans        | 221          | 151        | 70         | 37                             | 14        | 114                                 | 56         |
|   | 70-74 ans        | 165          | 97         | 68         | 11                             | 5         | 86                                  | 63         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>851</b>   | <b>559</b> | <b>292</b> | <b>165</b>                     | <b>77</b> | <b>394</b>                          | <b>215</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 159          | 103        | 56         | 72                             | 39        | 31                                  | 17         |
|   | 55-59 ans        | 163          | 119        | 44         | 37                             | 5         | 82                                  | 39         |
|   | 60-64 ans        | 253          | 173        | 80         | 37                             | 20        | 136                                 | 60         |
|   | 65-69 ans        | 318          | 222        | 96         | 50                             | 17        | 172                                 | 79         |
|   | 70-74 ans        | 222          | 134        | 88         | 12                             | 8         | 122                                 | 80         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 115</b> | <b>751</b> | <b>364</b> | <b>208</b>                     | <b>89</b> | <b>543</b>                          | <b>275</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté  | 50-54 ans        | 37           | 21         | 16         | 12                             | 8         | 9                                   | 8          |
|   | 55-59 ans        | 64           | 41         | 23         | 9                              | 5         | 32                                  | 18         |
|   | 60-64 ans        | 63           | 45         | 18         | 5                              | 1         | 40                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 105          | 67         | 38         | 16                             | 7         | 51                                  | 31         |
|   | 70-74 ans        | 85           | 48         | 37         | 8                              | 4         | 40                                  | 33         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>354</b>   | <b>222</b> | <b>132</b> | <b>50</b>                      | <b>25</b> | <b>172</b>                          | <b>107</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 36           | 21         | 15         | 12                             | 7         | 9                                   | 8          |
|   | 55-59 ans        | 62           | 40         | 22         | 9                              | 5         | 31                                  | 17         |
|   | 60-64 ans        | 62           | 44         | 18         | 5                              | 1         | 39                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 100          | 64         | 36         | 15                             | 7         | 49                                  | 29         |
|   | 70-74 ans        | 84           | 48         | 36         | 8                              | 4         | 40                                  | 32         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 29 - Finistère

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
|  |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes     |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>344</b> | <b>217</b> | <b>127</b> | <b>49</b>                      | <b>24</b> | <b>168</b>                          | <b>103</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                     | 50-54 ans        | 6          | 2          | 4          | 0                              | 2         | 2                                   | 2          |
|  | 55-59 ans        | 10         | 4          | 6          | 0                              | 1         | 4                                   | 5          |
|  | 60-64 ans        | 16         | 13         | 3          | 3                              | 0         | 10                                  | 3          |
|  | 65-69 ans        | 26         | 18         | 8          | 4                              | 4         | 14                                  | 4          |
|  | 70-74 ans        | 15         | 10         | 5          | 0                              | 0         | 10                                  | 5          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>73</b>  | <b>47</b>  | <b>26</b>  | <b>7</b>                       | <b>7</b>  | <b>40</b>                           | <b>19</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans        | 30         | 19         | 11         | 12                             | 5         | 7                                   | 6          |
|  | 55-59 ans        | 51         | 35         | 16         | 9                              | 4         | 26                                  | 12         |
|  | 60-64 ans        | 46         | 31         | 15         | 2                              | 1         | 29                                  | 14         |
|  | 65-69 ans        | 74         | 46         | 28         | 11                             | 3         | 35                                  | 25         |
|  | 70-74 ans        | 69         | 38         | 31         | 8                              | 4         | 30                                  | 27         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>270</b> | <b>169</b> | <b>101</b> | <b>42</b>                      | <b>17</b> | <b>127</b>                          | <b>84</b>  |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 16         | 12         | 4          | 7                              | 2         | 5                                   | 2          |
|  | 55-59 ans        | 22         | 14         | 8          | 5                              | 1         | 9                                   | 7          |
|  | 60-64 ans        | 24         | 15         | 9          | 1                              | 1         | 14                                  | 8          |
|  | 65-69 ans        | 42         | 24         | 18         | 7                              | 3         | 17                                  | 15         |
|  | 70-74 ans        | 47         | 21         | 26         | 6                              | 4         | 15                                  | 22         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>151</b> | <b>86</b>  | <b>65</b>  | <b>26</b>                      | <b>11</b> | <b>60</b>                           | <b>54</b>  |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 14         | 7          | 7          | 5                              | 3         | 2                                   | 4          |
|  | 55-59 ans        | 29         | 21         | 8          | 4                              | 3         | 17                                  | 5          |
|  | 60-64 ans        | 22         | 16         | 6          | 1                              | 0         | 15                                  | 6          |
|  | 65-69 ans        | 32         | 22         | 10         | 4                              | 0         | 18                                  | 10         |
|  | 70-74 ans        | 22         | 17         | 5          | 2                              | 0         | 15                                  | 5          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>119</b> | <b>83</b>  | <b>36</b>  | <b>16</b>                      | <b>6</b>  | <b>67</b>                           | <b>30</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1                     | 50-54 ans        | 12         | 9          | 3          | 5                              | 2         | 4                                   | 1          |
|  | 55-59 ans        | 11         | 7          | 4          | 3                              | 1         | 4                                   | 3          |
|  | 60-64 ans        | 12         | 7          | 5          | 1                              | 1         | 6                                   | 4          |
|  | 65-69 ans        | 21         | 13         | 8          | 2                              | 2         | 11                                  | 6          |
|  | 70-74 ans        | 19         | 7          | 12         | 0                              | 2         | 7                                   | 10         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>75</b>  | <b>43</b>  | <b>32</b>  | <b>11</b>                      | <b>8</b>  | <b>32</b>                           | <b>24</b>  |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2                     | 50-54 ans        | 2          | 2          | 0          | 1                              | 0         | 1                                   | 0          |
|  | 55-59 ans        | 4          | 2          | 2          | 1                              | 0         | 1                                   | 2          |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 29 - Finistère

| Effectifs sur la période 2016-2017                                |                  | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Age   | Hommes           |            | Femmes     | Hommes     | Femmes                         | Hommes    | Femmes                              |            |
|   | 60-64 ans        | 6          | 4          | 2          | 0                              | 0         | 4                                   | 2          |
|   | 65-69 ans        | 6          | 5          | 1          | 2                              | 0         | 3                                   | 1          |
|   | 70-74 ans        | 16         | 7          | 9          | 3                              | 2         | 4                                   | 7          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>34</b>  | <b>20</b>  | <b>14</b>  | <b>7</b>                       | <b>2</b>  | <b>13</b>                           | <b>12</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>3 | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0          | 1                              | 0         | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 6          | 4          | 2          | 1                              | 0         | 3                                   | 2          |
|   | 60-64 ans        | 4          | 2          | 2          | 0                              | 0         | 2                                   | 2          |
|   | 65-69 ans        | 12         | 5          | 7          | 2                              | 1         | 3                                   | 6          |
|   | 70-74 ans        | 10         | 6          | 4          | 2                              | 0         | 4                                   | 4          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>33</b>  | <b>18</b>  | <b>15</b>  | <b>6</b>                       | <b>1</b>  | <b>12</b>                           | <b>14</b>  |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>4 | 50-54 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                              | 0         | 0                                   | 1          |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                              | 0         | 1                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 2          | 2          | 0          | 0                              | 0         | 2                                   | 0          |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1          | 2          | 1                              | 0         | 0                                   | 2          |
|   | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                              | 0         | 0                                   | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>5</b>   | <b>4</b>   | <b>2</b>                       | <b>0</b>  | <b>3</b>                            | <b>4</b>   |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu     | 50-54 ans        | 33         | 20         | 13         | 12                             | 5         | 8                                   | 8          |
|   | 55-59 ans        | 61         | 39         | 22         | 9                              | 5         | 30                                  | 17         |
|   | 60-64 ans        | 61         | 43         | 18         | 4                              | 1         | 39                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 94         | 61         | 33         | 14                             | 7         | 47                                  | 26         |
|   | 70-74 ans        | 81         | 45         | 36         | 8                              | 4         | 37                                  | 32         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>330</b> | <b>208</b> | <b>122</b> | <b>47</b>                      | <b>22</b> | <b>161</b>                          | <b>100</b> |
| A40- Perdus de vue  | 50-54 ans        | 11         | 5          | 6          | 4                              | 3         | 1                                   | 3          |
|   | 55-59 ans        | 17         | 14         | 3          | 6                              | 2         | 8                                   | 1          |
|   | 60-64 ans        | 14         | 6          | 8          | 4                              | 2         | 2                                   | 6          |
|   | 65-69 ans        | 18         | 8          | 10         | 3                              | 4         | 5                                   | 6          |
|   | 70-74 ans        | 12         | 6          | 6          | 3                              | 0         | 3                                   | 6          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>72</b>  | <b>39</b>  | <b>33</b>  | <b>20</b>                      | <b>11</b> | <b>19</b>                           | <b>22</b>  |

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 29 - Finistère

9/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 8,5         | 9,1         | 8,0         | 10,4                           | 9,2         | 6,4                                 | 5,8         |
|  | 55-59 ans        | 8,1         | 8,6         | 7,6         | 10,8                           | 10,1        | 7,8                                 | 6,9         |
|  | 60-64 ans        | 7,1         | 7,0         | 7,3         | 10,1                           | 9,1         | 6,3                                 | 6,9         |
|  | 65-69 ans        | 7,4         | 7,3         | 7,4         | 9,6                            | 10,2        | 6,9                                 | 7,1         |
|  | 70-74 ans        | 8,2         | 7,9         | 8,4         | 9,5                            | 10,5        | 7,8                                 | 8,2         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>7,9</b>  | <b>8,0</b>  | <b>7,7</b>  | <b>10,3</b>                    | <b>9,5</b>  | <b>7,1</b>                          | <b>7,0</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 2,5         | 2,8         | 2,3         | 3,4                            | 2,9         | 1,3                                 | 1,1         |
|  | 55-59 ans        | 1,9         | 2,0         | 1,7         | 3,3                            | 3,4         | 1,6                                 | 1,2         |
|  | 60-64 ans        | 1,6         | 1,6         | 1,7         | 3,1                            | 2,6         | 1,3                                 | 1,5         |
|  | 65-69 ans        | 1,6         | 1,5         | 1,6         | 2,9                            | 3,8         | 1,2                                 | 1,3         |
|  | 70-74 ans        | 2,4         | 2,2         | 2,6         | 4,2                            | 4,9         | 2,0                                 | 2,4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>3,3</b>                     | <b>3,1</b>  | <b>1,5</b>                          | <b>1,5</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 70,6        | 69,7        | 71,5        | 66,8                           | 68,5        | 79,8                                | 80,8        |
|  | 55-59 ans        | 77,0        | 76,6        | 77,4        | 69,7                           | 66,0        | 79,7                                | 82,6        |
|  | 60-64 ans        | 77,1        | 77,0        | 77,1        | 69,8                           | 71,9        | 79,5                                | 78,6        |
|  | 65-69 ans        | 78,8        | 79,8        | 77,9        | 69,2                           | 62,7        | 82,2                                | 80,9        |
|  | 70-74 ans        | 70,1        | 72,1        | 68,6        | 56,0                           | 53,2        | 74,3                                | 70,6        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>74,8</b> | <b>74,9</b> | <b>74,7</b> | <b>67,4</b>                    | <b>67,1</b> | <b>79,3</b>                         | <b>78,5</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 3,5         | 4,4         | 2,7         | 4,5                            | 2,7         | 4,2                                 | 2,8         |
|  | 55-59 ans        | 4,0         | 5,2         | 2,9         | 6,0                            | 3,0         | 5,0                                 | 2,9         |
|  | 60-64 ans        | 4,2         | 5,4         | 3,1         | 5,7                            | 3,6         | 5,4                                 | 3,0         |
|  | 65-69 ans        | 5,0         | 6,8         | 3,5         | 10,1                           | 4,9         | 6,3                                 | 3,3         |
|  | 70-74 ans        | 5,8         | 7,1         | 4,8         | 9,7                            | 6,2         | 6,8                                 | 4,6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4,4</b>  | <b>5,7</b>  | <b>3,3</b>  | <b>5,8</b>                     | <b>3,2</b>  | <b>5,6</b>                          | <b>3,3</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>  | <b>4,4</b>       | <b>5,5</b>  | <b>3,3</b>  | -           | -                              | -           | -                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 99,3        | 99,2        | 99,3        | 99,3                           | 99,4        | 99,2                                | 99,0        |
|  | 55-59 ans        | 99,5        | 99,7        | 99,2        | 99,1                           | 100,0       | 100,0                               | 98,9        |
|  | 60-64 ans        | 98,9        | 99,3        | 98,3        | 98,8                           | 94,9        | 99,4                                | 99,1        |
|  | 65-69 ans        | 99,5        | 99,8        | 98,9        | 100,0                          | 98,3        | 99,8                                | 99,0        |
|  | 70-74 ans        | 99,0        | 99,5        | 98,3        | 100,0                          | 97,1        | 99,4                                | 98,5        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>99,2</b> | <b>99,5</b> | <b>98,8</b> | <b>99,4</b>                    | <b>98,5</b> | <b>99,6</b>                         | <b>98,9</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 29 - Finistère

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes     | Total          |                | Dépistage initial <sup>s</sup> |                | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|   |                  |                | Hommes         | Femmes         | Hommes                         | Femmes         | Hommes                              | Femmes         |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 95,3           | 95,6           | 94,9           | 95,9                           | 94,9           | 95,0                                | 94,8           |
|   | 55-59 ans        | 93,1           | 92,9           | 93,5           | 87,9                           | 91,5           | 94,8                                | 94,1           |
|   | 60-64 ans        | 95,3           | 95,4           | 95,1           | 88,8                           | 94,6           | 96,9                                | 95,2           |
|   | 65-69 ans        | 94,7           | 95,6           | 93,1           | 93,3                           | 89,5           | 96,2                                | 93,8           |
|   | 70-74 ans        | 94,3           | 94,8           | 93,6           | 89,8                           | 91,2           | 95,6                                | 93,9           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>94,6</b>    | <b>94,9</b>    | <b>94,0</b>    | <b>92,6</b>                    | <b>93,2</b>    | <b>95,9</b>                         | <b>94,3</b>    |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 97,6           | 97,3           | 98,1           | 97,3                           | 97,6           | 97,4                                | 98,9           |
|   | 55-59 ans        | 97,7           | 98,1           | 97,0           | 98,9                           | 98,1           | 97,8                                | 96,6           |
|   | 60-64 ans        | 96,7           | 96,7           | 96,7           | 97,2                           | 98,1           | 96,5                                | 96,4           |
|   | 65-69 ans        | 98,2           | 98,9           | 96,9           | 99,1                           | 92,2           | 98,8                                | 97,8           |
|   | 70-74 ans        | 96,2           | 96,2           | 96,0           | 84,1                           | 100,0          | 98,0                                | 95,5           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>97,3</b>    | <b>97,6</b>    | <b>96,9</b>    | <b>96,9</b>                    | <b>97,2</b>    | <b>97,8</b>                         | <b>96,8</b>    |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)   | 50-54 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|   | 55-59 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|   | 60-64 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|   | 65-69 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|   | 70-74 ans        | 0              | 0              | 0              | 0                              | 0              | 0                                   | 0              |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)                                      | 50-54 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|   | 55-59 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|   | 60-64 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|   | 65-69 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|   | 70-74 ans        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                        | 0 (0-0)        | 0 (0-0)                             | 0 (0-0)        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b>                 | <b>0 (0-0)</b> | <b>0 (0-0)</b>                      | <b>0 (0-0)</b> |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)  | 50-54 ans        | 103            | 108            | 97             | 108                            | 102            | 108                                 | 86             |
|   | 55-59 ans        | 84             | 85             | 82             | 93                             | 78             | 83                                  | 83             |
|   | 60-64 ans        | 87             | 88             | 86             | 82                             | 94             | 89                                  | 84             |
|   | 65-69 ans        | 92             | 92             | 93             | 89                             | 84             | 93                                  | 95             |
|   | 70-74 ans        | 88             | 92             | 82             | 93                             | 81             | 92                                  | 82             |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>91</b>      | <b>93</b>      | <b>88</b>      | <b>98</b>                      | <b>93</b>      | <b>91</b>                           | <b>86</b>      |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)   | 50-54 ans        | 74 (53-115)    | 75 (52,5-119)  | 73 (54-109)    | 76 (53-129)                    | 73 (54-111)    | 69 (52-112)                         | 77 (50-108,5)  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 29 - Finistère

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes         | Total              |                    | Dépistage initial <sup>§</sup> |                    | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                   |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
|   |                  |                    | Hommes             | Femmes             | Hommes                         | Femmes             | Hommes                              | Femmes            |
|   | 55-59 ans        | 68 (48-99)         | 69 (49-101)        | 66 (46-97)         | 70,5 (48-101)                  | 58 (42-95)         | 68 (50-98)                          | 68 (48-97)        |
|   | 60-64 ans        | 70 (49-104)        | 70 (50-104)        | 68 (47-104)        | 69 (51-93)                     | 65 (43-112)        | 70 (50-110)                         | 68,5 (48,5-98,5)  |
|   | 65-69 ans        | 70 (52-105)        | 73 (54-108)        | 68 (47-99)         | 67 (48,5-112,5)                | 72 (47-107)        | 74 (55-108)                         | 68 (48-98)        |
|   | 70-74 ans        | 70 (51-101,5)      | 72 (54-105)        | 68 (49-98)         | 66 (56,5-89)                   | 62 (38-102)        | 72,5 (53-108)                       | 69 (50-97)        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>70 (50-105)</b> | <b>72 (53-108)</b> | <b>69 (49-103)</b> | <b>73 (51-110)</b>             | <b>69 (48-109)</b> | <b>71,5 (53-107)</b>                | <b>69 (49-99)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue   | 50-54 ans        | 1,6                | 1,3                | 2,2                | 1,5                            | 1,7                | 0,8                                 | 3,1               |
|   | 55-59 ans        | 2,6                | 3,5                | 1,2                | 5,6                            | 3,4                | 2,8                                 | 0,5               |
|   | 60-64 ans        | 1,9                | 1,4                | 2,7                | 4,9                            | 3,4                | 0,6                                 | 2,6               |
|   | 65-69 ans        | 1,9                | 1,4                | 2,8                | 2,5                            | 6,9                | 1,1                                 | 2,0               |
|   | 70-74 ans        | 1,8                | 1,6                | 2,0                | 6,1                            | 0,0                | 0,9                                 | 2,2               |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2,0</b>         | <b>1,8</b>         | <b>2,2</b>         | <b>3,2</b>                     | <b>2,8</b>         | <b>1,2</b>                          | <b>2,0</b>        |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                          | 100,0              | 100,0                               | 100,0             |
|   | 55-59 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                          | 100,0              | 100,0                               | 100,0             |
|   | 60-64 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                          | 100,0              | 100,0                               | 100,0             |
|   | 65-69 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                          | 100,0              | 100,0                               | 100,0             |
|   | 70-74 ans        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                          | 100,0              | 100,0                               | 100,0             |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>                   | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>      |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 38,3               | 34,5               | 43,7               | 33,7                           | 42,6               | 36,2                                | 45,7              |
|   | 55-59 ans        | 30,7               | 25,0               | 39,8               | 17,0                           | 40,7               | 27,7                                | 39,5              |
|   | 60-64 ans        | 25,1               | 17,3               | 37,2               | 17,8                           | 38,9               | 17,2                                | 36,8              |
|   | 65-69 ans        | 21,4               | 17,0               | 28,7               | 15,2                           | 23,5               | 17,5                                | 29,7              |
|   | 70-74 ans        | 18,7               | 15,6               | 22,5               | 25,0                           | 28,1               | 14,2                                | 21,8              |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>26,4</b>        | <b>21,4</b>        | <b>33,9</b>        | <b>24,8</b>                    | <b>37,8</b>        | <b>20,1</b>                         | <b>32,5</b>       |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 10,1               | 11,0               | 8,8                | 10,5                           | 9,5                | 12,1                                | 7,6               |
|   | 55-59 ans        | 9,7                | 9,2                | 10,4               | 11,7                           | 14,8               | 8,4                                 | 9,0               |
|   | 60-64 ans        | 8,5                | 8,1                | 9,1                | 6,8                            | 1,9                | 8,3                                 | 10,9              |
|   | 65-69 ans        | 8,4                | 8,1                | 9,0                | 4,5                            | 5,9                | 9,0                                 | 9,5               |
|   | 70-74 ans        | 6,5                | 6,6                | 6,4                | 4,5                            | 6,3                | 6,9                                 | 6,5               |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8,6</b>         | <b>8,6</b>         | <b>8,7</b>         | <b>8,6</b>                     | <b>8,3</b>         | <b>8,5</b>                          | <b>8,8</b>        |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,9                | 0,8                | 1,1                | 1,2                            | 0,0                | 0,0                                 | 3,3               |
|   | 55-59 ans        | 1,2                | 1,1                | 1,3                | 2,1                            | 1,9                | 0,7                                 | 1,1               |
|   | 60-64 ans        | 1,3                | 1,7                | 0,7                | 2,7                            | 0,0                | 1,4                                 | 0,9               |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 29 - Finistère

| Indicateurs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>s</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|  | 65-69 ans        | 1,0         | 1,5         | 0,3         | 0,0                            | 2,0         | 1,8                                 | 0,0         |
|  | 70-74 ans        | 1,3         | 1,7         | 0,7         | 0,0                            | 0,0         | 2,0                                 | 0,8         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,1</b>  | <b>1,4</b>  | <b>0,8</b>  | <b>1,2</b>                     | <b>0,6</b>  | <b>1,4</b>                          | <b>0,9</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 18,1        | 19,3        | 16,5        | 19,0                           | 17,8        | 19,8                                | 14,1        |
|  | 55-59 ans        | 19,7        | 21,5        | 16,9        | 23,4                           | 22,2        | 20,8                                | 15,3        |
|  | 60-64 ans        | 18,7        | 20,9        | 15,3        | 13,7                           | 14,8        | 22,3                                | 15,5        |
|  | 65-69 ans        | 20,3        | 21,6        | 18,2        | 23,2                           | 15,7        | 21,2                                | 18,7        |
|  | 70-74 ans        | 23,3        | 25,1        | 21,1        | 18,2                           | 25,0        | 26,1                                | 20,6        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>20,0</b> | <b>21,6</b> | <b>17,7</b> | <b>19,8</b>                    | <b>18,3</b> | <b>22,3</b>                         | <b>17,4</b> |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 23,9        | 26,2        | 20,7        | 27,5                           | 21,9        | 23,3                                | 18,5        |
|  | 55-59 ans        | 25,5        | 29,6        | 19,0        | 34,0                           | 11,1        | 28,1                                | 21,5        |
|  | 60-64 ans        | 36,5        | 40,8        | 29,9        | 50,7                           | 40,7        | 38,7                                | 27,3        |
|  | 65-69 ans        | 33,7        | 36,6        | 28,7        | 38,4                           | 35,3        | 36,2                                | 27,5        |
|  | 70-74 ans        | 32,4        | 32,9        | 31,8        | 29,5                           | 28,1        | 33,3                                | 32,3        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>30,8</b> | <b>33,7</b> | <b>26,4</b> | <b>33,7</b>                    | <b>25,6</b> | <b>33,7</b>                         | <b>26,7</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer  | 50-54 ans        | 5,8         | 5,6         | 6,1         | 4,7                            | 4,7         | 7,8                                 | 8,7         |
|  | 55-59 ans        | 10,7        | 11,1        | 10,0        | 9,6                            | 9,3         | 11,7                                | 10,2        |
|  | 60-64 ans        | 9,1         | 10,7        | 6,6         | 6,8                            | 1,9         | 11,5                                | 7,7         |
|  | 65-69 ans        | 12,1        | 12,3        | 11,7        | 14,3                           | 13,7        | 11,8                                | 11,4        |
|  | 70-74 ans        | 13,6        | 13,8        | 13,2        | 18,2                           | 12,5        | 13,2                                | 13,3        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>10,3</b> | <b>10,8</b> | <b>9,6</b>  | <b>8,6</b>                     | <b>6,9</b>  | <b>11,7</b>                         | <b>10,6</b> |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 1,9         | 1,3         | 2,7         | 1,9                            | 3,6         | 0,0                                 | 1,1         |
|  | 55-59 ans        | 1,8         | 1,9         | 1,7         | 2,1                            | 0,0         | 1,8                                 | 2,3         |
|  | 60-64 ans        | 0,7         | 0,5         | 1,1         | 1,4                            | 1,9         | 0,3                                 | 0,9         |
|  | 65-69 ans        | 2,0         | 1,6         | 2,5         | 2,7                            | 3,9         | 1,4                                 | 2,2         |
|  | 70-74 ans        | 2,4         | 2,0         | 2,9         | 4,5                            | 0,0         | 1,7                                 | 3,2         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,8</b>  | <b>1,5</b>  | <b>2,2</b>  | <b>2,2</b>                     | <b>2,5</b>  | <b>1,2</b>                          | <b>2,1</b>  |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 0,9         | 1,3         | 0,4         | 1,6                            | 0,0         | 0,9                                 | 1,1         |
|  | 55-59 ans        | 0,7         | 0,5         | 0,9         | 0,0                            | 0,0         | 0,7                                 | 1,1         |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 29 - Finistère

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|   | 60-64 ans           | 0,1         | 0,2         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,3                                 | 0,0         |
|   | 65-69 ans           | 1,0         | 1,1         | 0,9         | 1,8                            | 0,0         | 0,9                                 | 1,1         |
|   | 70-74 ans           | 1,9         | 2,3         | 1,4         | 0,0                            | 0,0         | 2,6                                 | 1,6         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,9</b>  | <b>1,1</b>  | <b>0,7</b>  | <b>1,0</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>1,1</b>                          | <b>1,0</b>  |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu  | 50-54 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|   | 55-59 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|   | 60-64 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|   | 65-69 ans           | 0,1         | 0,2         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,2                                 | 0,0         |
|   | 70-74 ans           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,1</b>                          | <b>0,0</b>  |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 14,0        | 19,1        | 9,5         | 20,0                           | 10,0        | 17,3                                | 8,6         |
|   | 55-59 ans           | 16,7        | 24,7        | 9,7         | 30,0                           | 9,0         | 23,1                                | 9,9         |
|   | 60-64 ans           | 21,9        | 32,0        | 13,2        | 32,9                           | 18,3        | 31,8                                | 12,1        |
|   | 65-69 ans           | 25,5        | 37,8        | 15,1        | 58,2                           | 21,8        | 34,5                                | 14,2        |
|   | 70-74 ans           | 30,3        | 38,8        | 23,4        | 41,5                           | 30,2        | 38,5                                | 22,7        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>21,0</b> | <b>29,8</b> | <b>13,6</b> | <b>28,5</b>                    | <b>13,1</b> | <b>30,3</b>                         | <b>13,7</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>20,7</b> | <b>28,7</b> | <b>13,3</b> | -                              | -           | -                                   | -           |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 8,0         | 11,0        | 5,3         | 11,9                           | 5,5         | 9,3                                 | 4,9         |
|   | 55-59 ans           | 9,4         | 14,3        | 5,1         | 17,8                           | 3,0         | 13,3                                | 5,8         |
|   | 60-64 ans           | 14,5        | 21,2        | 8,7         | 25,9                           | 13,4        | 20,2                                | 7,7         |
|   | 65-69 ans           | 15,9        | 23,8        | 9,3         | 36,3                           | 15,1        | 21,8                                | 8,5         |
|   | 70-74 ans           | 17,6        | 22,0        | 14,0        | 25,7                           | 16,0        | 21,6                                | 13,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>12,7</b> | <b>18,1</b> | <b>8,1</b>  | <b>18,0</b>                    | <b>7,6</b>  | <b>18,2</b>                         | <b>8,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>12,5</b> | <b>17,4</b> | <b>7,9</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 7,1         | 9,6         | 4,9         | 10,0                           | 5,2         | 8,6                                 | 4,3         |
|   | 55-59 ans           | 8,0         | 12,0        | 4,5         | 15,0                           | 2,5         | 11,0                                | 5,2         |
|   | 60-64 ans           | 11,4        | 16,6        | 6,9         | 21,0                           | 11,0        | 15,7                                | 6,0         |
|   | 65-69 ans           | 12,0        | 18,0        | 7,0         | 31,2                           | 11,8        | 15,8                                | 6,3         |
|   | 70-74 ans           | 14,3        | 18,7        | 10,7        | 21,7                           | 8,9         | 18,4                                | 10,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>10,3</b> | <b>14,6</b> | <b>6,6</b>  | <b>15,1</b>                    | <b>6,4</b>  | <b>14,4</b>                         | <b>6,6</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>10,1</b> | <b>14,2</b> | <b>6,4</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 29 - Finistère

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 8,3         | 11,6        | 5,5         | 12,0                           | 5,8         | 10,7                                | 4,9         |
|   | 55-59 ans           | 10,1        | 15,7        | 5,1         | 20,6                           | 2,5         | 14,1                                | 5,9         |
|   | 60-64 ans           | 14,4        | 21,3        | 8,5         | 25,9                           | 12,2        | 20,3                                | 7,7         |
|   | 65-69 ans           | 17,2        | 26,4        | 9,6         | 42,2                           | 14,3        | 23,8                                | 8,9         |
|   | 70-74 ans           | 19,3        | 25,9        | 13,9        | 23,7                           | 14,2        | 26,1                                | 13,9        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>13,5</b> | <b>19,7</b> | <b>8,2</b>  | <b>19,1</b>                    | <b>7,4</b>  | <b>19,9</b>                         | <b>8,5</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>13,1</b> | <b>18,8</b> | <b>7,9</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 1,9         | 2,4         | 1,6         | 2,0                            | 1,2         | 3,1                                 | 2,3         |
|   | 55-59 ans           | 4,0         | 5,4         | 2,7         | 5,0                            | 2,5         | 5,5                                 | 2,7         |
|   | 60-64 ans           | 3,6         | 5,5         | 1,9         | 3,5                            | 0,6         | 6,0                                 | 2,2         |
|   | 65-69 ans           | 5,7         | 8,0         | 3,8         | 13,5                           | 5,9         | 7,1                                 | 3,5         |
|   | 70-74 ans           | 7,4         | 9,3         | 5,8         | 15,8                           | 7,1         | 8,6                                 | 5,7         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>4,3</b>  | <b>5,8</b>  | <b>3,0</b>  | <b>4,6</b>                     | <b>2,1</b>  | <b>6,3</b>                          | <b>3,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>4,2</b>  | <b>5,6</b>  | <b>2,9</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu   | 50-54 ans           | 16,7        | 9,5         | 26,7        | 0,0                            | 28,6        | 22,2                                | 25,0        |
|   | 55-59 ans           | 16,1        | 10,0        | 27,3        | 0,0                            | 20,0        | 12,9                                | 29,4        |
|   | 60-64 ans           | 25,8        | 29,5        | 16,7        | 60,0                           | 0,0         | 25,6                                | 17,6        |
|   | 65-69 ans           | 26,0        | 28,1        | 22,2        | 26,7                           | 57,1        | 28,6                                | 13,8        |
|   | 70-74 ans           | 17,9        | 20,8        | 13,9        | 0,0                            | 0,0         | 25,0                                | 15,6        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>21,2</b> | <b>21,7</b> | <b>20,5</b> | <b>14,3</b>                    | <b>29,2</b> | <b>23,8</b>                         | <b>18,4</b> |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)