

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 36 - Indre

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 429	2 594	2 835	1 763	1 863	831	972
	55-59 ans	4 535	2 095	2 440	596	576	1 499	1 864
	60-64 ans	5 181	2 441	2 740	678	609	1 763	2 131
	65-69 ans	5 515	2 558	2 957	537	591	2 021	2 366
	70-74 ans	3 720	1 725	1 995	310	325	1 415	1 670
	<b>50-74 ans</b>	<b>24 380</b>	<b>11 413</b>	<b>12 967</b>	<b>3 884</b>	<b>3 964</b>	<b>7 529</b>	<b>9 003</b>
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	356	172	184	120	127	52
55-59 ans		303	151	152	53	35	98	117
60-64 ans		334	161	173	62	47	99	126
65-69 ans		351	166	185	48	55	118	130
70-74 ans		257	110	147	30	32	80	115
<b>50-74 ans</b>		<b>1 601</b>	<b>760</b>	<b>841</b>	<b>313</b>	<b>296</b>	<b>447</b>	<b>545</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	272	134	138	88	92	46
	55-59 ans	245	120	125	41	26	79	99
	60-64 ans	279	135	144	51	35	84	109
	65-69 ans	296	140	156	39	43	101	113
	70-74 ans	208	86	122	23	24	63	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 300</b>	<b>615</b>	<b>685</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>465</b>
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	38	46	32	35	6
55-59 ans		58	31	27	12	9	19	18
60-64 ans		55	26	29	11	12	15	17
65-69 ans		55	26	29	9	12	17	17
70-74 ans		49	24	25	7	8	17	17
<b>50-74 ans</b>		<b>301</b>	<b>145</b>	<b>156</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>80</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	5 345	2 556	2 789	1 731	1 828	825
	55-59 ans	4 477	2 064	2 413	584	567	1 480	1 846
	60-64 ans	5 126	2 415	2 711	667	597	1 748	2 114
	65-69 ans	5 460	2 532	2 928	528	579	2 004	2 349
	70-74 ans	3 671	1 701	1 970	303	317	1 398	1 653
	<b>50-74 ans</b>	<b>24 079</b>	<b>11 268</b>	<b>12 811</b>	<b>3 813</b>	<b>3 888</b>	<b>7 455</b>	<b>8 923</b>
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	226	133	93	97	68	36
55-59 ans		197	118	79	46	23	72	56
60-64 ans		257	152	105	43	25	109	80
65-69 ans		313	206	107	57	23	149	84

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 36 - Indre

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	228	135	93	30	28	105	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 221</b>	<b>744</b>	<b>477</b>	<b>273</b>	<b>167</b>	<b>471</b>	<b>310</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	225	132	93	96	68	36	25
	55-59 ans	196	118	78	46	22	72	56
	60-64 ans	254	151	103	43	25	108	78
	65-69 ans	308	202	106	55	23	147	83
	70-74 ans	225	132	93	28	28	104	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 208</b>	<b>735</b>	<b>473</b>	<b>268</b>	<b>166</b>	<b>467</b>	<b>307</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	204	121	83	87	58	34	25
	55-59 ans	177	103	74	39	20	64	54
	60-64 ans	231	134	97	37	24	97	73
	65-69 ans	284	182	102	49	23	133	79
	70-74 ans	198	117	81	24	23	93	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 094</b>	<b>657</b>	<b>437</b>	<b>236</b>	<b>148</b>	<b>421</b>	<b>289</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	202	120	82	86	57	34	25
	55-59 ans	173	101	72	39	19	62	53
	60-64 ans	227	130	97	36	24	94	73
	65-69 ans	271	171	100	46	23	125	77
	70-74 ans	191	116	75	24	20	92	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 064</b>	<b>638</b>	<b>426</b>	<b>231</b>	<b>143</b>	<b>407</b>	<b>283</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 36 - Indre

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	204	121	83	87	58	34	25
	55-59 ans	177	103	74	39	20	64	54
	60-64 ans	230	133	97	37	24	96	73
	65-69 ans	284	182	102	49	23	133	79
	70-74 ans	197	116	81	24	23	92	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 092</b>	<b>655</b>	<b>437</b>	<b>236</b>	<b>148</b>	<b>419</b>	<b>289</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	204	121	83	87	58	34	25
	55-59 ans	177	103	74	39	20	64	54
	60-64 ans	231	134	97	37	24	97	73
	65-69 ans	284	182	102	49	23	133	79
	70-74 ans	198	117	81	24	23	93	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 094</b>	<b>657</b>	<b>437</b>	<b>236</b>	<b>148</b>	<b>421</b>	<b>289</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	205	121	84	87	59	34	25
	55-59 ans	178	103	75	39	21	64	54
	60-64 ans	231	134	97	37	24	97	73
	65-69 ans	284	182	102	49	23	133	79
	70-74 ans	200	119	81	25	23	94	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 098</b>	<b>659</b>	<b>439</b>	<b>237</b>	<b>150</b>	<b>422</b>	<b>289</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	23	38	15	27	8	11
	55-59 ans	62	28	34	13	11	15	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	61	20	41	5	13	15	28
	65-69 ans	78	33	45	10	8	23	37
	70-74 ans	47	23	24	4	4	19	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>309</b>	<b>127</b>	<b>182</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>119</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	9	7	7	4	2	3
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	18	12	6	4	0	8	6
	65-69 ans	22	14	8	6	3	8	5
	70-74 ans	12	8	4	3	2	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	35	25	10	20	10	5	0
	55-59 ans	36	22	14	5	1	17	13
	60-64 ans	53	34	19	8	4	26	15
	65-69 ans	58	41	17	12	4	29	13
	70-74 ans	36	21	15	4	5	17	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>143</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>51</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	71	51	20	35	14	16	6
	55-59 ans	45	34	11	14	4	20	7
	60-64 ans	83	61	22	19	6	42	16
	65-69 ans	98	73	25	15	7	58	18
	70-74 ans	74	55	19	12	4	43	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>371</b>	<b>274</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>179</b>	<b>62</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	9	5	7	2	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 36 - Indre

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	6	12	1	4	5	8
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	24	9	15	2	8	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>27</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	106	76	30	55	24	21	6
	55-59 ans	81	56	25	19	5	37	20
	60-64 ans	136	95	41	27	10	68	31
	65-69 ans	156	114	42	27	11	87	31
	70-74 ans	110	76	34	16	9	60	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>589</b>	<b>417</b>	<b>172</b>	<b>144</b>	<b>59</b>	<b>273</b>	<b>113</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

6/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	71	51	20	35	14	16	6
	55-59 ans	45	34	11	14	4	20	7
	60-64 ans	83	61	22	19	6	42	16
	65-69 ans	98	73	25	15	7	58	18
	70-74 ans	74	55	19	12	4	43	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>371</b>	<b>274</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>179</b>	<b>62</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	37	16	27	11	10	5
	55-59 ans	37	28	9	11	3	17	6
	60-64 ans	55	40	15	9	5	31	10
	65-69 ans	72	57	15	12	6	45	9
	70-74 ans	53	39	14	11	4	28	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>270</b>	<b>201</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>131</b>	<b>40</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	62	42	20	32	15	10	5
	55-59 ans	46	36	10	13	3	23	7
	60-64 ans	81	65	16	22	5	43	11
	65-69 ans	95	74	21	16	9	58	12
	70-74 ans	68	50	18	11	5	39	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>352</b>	<b>267</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>37</b>	<b>173</b>	<b>48</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	7	2	2	3
	55-59 ans	18	6	12	1	4	5	8
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	23	18	5	6	1	12	4
	70-74 ans	24	9	15	2	8	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>27</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	7	5	5	2	2	3
	55-59 ans	15	4	11	0	4	4	7
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	19	15	4	4	1	11	3
	70-74 ans	23	9	14	2	8	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>24</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	5	2	2	2
	55-59 ans	14	4	10	0	4	4	6
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	17	14	3	4	1	10	2
	70-74 ans	23	9	14	2	8	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>21</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	5	4	5	2	0	2
	55-59 ans	10	3	7	0	3	3	4
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	11	9	2	2	1	7	1
	70-74 ans	13	3	10	1	7	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	3	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	7	2	5	1	5	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	5	2	2	3
	55-59 ans	15	4	11	0	4	4	7
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	19	15	4	4	1	11	3
	70-74 ans	23	9	14	2	8	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>24</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	12	6	6	1	2	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 36 - Indre

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,6	6,5	6,8	6,8	6,3	5,9
	55-59 ans	6,7	7,2	6,2	8,9	6,1	6,5	6,3
	60-64 ans	6,4	6,6	6,3	9,1	7,7	5,6	5,9
	65-69 ans	6,4	6,5	6,3	8,9	9,3	5,8	5,5
	70-74 ans	6,9	6,4	7,4	9,7	9,8	5,7	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	0,7	1,1
	55-59 ans	1,3	1,5	1,1	2,0	1,6	1,3	1,0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	1,6	2,0	0,9	0,8
	65-69 ans	1,0	1,0	1,0	1,7	2,0	0,8	0,7
	70-74 ans	1,3	1,4	1,3	2,3	2,5	1,2	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,4	77,9	75,0	73,3	72,4	88,5	80,7
	55-59 ans	80,9	79,5	82,2	77,4	74,3	80,6	84,6
	60-64 ans	83,5	83,9	83,2	82,3	74,5	84,8	86,5
	65-69 ans	84,3	84,3	84,3	81,3	78,2	85,6	86,9
	70-74 ans	80,9	78,2	83,0	76,7	75,0	78,8	85,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,2</b>	<b>80,9</b>	<b>81,5</b>	<b>77,3</b>	<b>74,3</b>	<b>83,4</b>	<b>85,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	5,2	3,3	5,6	3,7	4,4	2,6
	55-59 ans	4,4	5,7	3,3	7,9	4,1	4,9	3,0
	60-64 ans	5,0	6,3	3,9	6,4	4,2	6,2	3,8
	65-69 ans	5,7	8,1	3,7	10,8	4,0	7,4	3,6
	70-74 ans	6,2	7,9	4,7	9,9	8,8	7,5	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>3,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>3,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,2	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	95,7	100,0	100,0
	60-64 ans	98,8	99,3	98,1	100,0	100,0	99,1	97,5
	65-69 ans	98,4	98,1	99,1	96,5	100,0	98,7	98,8
	70-74 ans	98,7	97,8	100,0	93,3	100,0	99,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99,2</b>	<b>98,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	91,7	89,2	90,6	85,3	94,4	100,0
	55-59 ans	90,3	87,3	94,9	84,8	90,9	88,9	96,4
	60-64 ans	90,9	88,7	94,2	86,0	96,0	89,8	93,6
	65-69 ans	92,2	90,1	96,2	89,1	100,0	90,5	95,2
	70-74 ans	88,0	88,6	87,1	85,7	82,1	89,4	89,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,6</b>	<b>89,4</b>	<b>92,4</b>	<b>88,1</b>	<b>89,2</b>	<b>90,1</b>	<b>94,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,0	99,2	98,8	98,9	98,3	100,0	100,0
	55-59 ans	97,7	98,1	97,3	100,0	95,0	96,9	98,1
	60-64 ans	98,3	97,0	100,0	97,3	100,0	96,9	100,0
	65-69 ans	95,4	94,0	98,0	93,9	100,0	94,0	97,5
	70-74 ans	96,5	99,1	92,6	100,0	87,0	98,9	94,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,3</b>	<b>97,1</b>	<b>97,5</b>	<b>97,9</b>	<b>96,6</b>	<b>96,7</b>	<b>97,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	124	109	124	105	126	118
	55-59 ans	121	119	124	122	99	117	133
	60-64 ans	125	111	144	94	193	118	128
	65-69 ans	106	101	114	101	106	101	116
	70-74 ans	119	120	117	95	107	127	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>123</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100 (71-131)	105 (71-145)	95 (74-120)	108 (71-145)	95 (67-120)	99 (66-136)	101 (79-120)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95 (72-124)	98 (70-142)	90,5 (73-122)	91 (63-110)	90 (75-116)	103 (71-158,5)	96 (73-122)
	60-64 ans	91 (67-133)	88 (65-133)	93 (69-132)	83 (65-126)	99 (61,5-179)	92 (66-138)	92 (70-116)
	65-69 ans	92,5 (71,5-124)	92,5 (68-121)	92,5 (77-131)	88 (67-125)	89 (46-117)	95 (69-121)	95 (79-139)
	70-74 ans	89 (66-126)	89 (67-134)	89 (66-123)	77,5 (61-111,5)	83 (59-143)	92 (68-136)	90 (68-123)
	<b>50-74 ans</b>	<b>93 (69-126)</b>	<b>95 (67-128)</b>	<b>92 (72-124)</b>	<b>92 (66,5-129)</b>	<b>90 (65,5-126,5)</b>	<b>95 (68-128)</b>	<b>92 (73-123)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,2	0,8	4,3	1,0	5,9	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,2	0,0	2,2	0,0	5,6	0,0
	60-64 ans	2,3	3,9	0,0	4,7	0,0	3,7	0,0
	65-69 ans	1,9	2,4	0,9	0,0	0,0	3,4	1,2
	70-74 ans	5,3	4,4	6,5	3,3	7,1	4,8	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	29,8	19,0	45,2	17,2	45,8	23,5	44,0
	55-59 ans	34,8	27,2	45,3	33,3	52,4	23,4	42,6
	60-64 ans	26,4	14,9	42,3	13,5	54,2	15,5	38,4
	65-69 ans	27,5	18,1	44,1	20,4	34,8	17,3	46,8
	70-74 ans	23,5	19,3	29,6	16,0	17,4	20,2	34,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,1</b>	<b>19,3</b>	<b>41,5</b>	<b>19,8</b>	<b>42,0</b>	<b>19,0</b>	<b>41,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,8	7,4	8,3	8,0	6,8	5,9	12,0
	55-59 ans	4,5	4,9	4,0	5,1	4,8	4,7	3,7
	60-64 ans	7,8	9,0	6,2	10,8	0,0	8,2	8,2
	65-69 ans	7,7	7,7	7,8	12,2	13,0	6,0	6,3
	70-74 ans	6,0	6,7	4,9	12,0	8,7	5,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	70-74 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,1	20,7	11,9	23,0	16,9	14,7	0,0
	55-59 ans	20,2	21,4	18,7	12,8	4,8	26,6	24,1
	60-64 ans	22,9	25,4	19,6	21,6	16,7	26,8	20,5
	65-69 ans	20,4	22,5	16,7	24,5	17,4	21,8	16,5
	70-74 ans	18,0	17,6	18,5	16,0	21,7	18,1	17,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>21,7</b>	<b>17,1</b>	<b>20,7</b>	<b>16,0</b>	<b>22,3</b>	<b>17,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,6	42,1	23,8	40,2	23,7	47,1	24,0
	55-59 ans	25,3	33,0	14,7	35,9	19,0	31,3	13,0
	60-64 ans	35,9	45,5	22,7	51,4	25,0	43,3	21,9
	65-69 ans	34,5	40,1	24,5	30,6	30,4	43,6	22,8
	70-74 ans	37,0	46,2	23,5	48,0	17,4	45,7	25,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,8</b>	<b>41,6</b>	<b>22,1</b>	<b>40,1</b>	<b>23,3</b>	<b>42,4</b>	<b>21,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	7,4	6,0	8,0	3,4	5,9	12,0
	55-59 ans	10,1	5,8	16,0	2,6	19,0	7,8	14,8
	60-64 ans	4,3	3,7	5,2	2,7	0,0	4,1	6,8
	65-69 ans	7,7	9,3	4,9	12,2	4,3	8,3	5,1
	70-74 ans	12,0	7,6	18,5	8,0	34,8	7,4	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,6</b>	<b>7,2</b>	<b>10,0</b>	<b>6,9</b>	<b>9,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	2,5	3,6	2,3	1,7	2,9	8,0
	55-59 ans	2,2	3,9	0,0	7,7	0,0	1,6	0,0
	60-64 ans	1,7	0,7	3,1	0,0	4,2	1,0	2,7
	65-69 ans	1,8	1,6	2,0	0,0	0,0	2,3	2,5
	70-74 ans	2,5	1,7	3,7	0,0	0,0	2,1	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,0	1,3	0,0	0,0	1,6	1,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	0,7	1,0	0,0	0,0	1,0	1,4
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	19,8	29,7	10,8	31,8	13,1	25,5	6,2
	55-59 ans	18,1	27,1	10,4	32,5	8,8	25,0	10,8
	60-64 ans	26,5	39,3	15,1	40,5	16,8	38,9	14,7
	65-69 ans	28,6	45,0	14,3	51,1	19,0	43,4	13,2
	70-74 ans	30,0	44,7	17,3	52,8	28,4	42,9	15,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,5</b>	<b>37,0</b>	<b>13,4</b>	<b>37,8</b>	<b>15,2</b>	<b>36,6</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>23,8</b>	<b>35,4</b>	<b>13,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,3	20,0	7,2	20,2	7,7	19,4	6,2
	55-59 ans	10,1	16,5	4,6	24,0	7,1	13,5	3,8
	60-64 ans	16,2	25,3	8,1	28,5	10,1	24,0	7,6
	65-69 ans	17,9	28,8	8,5	28,4	12,1	28,9	7,7
	70-74 ans	20,2	32,3	9,6	39,6	12,6	30,8	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>24,3</b>	<b>7,6</b>	<b>24,9</b>	<b>9,0</b>	<b>24,0</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,9</b>	<b>23,2</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	14,5	5,7	15,6	6,0	12,1	5,2
	55-59 ans	8,3	13,6	3,7	18,8	5,3	11,5	3,3
	60-64 ans	10,7	16,6	5,5	13,5	8,4	17,7	4,7
	65-69 ans	13,2	22,5	5,1	22,7	10,4	22,5	3,8
	70-74 ans	14,4	22,9	7,1	36,3	12,6	20,0	6,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>17,8</b>	<b>5,4</b>	<b>18,4</b>	<b>7,5</b>	<b>17,6</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,9</b>	<b>17,0</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,6	16,4	7,2	18,5	8,2	12,1	5,2
	55-59 ans	10,3	17,4	4,1	22,3	5,3	15,5	3,8
	60-64 ans	15,8	26,9	5,9	33,0	8,4	24,6	5,2
	65-69 ans	17,4	29,2	7,2	30,3	15,5	28,9	5,1
	70-74 ans	18,5	29,4	9,1	36,3	15,8	27,9	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>23,7</b>	<b>6,6</b>	<b>24,7</b>	<b>9,5</b>	<b>23,2</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,2</b>	<b>22,6</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,5	1,8	4,0	1,1	2,4	3,1
	55-59 ans	4,0	2,9	5,0	1,7	7,1	3,4	4,3
	60-64 ans	2,0	2,1	1,8	1,5	0,0	2,3	2,4
	65-69 ans	4,2	7,1	1,7	11,4	1,7	6,0	1,7
	70-74 ans	6,5	5,3	7,6	6,6	25,2	5,0	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	33,3
	55-59 ans	6,7	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	14,3
	60-64 ans	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	65-69 ans	10,5	6,7	25,0	0,0	0,0	9,1	33,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>12,5</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)