

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 42 - Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 474	6 740	7 734	4 800	5 314	1 940	2 420
	55-59 ans	12 934	5 857	7 077	1 336	1 512	4 521	5 565
	60-64 ans	13 548	6 018	7 530	1 213	1 333	4 805	6 197
	65-69 ans	13 933	6 176	7 757	995	1 127	5 181	6 630
	70-74 ans	9 918	4 465	5 453	651	702	3 814	4 751
	<b>50-74 ans</b>	<b>64 807</b>	<b>29 256</b>	<b>35 551</b>	<b>8 995</b>	<b>9 988</b>	<b>20 261</b>	<b>25 563</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 030	495	535	374	395	121	140
	55-59 ans	917	439	478	116	115	323	363
	60-64 ans	987	414	573	87	106	327	467
	65-69 ans	1 034	427	607	70	110	357	497
	70-74 ans	876	380	496	76	86	304	410
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 844</b>	<b>2 155</b>	<b>2 689</b>	<b>723</b>	<b>812</b>	<b>1 432</b>	<b>1 877</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	766	366	400	271	285	95	115
	55-59 ans	680	324	356	80	69	244	287
	60-64 ans	755	319	436	56	69	263	367
	65-69 ans	808	341	467	50	81	291	386
	70-74 ans	593	256	337	43	46	213	291
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 602</b>	<b>1 606</b>	<b>1 996</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>1 106</b>	<b>1 446</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	264	129	135	103	110	26	25
	55-59 ans	237	115	122	36	46	79	76
	60-64 ans	232	95	137	31	37	64	100
	65-69 ans	226	86	140	20	29	66	111
	70-74 ans	283	124	159	33	40	91	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 242</b>	<b>549</b>	<b>693</b>	<b>223</b>	<b>262</b>	<b>326</b>	<b>431</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14 210	6 611	7 599	4 697	5 204	1 914	2 395
	55-59 ans	12 697	5 742	6 955	1 300	1 466	4 442	5 489
	60-64 ans	13 316	5 923	7 393	1 182	1 296	4 741	6 097
	65-69 ans	13 707	6 090	7 617	975	1 098	5 115	6 519
	70-74 ans	9 635	4 341	5 294	618	662	3 723	4 632
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 565</b>	<b>28 707</b>	<b>34 858</b>	<b>8 772</b>	<b>9 726</b>	<b>19 935</b>	<b>25 132</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	450	257	193	195	129	62	64
	55-59 ans	490	270	220	66	64	204	156
	60-64 ans	554	340	214	96	34	244	180
	65-69 ans	677	396	281	88	53	308	228

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 42 - Loire

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	577	333	244	58	38	275	206
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 748</b>	<b>1 596</b>	<b>1 152</b>	<b>503</b>	<b>318</b>	<b>1 093</b>	<b>834</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	444	254	190	192	127	62	63
	55-59 ans	484	269	215	66	63	203	152
	60-64 ans	547	335	212	95	33	240	179
	65-69 ans	664	391	273	87	51	304	222
	70-74 ans	566	327	239	57	38	270	201
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 705</b>	<b>1 576</b>	<b>1 129</b>	<b>497</b>	<b>312</b>	<b>1 079</b>	<b>817</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	430	244	186	182	125	62	61
	55-59 ans	461	253	208	62	57	191	151
	60-64 ans	522	323	199	93	32	230	167
	65-69 ans	632	375	257	80	46	295	211
	70-74 ans	532	311	221	55	35	256	186
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 577</b>	<b>1 506</b>	<b>1 071</b>	<b>472</b>	<b>295</b>	<b>1 034</b>	<b>776</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	413	236	177	176	118	60	59
	55-59 ans	443	245	198	58	53	187	145
	60-64 ans	492	308	184	87	30	221	154
	65-69 ans	598	355	243	71	44	284	199
	70-74 ans	500	295	205	50	34	245	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 446</b>	<b>1 439</b>	<b>1 007</b>	<b>442</b>	<b>279</b>	<b>997</b>	<b>728</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 42 - Loire

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	423	242	181	181	122	61	59
	55-59 ans	458	252	206	61	57	191	149
	60-64 ans	512	318	194	91	31	227	163
	65-69 ans	620	370	250	78	45	292	205
	70-74 ans	518	307	211	53	34	254	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 531</b>	<b>1 489</b>	<b>1 042</b>	<b>464</b>	<b>289</b>	<b>1 025</b>	<b>753</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	2	5	1	3	1	2
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	10	5	5	2	1	3	4
	65-69 ans	12	5	7	2	1	3	6
	70-74 ans	14	4	10	2	1	2	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	428	243	185	181	125	62	60
	55-59 ans	459	253	206	62	56	191	150
	60-64 ans	515	319	196	92	31	227	165
	65-69 ans	625	371	254	80	46	291	208
	70-74 ans	525	307	218	54	35	253	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 552</b>	<b>1 493</b>	<b>1 059</b>	<b>469</b>	<b>293</b>	<b>1 024</b>	<b>766</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	432	244	188	182	127	62	61
	55-59 ans	464	254	210	62	58	192	152
	60-64 ans	527	327	200	93	33	234	167
	65-69 ans	635	377	258	80	46	297	212
	70-74 ans	539	316	223	56	35	260	188
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 597</b>	<b>1 518</b>	<b>1 079</b>	<b>473</b>	<b>299</b>	<b>1 045</b>	<b>780</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	163	80	83	65	58	15	25
	55-59 ans	163	52	111	12	32	40	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	151	61	90	18	13	43	77
	65-69 ans	183	87	96	20	14	67	82
	70-74 ans	152	71	81	14	13	57	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>812</b>	<b>351</b>	<b>461</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>222</b>	<b>331</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	30	16	14	13	10	3	4
	55-59 ans	41	26	15	4	3	22	12
	60-64 ans	23	10	13	3	1	7	12
	65-69 ans	53	29	24	5	3	24	21
	70-74 ans	28	18	10	1	2	17	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>99</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>73</b>	<b>57</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	77	47	30	32	18	15	12
	55-59 ans	63	47	16	10	7	37	9
	60-64 ans	97	65	32	16	3	49	29
	65-69 ans	122	79	43	18	10	61	33
	70-74 ans	125	75	50	14	9	61	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>484</b>	<b>313</b>	<b>171</b>	<b>90</b>	<b>47</b>	<b>223</b>	<b>124</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	119	77	42	58	31	19	11
	55-59 ans	143	103	40	27	7	76	33
	60-64 ans	180	136	44	40	13	96	31
	65-69 ans	185	125	60	19	10	106	50
	70-74 ans	158	102	56	11	6	91	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>785</b>	<b>543</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>67</b>	<b>388</b>	<b>175</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	37	21	16	13	8	8	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	44	22	22	9	6	13	16
	60-64 ans	57	40	17	11	2	29	15
	65-69 ans	78	48	30	17	7	31	23
	70-74 ans	64	41	23	15	5	26	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>172</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>107</b>	<b>80</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	10	8	2	3	1	5	1
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	196	124	72	90	49	34	23
	55-59 ans	206	150	56	37	14	113	42
	60-64 ans	277	201	76	56	16	145	60
	65-69 ans	307	204	103	37	20	167	83
	70-74 ans	283	177	106	25	15	152	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 269</b>	<b>856</b>	<b>413</b>	<b>245</b>	<b>114</b>	<b>611</b>	<b>299</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 42 - Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	119	77	42	58	31	19	11
	55-59 ans	143	103	40	27	7	76	33
	60-64 ans	180	136	44	40	13	96	31
	65-69 ans	185	125	60	19	10	106	50
	70-74 ans	158	102	56	11	6	91	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>785</b>	<b>543</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>67</b>	<b>388</b>	<b>175</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	99	62	37	50	27	12	10
	55-59 ans	110	79	31	21	6	58	25
	60-64 ans	144	106	38	29	13	77	25
	65-69 ans	147	99	48	15	8	84	40
	70-74 ans	121	76	45	7	4	69	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>621</b>	<b>422</b>	<b>199</b>	<b>122</b>	<b>58</b>	<b>300</b>	<b>141</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	120	80	40	59	29	21	11
	55-59 ans	129	94	35	23	6	71	29
	60-64 ans	181	138	43	41	14	97	29
	65-69 ans	198	137	61	24	10	113	51
	70-74 ans	161	103	58	11	8	92	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>789</b>	<b>552</b>	<b>237</b>	<b>158</b>	<b>67</b>	<b>394</b>	<b>170</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	21	16	13	8	8	8
	55-59 ans	44	22	22	9	6	13	16
	60-64 ans	57	40	17	11	2	29	15
	65-69 ans	78	48	30	17	7	31	23
	70-74 ans	65	42	23	15	5	27	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>281</b>	<b>173</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>80</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	33	19	14	11	6	8	8
	55-59 ans	42	20	22	8	6	12	16
	60-64 ans	57	40	17	11	2	29	15
	65-69 ans	70	42	28	14	6	28	22
	70-74 ans	61	40	21	14	4	26	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 42 - Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>263</b>	<b>161</b>	<b>102</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>103</b>	<b>78</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	3	0	1	4
	60-64 ans	10	8	2	4	0	4	2
	65-69 ans	13	9	4	4	2	5	2
	70-74 ans	14	8	6	3	0	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	29	16	13	8	6	8	7
	55-59 ans	34	16	18	5	6	11	12
	60-64 ans	46	31	15	7	2	24	13
	65-69 ans	55	33	22	10	4	23	18
	70-74 ans	47	32	15	11	4	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>211</b>	<b>128</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>87</b>	<b>61</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	3	0	2	5
	55-59 ans	12	6	6	2	1	4	5
	60-64 ans	20	15	5	2	0	13	5
	65-69 ans	26	13	13	6	2	7	11
	70-74 ans	21	16	5	6	2	10	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>29</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	19	11	8	5	6	6	2
	55-59 ans	22	10	12	3	5	7	7
	60-64 ans	26	16	10	5	2	11	8
	65-69 ans	29	20	9	4	2	16	7
	70-74 ans	26	16	10	5	2	11	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>32</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	8	4	4	3	1	1	3
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	1	5	1	0	0	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	33	19	14	11	6	8	8
	55-59 ans	39	19	20	7	6	12	14
	60-64 ans	56	39	17	11	2	28	15
	65-69 ans	64	40	24	12	6	28	18
	70-74 ans	57	38	19	13	4	25	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>249</b>	<b>155</b>	<b>94</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>101</b>	<b>70</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	11	4	7	1	2	3	5
	70-74 ans	13	6	7	2	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 42 - Loire

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,3	6,9	7,8	7,4	6,2	5,8
	55-59 ans	7,1	7,5	6,8	8,7	7,6	7,1	6,5
	60-64 ans	7,3	6,9	7,6	7,2	8,0	6,8	7,5
	65-69 ans	7,4	6,9	7,8	7,0	9,8	6,9	7,5
	70-74 ans	8,8	8,5	9,1	11,7	12,3	8,0	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,1	2,1	1,3	1,0
	55-59 ans	1,8	2,0	1,7	2,7	3,0	1,7	1,4
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	2,6	2,8	1,3	1,6
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	2,0	2,6	1,3	1,7
	70-74 ans	2,9	2,8	2,9	5,1	5,7	2,4	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,4	73,9	74,8	72,5	72,2	78,5	82,1
	55-59 ans	74,2	73,8	74,5	69,0	60,0	75,5	79,1
	60-64 ans	76,5	77,1	76,1	64,4	65,1	80,4	78,6
	65-69 ans	78,1	79,9	76,9	71,4	73,6	81,5	77,7
	70-74 ans	67,7	67,4	67,9	56,6	53,5	70,1	71,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,4</b>	<b>74,5</b>	<b>74,2</b>	<b>69,2</b>	<b>67,7</b>	<b>77,2</b>	<b>77,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,5	4,2	2,5	3,2	2,7
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	5,1	4,4	4,6	2,8
	60-64 ans	4,2	5,7	2,9	8,1	2,6	5,1	3,0
	65-69 ans	4,9	6,5	3,7	9,0	4,8	6,0	3,5
	70-74 ans	6,0	7,7	4,6	9,4	5,7	7,4	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,8	98,4	98,5	98,4	100,0	98,4
	55-59 ans	98,8	99,6	97,7	100,0	98,4	99,5	97,4
	60-64 ans	98,7	98,5	99,1	99,0	97,1	98,4	99,4
	65-69 ans	98,1	98,7	97,2	98,9	96,2	98,7	97,4
	70-74 ans	98,1	98,2	98,0	98,3	100,0	98,2	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,7</b>	<b>98,0</b>	<b>98,8</b>	<b>98,1</b>	<b>98,7</b>	<b>98,0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,8	96,1	97,9	94,8	98,4	100,0	96,8
	55-59 ans	95,2	94,1	96,7	93,9	90,5	94,1	99,3
	60-64 ans	95,4	96,4	93,9	97,9	97,0	95,8	93,3
	65-69 ans	95,2	95,9	94,1	92,0	90,2	97,0	95,0
	70-74 ans	94,0	95,1	92,5	96,5	92,1	94,8	92,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,3</b>	<b>95,6</b>	<b>94,9</b>	<b>95,0</b>	<b>94,6</b>	<b>95,8</b>	<b>95,0</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,0	96,7	95,2	96,7	94,4	96,8	96,7
	55-59 ans	96,1	96,8	95,2	93,5	93,0	97,9	96,0
	60-64 ans	94,3	95,4	92,5	93,5	93,8	96,1	92,2
	65-69 ans	94,6	94,7	94,6	88,8	95,7	96,3	94,3
	70-74 ans	94,0	94,9	92,8	90,9	97,1	95,7	91,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,9</b>	<b>95,6</b>	<b>94,0</b>	<b>93,6</b>	<b>94,6</b>	<b>96,4</b>	<b>93,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	4	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	126	99	131	102	111	93
	55-59 ans	97	105	88	91	93	109	86
	60-64 ans	100	100	98	111	115	96	95
	65-69 ans	93	94	91	99	119	93	85
	70-74 ans	100	94	109	100	111	93	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>94</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85,5 (58-126)	91 (59,5-143)	77 (55-110)	98 (62-154)	81 (55-112)	77 (55-109)	70 (57-98)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	72 (48-113)	78 (51-112)	68 (42-116)	73 (48-102)	60 (44-122)	80 (54-121)	69 (41-104)
	60-64 ans	76 (50-110)	74 (49-110)	78 (54-117)	87 (49-124)	80 (54,5-122,5)	71 (49-103)	78 (54-117)
	65-69 ans	72 (48-106,5)	73 (48-110)	70 (47-105)	74 (50-121)	76 (48-127)	72 (48-107)	69 (47-104)
	70-74 ans	78 (52-110,5)	76 (52-103)	82 (52-122)	77 (51-116)	82 (60-152)	76 (53,5-102)	82 (50-119)
	<b>50-74 ans</b>	<b>76 (51-112)</b>	<b>77 (52-114)</b>	<b>74 (49-111)</b>	<b>84,5 (53,5-130)</b>	<b>76 (52-121)</b>	<b>75 (51-107)</b>	<b>74 (48,5-108)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	1,5	3,1	2,0	0,6
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	0,0	2,9	0,8	0,0
	65-69 ans	1,6	1,0	2,5	1,1	3,8	1,0	2,2
	70-74 ans	2,3	1,8	2,9	3,4	2,6	1,5	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,6	99,5	99,5	100,0	100,0	98,4
	55-59 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	98,2	100,0	99,3
	60-64 ans	98,7	98,8	98,5	98,9	96,9	98,7	98,8
	65-69 ans	98,9	98,9	98,8	100,0	100,0	98,6	98,6
	70-74 ans	98,7	98,7	98,6	98,2	100,0	98,8	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,0</b>	<b>98,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,7	32,8	44,1	35,7	45,7	24,2	41,0
	55-59 ans	35,1	20,5	52,9	19,4	55,2	20,8	52,0
	60-64 ans	28,7	18,7	45,0	19,4	39,4	18,4	46,1
	65-69 ans	28,8	23,1	37,2	25,0	30,4	22,6	38,7
	70-74 ans	28,2	22,5	36,3	25,0	37,1	21,9	36,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,3</b>	<b>23,1</b>	<b>42,7</b>	<b>27,3</b>	<b>43,5</b>	<b>21,2</b>	<b>42,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	6,6	7,4	7,1	7,9	4,8	6,6
	55-59 ans	8,8	10,2	7,1	6,5	5,2	11,5	7,9
	60-64 ans	4,4	3,1	6,5	3,2	3,0	3,0	7,2
	65-69 ans	8,3	7,7	9,3	6,3	6,5	8,1	9,9
	70-74 ans	5,2	5,7	4,5	1,8	5,7	6,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	1,8	0,0	0,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,8	19,3	16,0	17,6	14,2	24,2	19,7
	55-59 ans	13,6	18,5	7,6	16,1	12,1	19,3	5,9
	60-64 ans	18,4	19,9	16,0	17,2	9,1	20,9	17,4
	65-69 ans	19,2	21,0	16,7	22,5	21,7	20,5	15,6
	70-74 ans	23,2	23,7	22,4	25,0	25,7	23,5	21,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>20,6</b>	<b>15,8</b>	<b>19,0</b>	<b>15,7</b>	<b>21,3</b>	<b>15,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,5	31,6	22,3	31,9	24,4	30,6	18,0
	55-59 ans	30,8	40,6	19,0	43,5	12,1	39,6	21,7
	60-64 ans	34,2	41,6	22,0	43,0	39,4	41,0	18,6
	65-69 ans	29,1	33,2	23,3	23,8	21,7	35,7	23,6
	70-74 ans	29,3	32,3	25,1	19,6	17,1	35,0	26,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,2</b>	<b>35,8</b>	<b>22,4</b>	<b>32,8</b>	<b>22,4</b>	<b>37,1</b>	<b>22,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,6	8,6	8,5	7,1	6,3	12,9	13,1
	55-59 ans	9,5	8,7	10,5	14,5	10,3	6,8	10,5
	60-64 ans	10,8	12,2	8,5	11,8	6,1	12,4	9,0
	65-69 ans	12,3	12,7	11,6	21,3	15,2	10,4	10,8
	70-74 ans	11,9	13,0	10,3	26,8	14,3	10,0	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>	<b>10,0</b>	<b>13,7</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,4	1,1	0,5	0,8	0,0	1,6
	55-59 ans	0,9	0,4	1,4	0,0	0,0	0,5	2,0
	60-64 ans	1,9	2,4	1,0	3,2	3,0	2,1	0,6
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	1,3	2,2	1,0	0,9
	70-74 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	0,8	1,6	0,0
	55-59 ans	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,8	0,9	0,5	1,1	0,0	0,9	0,6
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	0,0	2,2	1,0	0,5
	70-74 ans	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	3,4	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	1,1	0,0	0,4	0,6
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,8	18,8	9,5	19,2	9,4	17,8	9,6
	55-59 ans	16,2	26,1	8,1	28,5	9,5	25,4	7,7
	60-64 ans	20,8	33,9	10,3	47,4	12,3	30,6	9,8
	65-69 ans	22,4	33,5	13,5	37,9	18,2	32,6	12,7
	70-74 ans	29,4	40,8	20,0	40,5	22,7	40,8	19,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>29,8</b>	<b>11,8</b>	<b>27,9</b>	<b>11,7</b>	<b>30,6</b>	<b>11,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,9</b>	<b>29,0</b>	<b>11,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,6	5,5	12,3	6,0	9,9	4,6
	55-59 ans	11,3	17,9	5,8	20,8	4,8	17,1	6,0
	60-64 ans	13,5	23,0	6,0	33,8	10,0	20,2	5,1
	65-69 ans	13,5	20,5	7,9	19,5	9,1	20,7	7,7
	70-74 ans	16,4	23,5	10,6	17,8	9,1	24,4	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>18,9</b>	<b>6,9</b>	<b>17,7</b>	<b>6,9</b>	<b>19,5</b>	<b>7,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,4</b>	<b>18,6</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,4	4,9	10,6	5,2	6,3	4,2
	55-59 ans	8,7	13,8	4,5	16,2	4,1	13,1	4,6
	60-64 ans	10,8	17,9	5,1	24,5	10,0	16,2	4,1
	65-69 ans	10,7	16,3	6,3	15,4	7,3	16,4	6,1
	70-74 ans	12,6	17,5	8,5	11,3	6,0	18,5	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>14,7</b>	<b>5,7</b>	<b>13,9</b>	<b>6,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,8</b>	<b>14,4</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	12,1	5,3	12,6	5,6	11,0	4,6
	55-59 ans	10,2	16,4	5,0	17,7	4,1	16,0	5,3
	60-64 ans	13,6	23,3	5,8	34,7	10,8	20,5	4,8
	65-69 ans	14,4	22,5	8,0	24,6	9,1	22,1	7,8
	70-74 ans	16,7	23,7	11,0	17,8	12,1	24,7	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>19,2</b>	<b>6,8</b>	<b>18,0</b>	<b>6,9</b>	<b>19,8</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,4</b>	<b>18,7</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,2	2,1	2,8	1,5	4,2	3,3
	55-59 ans	3,5	3,8	3,2	6,9	4,1	2,9	2,9
	60-64 ans	4,3	6,8	2,3	9,3	1,5	6,1	2,5
	65-69 ans	5,7	7,9	3,9	17,4	6,4	6,1	3,5
	70-74 ans	6,7	9,7	4,3	24,3	7,6	7,3	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>7,4</b>	<b>2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,1	15,8	7,1	27,3	0,0	0,0	12,5
	55-59 ans	19,0	20,0	18,2	37,5	0,0	8,3	25,0
	60-64 ans	17,5	20,0	11,8	36,4	0,0	13,8	13,3
	65-69 ans	18,6	21,4	14,3	28,6	33,3	17,9	9,1
	70-74 ans	23,0	20,0	28,6	21,4	0,0	19,2	35,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>19,9</b>	<b>16,7</b>	<b>29,3</b>	<b>8,3</b>	<b>14,6</b>	<b>19,2</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)