

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 48 - Lozère

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 146	545	601	410	447	135	154
	55-59 ans	1 152	535	617	171	156	364	461
	60-64 ans	1 228	558	670	153	149	405	521
	65-69 ans	1 261	615	646	124	105	491	541
	70-74 ans	811	392	419	66	50	326	369
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 598</b>	<b>2 645</b>	<b>2 953</b>	<b>924</b>	<b>907</b>	<b>1 721</b>	<b>2 046</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	68	38	30	31	29	7	1
	55-59 ans	77	36	41	11	10	25	31
	60-64 ans	87	43	44	15	9	28	35
	65-69 ans	86	43	43	9	8	34	35
	70-74 ans	71	32	39	9	4	23	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>389</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>117</b>	<b>137</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	56	30	26	25	26	5	0
	55-59 ans	71	35	36	10	8	25	28
	60-64 ans	72	36	36	11	8	25	28
	65-69 ans	74	37	37	5	4	32	33
	70-74 ans	52	24	28	6	4	18	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>325</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>113</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1
	55-59 ans	6	1	5	1	2	0	3
	60-64 ans	15	7	8	4	1	3	7
	65-69 ans	12	6	6	4	4	2	2
	70-74 ans	19	8	11	3	0	5	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 134	537	597	404	444	133	153
	55-59 ans	1 146	534	612	170	154	364	458
	60-64 ans	1 213	551	662	149	148	402	514
	65-69 ans	1 249	609	640	120	101	489	539
	70-74 ans	792	384	408	63	50	321	358
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 534</b>	<b>2 615</b>	<b>2 919</b>	<b>906</b>	<b>897</b>	<b>1 709</b>	<b>2 022</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	26	13	13	10	11	3	2
	55-59 ans	44	24	20	9	6	15	14
	60-64 ans	56	31	25	3	8	28	17
	65-69 ans	58	33	25	7	4	26	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	40	26	14	6	1	20	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>67</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	26	13	13	10	11	3	2
	55-59 ans	44	24	20	9	6	15	14
	60-64 ans	56	31	25	3	8	28	17
	65-69 ans	58	33	25	7	4	26	21
	70-74 ans	40	26	14	6	1	20	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>67</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	19	8	11	6	10	2	1
	55-59 ans	35	19	16	9	4	10	12
	60-64 ans	39	19	20	3	6	16	14
	65-69 ans	45	25	20	5	4	20	16
	70-74 ans	36	24	12	5	0	19	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>55</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	18	8	10	6	9	2	1
	55-59 ans	35	19	16	9	4	10	12
	60-64 ans	39	19	20	3	6	16	14
	65-69 ans	43	23	20	5	4	18	16
	70-74 ans	34	22	12	5	0	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>169</b>	<b>91</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>55</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 48 - Lozère

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	19	8	11	6	10	2	1
	55-59 ans	35	19	16	9	4	10	12
	60-64 ans	39	19	20	3	6	16	14
	65-69 ans	45	25	20	5	4	20	16
	70-74 ans	35	23	12	5	0	18	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>94</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>55</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	19	8	11	6	10	2	1
	55-59 ans	35	19	16	9	4	10	12
	60-64 ans	39	19	20	3	6	16	14
	65-69 ans	44	25	19	5	4	20	15
	70-74 ans	35	23	12	5	0	18	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>54</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	19	8	11	6	10	2	1
	55-59 ans	35	19	16	9	4	10	12
	60-64 ans	39	19	20	3	6	16	14
	65-69 ans	45	25	20	5	4	20	16
	70-74 ans	36	24	12	5	0	19	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>55</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	12	6	6	4	6	2	0
	55-59 ans	19	9	10	4	3	5	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	3	17	1	6	2	11
	65-69 ans	14	7	7	0	0	7	7
	70-74 ans	13	10	3	3	0	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1
	65-69 ans	11	7	4	3	2	4	2
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	3	1	2	2
	60-64 ans	15	14	1	2	0	12	1
	65-69 ans	20	13	7	4	2	9	5
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>13</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1
	65-69 ans	11	7	4	3	2	4	2
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	7	7	0	1	0	6	0
	65-69 ans	10	7	3	3	1	4	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	7	7	0	1	0	6	0
	65-69 ans	11	8	3	3	1	5	2
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	5	1	0	1	5	0	0
	60-64 ans	9	7	2	0	0	7	2	2
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	7,0	5,0	7,6	6,5	5,2	0,6
	55-59 ans	6,7	6,7	6,6	6,4	6,4	6,9	6,7
	60-64 ans	7,1	7,7	6,6	9,8	6,0	6,9	6,7
	65-69 ans	6,8	7,0	6,7	7,3	7,6	6,9	6,5
	70-74 ans	8,8	8,2	9,3	13,6	8,0	7,1	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	1,5	0,7	1,5	0,7	1,5	0,6
	55-59 ans	0,5	0,2	0,8	0,6	1,3	0,0	0,7
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	2,6	0,7	0,7	1,3
	65-69 ans	1,0	1,0	0,9	3,2	3,8	0,4	0,4
	70-74 ans	2,3	2,0	2,6	4,5	0,0	1,5	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	82,4	78,9	86,7	80,6	89,7	71,4	0,0
	55-59 ans	92,2	97,2	87,8	90,9	80,0	100,0	90,3
	60-64 ans	82,8	83,7	81,8	73,3	88,9	89,3	80,0
	65-69 ans	86,0	86,0	86,0	55,6	50,0	94,1	94,3
	70-74 ans	73,2	75,0	71,8	66,7	100,0	78,3	68,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,5</b>	<b>84,4</b>	<b>82,7</b>	<b>76,0</b>	<b>83,3</b>	<b>89,7</b>	<b>82,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,2	2,5	2,5	2,3	1,3
	55-59 ans	3,8	4,5	3,3	5,3	3,9	4,1	3,1
	60-64 ans	4,6	5,6	3,8	2,0	5,4	7,0	3,3
	65-69 ans	4,6	5,4	3,9	5,8	4,0	5,3	3,9
	70-74 ans	5,1	6,8	3,4	9,5	2,0	6,2	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,1	61,5	84,6	60,0	90,9	66,7	50,0
	55-59 ans	79,5	79,2	80,0	100,0	66,7	66,7	85,7
	60-64 ans	69,6	61,3	80,0	100,0	75,0	57,1	82,4
	65-69 ans	77,6	75,8	80,0	71,4	100,0	76,9	76,2
	70-74 ans	90,0	92,3	85,7	83,3	0,0	95,0	92,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,7</b>	<b>74,8</b>	<b>81,4</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>72,8</b>	<b>82,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	100,0	90,9	100,0	90,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	95,6	92,0	100,0	100,0	100,0	90,0	100,0
	70-74 ans	94,4	91,7	100,0	100,0	0,0	89,5	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>95,8</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	4	3	3	3	4	3
	65-69 ans	4	5	3	10	3	4	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66	69	63	69	65	69	47
	55-59 ans	66	61	72	65	53	56	79
	60-64 ans	62	52	71	46	61	53	76
	65-69 ans	62	67	57	55	84	70	50
	70-74 ans	60	59	63	60	,	58	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>66</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (39-90)	46 (37,5-94)	51 (42-72)	45 (36-91)	53 (42-72)	69 (41-97)	47 (47-47)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56 (36-101)	49 (34-101)	63 (45,5-88,5)	47 (36-113)	53,5 (41-65,5)	52,5 (34-84)	67,5 (46-116)
	60-64 ans	56 (36-76)	56 (28-72)	53 (36,5-109)	49 (28-61)	44 (23-89)	56,5 (31,5-74)	56,5 (37-129)
	65-69 ans	53 (35-80)	58 (36-94)	49 (30,5-67,5)	53 (43-56)	38,5 (32-135,5)	66 (36-102)	51 (29,5-67,5)
	70-74 ans	61 (36-72)	54,5 (35-72)	61,5 (45,5-72,5)	65 (63-68)		54 (35-76)	61,5 (45,5-72,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>54,5 (36-76)</b>	<b>54 (35-78)</b>	<b>55 (37-72)</b>	<b>50 (36-71,5)</b>	<b>48 (34,5-72)</b>	<b>56 (35-79)</b>	<b>57 (40-74)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19,2	23,1	15,4	20,0	9,1	33,3	50,0
	55-59 ans	13,6	20,8	5,0	0,0	16,7	33,3	0,0
	60-64 ans	16,1	22,6	8,0	0,0	0,0	25,0	11,8
	65-69 ans	10,3	9,1	12,0	14,3	0,0	7,7	14,3
	70-74 ans	7,5	3,8	14,3	0,0	100,0	5,0	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>15,0</b>	<b>10,3</b>	<b>8,6</b>	<b>10,0</b>	<b>17,4</b>	<b>10,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	97,8	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	93,8
	70-74 ans	97,2	95,8	100,0	100,0	0,0	94,7	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,2	75,0	54,5	66,7	60,0	100,0	0,0
	55-59 ans	54,3	47,4	62,5	44,4	75,0	50,0	58,3
	60-64 ans	51,3	15,8	85,0	33,3	100,0	12,5	78,6
	65-69 ans	31,1	28,0	35,0	0,0	0,0	35,0	43,8
	70-74 ans	36,1	41,7	25,0	60,0	0,0	36,8	25,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,8</b>	<b>36,8</b>	<b>54,4</b>	<b>42,9</b>	<b>62,5</b>	<b>34,3</b>	<b>50,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,8	12,5	18,2	16,7	20,0	0,0	0,0
	55-59 ans	8,6	5,3	12,5	11,1	25,0	0,0	8,3
	60-64 ans	15,4	31,6	0,0	33,3	0,0	31,3	0,0
	65-69 ans	20,0	24,0	15,0	20,0	0,0	25,0	18,8
	70-74 ans	5,6	4,2	8,3	20,0	0,0	0,0	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>15,8</b>	<b>10,1</b>	<b>17,9</b>	<b>12,5</b>	<b>14,9</b>	<b>9,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	21,1	6,3	22,2	0,0	20,0	8,3
	60-64 ans	23,1	42,1	5,0	33,3	0,0	43,8	7,1
	65-69 ans	24,4	28,0	20,0	60,0	50,0	20,0	12,5
	70-74 ans	27,8	25,0	33,3	20,0	0,0	26,3	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>26,3</b>	<b>12,7</b>	<b>25,0</b>	<b>8,3</b>	<b>26,9</b>	<b>14,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	5,7	5,3	6,3	0,0	0,0	10,0	8,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	13,3	16,0	10,0	20,0	0,0	15,0	12,5
	70-74 ans	13,9	16,7	8,3	0,0	0,0	21,1	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>9,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10,5	12,5	9,1	16,7	10,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,7	10,5	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,7	5,3	10,0	0,0	0,0	6,3	14,3
	65-69 ans	6,7	0,0	15,0	0,0	50,0	0,0	6,3
	70-74 ans	13,9	12,5	16,7	0,0	0,0	15,8	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>7,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,7</b>	<b>12,5</b>	<b>6,0</b>	<b>9,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	2,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	6,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	1,9	3,4	2,5	4,5	0,0	0,0
	55-59 ans	7,0	9,4	4,9	17,6	6,5	5,5	4,4
	60-64 ans	12,4	25,4	1,5	13,4	0,0	29,9	1,9
	65-69 ans	16,0	21,3	10,9	33,3	19,8	18,4	9,3
	70-74 ans	15,2	18,2	12,3	31,7	0,0	15,6	14,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>15,3</b>	<b>6,2</b>	<b>13,2</b>	<b>5,6</b>	<b>16,4</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,9</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,4	7,5	1,6	11,8	0,0	5,5	2,2
	60-64 ans	7,4	14,5	1,5	6,7	0,0	17,4	1,9
	65-69 ans	8,8	11,5	6,3	25,0	19,8	8,2	3,7
	70-74 ans	12,6	15,6	9,8	15,9	0,0	15,6	11,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>3,4</b>	<b>7,7</b>	<b>2,2</b>	<b>10,5</b>	<b>4,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>8,8</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,5	5,6	1,6	11,8	0,0	2,7	2,2
	60-64 ans	5,8	12,7	0,0	6,7	0,0	14,9	0,0
	65-69 ans	8,0	11,5	4,7	25,0	9,9	8,2	3,7
	70-74 ans	7,6	10,4	4,9	15,9	0,0	9,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>8,0</b>	<b>2,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1,1</b>	<b>8,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>7,2</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,5	5,6	1,6	11,8	0,0	2,7	2,2
	60-64 ans	5,8	12,7	0,0	6,7	0,0	14,9	0,0
	65-69 ans	8,8	13,1	4,7	25,0	9,9	10,2	3,7
	70-74 ans	8,8	13,0	4,9	15,9	0,0	12,5	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8</b>	<b>2,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1,1</b>	<b>9,4</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>7,8</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	6,5
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	0,0	0,0	2,7	2,2
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	4,8	6,6	3,1	8,3	0,0	6,1	3,7
	70-74 ans	6,3	10,4	2,5	0,0	0,0	12,5	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)