

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 54 - Meurthe et Moselle

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 225	8 488	8 737	5 742	5 699	2 746	3 038
	55-59 ans	14 064	6 513	7 551	1 549	1 668	4 964	5 883
	60-64 ans	14 757	6 738	8 019	1 310	1 361	5 428	6 658
	65-69 ans	14 495	6 706	7 789	1 015	968	5 691	6 821
	70-74 ans	9 572	4 326	5 246	527	558	3 799	4 688
	50-74 ans	70 113	32 771	37 342	10 143	10 254	22 628	27 088
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 253	638	615	490	465	148	150
	55-59 ans	1 059	495	564	139	157	356	407
	60-64 ans	952	423	529	122	113	301	416
	65-69 ans	960	438	522	77	75	361	447
	70-74 ans	674	288	386	52	47	236	339
	50-74 ans	4 898	2 282	2 616	880	857	1 402	1 759
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	967	488	479	366	355	122	124
	55-59 ans	831	375	456	93	119	282	337
	60-64 ans	789	359	430	97	80	262	350
	65-69 ans	792	367	425	58	57	309	368
	70-74 ans	505	215	290	33	31	182	259
	50-74 ans	3 884	1 804	2 080	647	642	1 157	1 438
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	286	150	136	124	110	26	26
	55-59 ans	228	120	108	46	38	74	70
	60-64 ans	163	64	99	25	33	39	66
	65-69 ans	168	71	97	19	18	52	79
	70-74 ans	169	73	96	19	16	54	80
	50-74 ans	1 014	478	536	233	215	245	321
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 939	8 338	8 601	5 618	5 589	2 720	3 012
	55-59 ans	13 836	6 393	7 443	1 503	1 630	4 890	5 813
	60-64 ans	14 594	6 674	7 920	1 285	1 328	5 389	6 592
	65-69 ans	14 327	6 635	7 692	996	950	5 639	6 742
	70-74 ans	9 403	4 253	5 150	508	542	3 745	4 608
	50-74 ans	69 099	32 293	36 806	9 910	10 039	22 383	26 767
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	590	352	238	248	160	104	78
	55-59 ans	578	360	218	112	49	248	169
	60-64 ans	716	412	304	106	76	306	228
	65-69 ans	800	482	318	106	43	376	275

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	599	338	261	58	34	280	227
	50-74 ans	3 283	1 944	1 339	630	362	1 314	977
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	585	351	234	247	157	104	77
	55-59 ans	572	357	215	111	49	246	166
	60-64 ans	702	405	297	104	76	301	221
	65-69 ans	786	473	313	103	42	370	271
	70-74 ans	588	332	256	57	33	275	223
	50-74 ans	3 233	1 918	1 315	622	357	1 296	958
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	522	309	213	213	140	96	73
	55-59 ans	529	329	200	104	44	225	156
	60-64 ans	642	364	278	89	69	275	209
	65-69 ans	736	443	293	97	38	346	255
	70-74 ans	534	301	233	49	28	252	205
	50-74 ans	2 963	1 746	1 217	552	319	1 194	898
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	492	295	197	202	127	93	70
	55-59 ans	499	308	191	101	39	207	152
	60-64 ans	596	343	253	83	62	260	191
	65-69 ans	683	409	274	83	30	326	244
	70-74 ans	494	282	212	45	24	237	188
	50-74 ans	2 764	1 637	1 127	514	282	1 123	845
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	13	10	3	5	2	5	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 54 - Meurthe et Moselle

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	518	307	211	211	138	96	73
	55-59 ans	522	325	197	104	42	221	155
	60-64 ans	630	359	271	87	66	272	205
	65-69 ans	726	436	290	95	36	341	254
	70-74 ans	526	298	228	48	27	250	201
	50-74 ans	2 922	1 725	1 197	545	309	1 180	888
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	12	5	7	2	3	3	4
	65-69 ans	10	7	3	2	2	5	1
	70-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
	50-74 ans	41	21	20	7	10	14	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	21	13	8	3	2	10	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	518	307	211	211	138	96	73
	55-59 ans	529	329	200	104	44	225	156
	60-64 ans	633	360	273	88	68	272	205
	65-69 ans	734	442	292	97	38	345	254
	70-74 ans	532	300	232	49	27	251	205
	50-74 ans	2 946	1 738	1 208	549	315	1 189	893
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	524	310	214	214	141	96	73
	55-59 ans	530	329	201	104	44	225	157
	60-64 ans	649	367	282	90	70	277	212
	65-69 ans	740	446	294	97	38	349	256
	70-74 ans	541	307	234	50	28	257	206
	50-74 ans	2 984	1 759	1 225	555	321	1 204	904
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	223	118	105	78	67	40	38
	55-59 ans	201	92	109	20	20	72	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 54 - Meurthe et Moselle

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	216	88	128	24	32	64	96
	65-69 ans	266	130	136	19	20	111	116
	70-74 ans	190	89	101	18	11	71	90
	50-74 ans	1 096	517	579	159	150	358	429
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	26	14	12	12	8	2	4
	55-59 ans	22	17	5	6	1	11	4
	60-64 ans	20	14	6	3	2	11	4
	65-69 ans	25	13	12	3	1	10	11
	70-74 ans	18	10	8	0	0	10	8
	50-74 ans	111	68	43	24	12	44	31
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	75	46	29	31	22	15	7
	55-59 ans	89	62	27	23	5	39	22
	60-64 ans	114	70	44	17	10	53	34
	65-69 ans	110	70	40	10	2	60	38
	70-74 ans	101	66	35	10	6	56	29
	50-74 ans	489	314	175	91	45	223	130
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	138	101	37	67	22	34	15
	55-59 ans	158	117	41	39	11	78	30
	60-64 ans	215	143	72	34	17	109	55
	65-69 ans	245	172	73	38	10	134	63
	70-74 ans	151	88	63	13	6	75	57
	50-74 ans	907	621	286	191	66	430	220
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	33	19	14	15	11	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	38	30	8	13	4	17	4
	60-64 ans	49	33	16	10	7	23	9
	65-69 ans	66	44	22	22	3	22	19
	70-74 ans	54	37	17	7	3	30	14
	50-74 ans	240	163	77	67	28	96	49
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	14	8	6	3	1	5	5
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	50-74 ans	63	39	24	14	6	25	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	4	5	0	1	4	4
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	25	12	13	2	6	10	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	213	147	66	98	44	49	22
	55-59 ans	247	179	68	62	16	117	52
	60-64 ans	329	213	116	51	27	162	89
	65-69 ans	355	242	113	48	12	194	101
	70-74 ans	252	154	98	23	12	131	86
	50-74 ans	1 396	935	461	282	111	653	350

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 54 - Meurthe et Moselle

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	138	101	37	67	22	34	15
	55-59 ans	158	117	41	39	11	78	30
	60-64 ans	215	143	72	34	17	109	55
	65-69 ans	245	172	73	38	10	134	63
	70-74 ans	151	88	63	13	6	75	57
	50-74 ans	907	621	286	191	66	430	220
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	126	92	34	60	20	32	14
	55-59 ans	143	105	38	34	9	71	29
	60-64 ans	196	130	66	33	16	97	50
	65-69 ans	210	150	60	32	7	118	53
	70-74 ans	136	77	59	12	5	65	54
	50-74 ans	811	554	257	171	57	383	200
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	135	97	38	64	24	33	14
	55-59 ans	160	119	41	38	9	81	32
	60-64 ans	216	147	69	37	17	110	52
	65-69 ans	236	170	66	36	8	134	58
	70-74 ans	162	95	67	14	7	81	60
	50-74 ans	909	628	281	189	65	439	216
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	19	14	15	11	4	3
	55-59 ans	38	30	8	13	4	17	4
	60-64 ans	49	33	16	10	7	23	9
	65-69 ans	66	44	22	22	3	22	19
	70-74 ans	57	39	18	8	4	31	14
	50-74 ans	243	165	78	68	29	97	49
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	28	16	12	13	9	3	3
	55-59 ans	33	27	6	12	2	15	4
	60-64 ans	46	31	15	10	7	21	8
	65-69 ans	58	38	20	18	3	20	17
	70-74 ans	53	36	17	7	3	29	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 54 - Meurthe et Moselle

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	218	148	70	60	24	88	46
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	26	14	12	11	9	3	3
	55-59 ans	31	26	5	12	2	14	3
	60-64 ans	41	29	12	9	6	20	6
	65-69 ans	55	37	18	18	2	19	16
	70-74 ans	50	34	16	6	3	28	13
	50-74 ans	203	140	63	56	22	84	41
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	18	9	9	6	7	3	2
	55-59 ans	20	17	3	8	2	9	1
	60-64 ans	28	22	6	7	3	15	3
	65-69 ans	40	27	13	11	2	16	11
	70-74 ans	38	26	12	5	2	21	10
	50-74 ans	144	101	43	37	16	64	27
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	13	7	6	2	3	5	3
	65-69 ans	15	10	5	7	0	3	5
	70-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
	50-74 ans	59	39	20	19	6	20	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	8	8	0	3	0	5	0
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	27	21	6	10	1	11	5
	70-74 ans	15	11	4	1	1	10	3
	50-74 ans	75	58	17	20	6	38	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	3	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	23	14	9	8	5	6	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	36	21	15	6	4	15	11
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	10	8	2	3	1	5	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	26	14	12	11	9	3	3
	55-59 ans	32	26	6	12	2	14	4
	60-64 ans	43	29	14	9	6	20	8
	65-69 ans	56	37	19	18	2	19	17
	70-74 ans	47	32	15	6	3	26	12
	50-74 ans	204	138	66	56	22	82	44
A40- Perdus de vue	50-54 ans	32	23	9	20	8	3	1
	55-59 ans	20	15	5	5	2	10	3
	60-64 ans	28	20	8	8	5	12	3
	65-69 ans	17	12	5	3	1	9	4
	70-74 ans	21	12	9	3	4	9	5
	50-74 ans	118	82	36	39	20	43	16

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,5	7,0	8,5	8,2	5,4	4,9
	55-59 ans	7,5	7,6	7,5	9,0	9,4	7,2	6,9
	60-64 ans	6,5	6,3	6,6	9,3	8,3	5,5	6,2
	65-69 ans	6,6	6,5	6,7	7,6	7,7	6,3	6,6
	70-74 ans	7,0	6,7	7,4	9,9	8,4	6,2	7,2
	50-74 ans	7,0	7,0	7,0	8,7	8,4	6,2	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,2	1,9	0,9	0,9
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	3,0	2,3	1,5	1,2
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	1,9	2,4	0,7	1,0
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	1,9	1,9	0,9	1,2
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	3,6	2,9	1,4	1,7
	50-74 ans	1,4	1,5	1,4	2,3	2,1	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,2	76,5	77,9	74,7	76,3	82,4	82,7
	55-59 ans	78,5	75,8	80,9	66,9	75,8	79,2	82,8
	60-64 ans	82,9	84,9	81,3	79,5	70,8	87,0	84,1
	65-69 ans	82,5	83,8	81,4	75,3	76,0	85,6	82,3
	70-74 ans	74,9	74,7	75,1	63,5	66,0	77,1	76,4
	50-74 ans	79,3	79,1	79,5	73,5	74,9	82,5	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,2	2,8	4,4	2,9	3,8	2,6
	55-59 ans	4,2	5,6	2,9	7,5	3,0	5,1	2,9
	60-64 ans	4,9	6,2	3,8	8,2	5,7	5,7	3,5
	65-69 ans	5,6	7,3	4,1	10,6	4,5	6,7	4,1
	70-74 ans	6,4	7,9	5,1	11,4	6,3	7,5	4,9
	50-74 ans	4,8	6,0	3,6	6,4	3,6	5,9	3,7
50-74 ans **	4,7	5,9	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,7	98,3	99,6	98,1	100,0	98,7
	55-59 ans	99,0	99,2	98,6	99,1	100,0	99,2	98,2
	60-64 ans	98,0	98,3	97,7	98,1	100,0	98,4	96,9
	65-69 ans	98,3	98,1	98,4	97,2	97,7	98,4	98,5
	70-74 ans	98,2	98,2	98,1	98,3	97,1	98,2	98,2
	50-74 ans	98,5	98,7	98,2	98,7	98,6	98,6	98,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	88,0	91,0	86,2	89,2	92,3	94,8
	55-59 ans	92,5	92,2	93,0	93,7	89,8	91,5	94,0
	60-64 ans	91,5	89,9	93,6	85,6	90,8	91,4	94,6
	65-69 ans	93,6	93,7	93,6	94,2	90,5	93,5	94,1
	70-74 ans	90,8	90,7	91,0	86,0	84,8	91,6	91,9
	50-74 ans	91,6	91,0	92,5	88,7	89,4	92,1	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,3	95,5	92,5	94,8	90,7	96,9	95,9
	55-59 ans	94,3	93,6	95,5	97,1	88,6	92,0	97,4
	60-64 ans	92,8	94,2	91,0	93,3	89,9	94,5	91,4
	65-69 ans	92,8	92,3	93,5	85,6	78,9	94,2	95,7
	70-74 ans	92,5	93,7	91,0	91,8	85,7	94,0	91,7
	50-74 ans	93,3	93,8	92,6	93,1	88,4	94,1	94,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	110	118	111	122	109	109
	55-59 ans	97	97	97	103	114	94	92
	60-64 ans	103	106	100	118	94	102	102
	65-69 ans	101	97	105	100	120	97	103
	70-74 ans	107	110	104	118	115	109	102
	50-74 ans	104	104	105	109	114	101	101
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (62-117)	77 (61-115)	90,5 (65,5-120)	78,5 (61-115)	95 (66-122)	77 (61-117)	82 (62-113)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (61-111)	79 (58-109)	82,5 (62,5-113)	76 (59-108)	88 (63,5-130)	82 (57-109)	82 (62-111)
	60-64 ans	77 (56-117)	78 (55-116)	76 (61-121,5)	80 (61-121)	76 (61-111)	78 (55-116)	77 (61-124)
	65-69 ans	81 (58-112)	81 (59-111)	81 (57-120)	82 (57-131)	77 (50-136)	79,5 (59-107)	82 (58-119)
	70-74 ans	83,5 (57-125)	86 (61-127)	80 (55-123)	77 (66-129)	84 (56-141,5)	88,5 (61-127)	80 (55-116)
	50-74 ans	81 (59-116)	81 (58-114)	82 (59-118)	79 (60-115)	85 (62-123)	81,5 (58-114)	82 (58-117)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	6,5	3,8	8,1	5,0	2,9	1,3
	55-59 ans	3,5	4,2	2,3	4,5	4,1	4,0	1,8
	60-64 ans	3,9	4,9	2,6	7,5	6,6	3,9	1,3
	65-69 ans	2,1	2,5	1,6	2,8	2,3	2,4	1,5
	70-74 ans	3,5	3,6	3,4	5,2	11,8	3,2	2,2
	50-74 ans	3,6	4,2	2,7	6,2	5,5	3,3	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,4	99,1	99,1	98,6	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,6	98,9	98,2	98,9	98,6	98,9	98,1
	65-69 ans	99,7	99,8	99,7	100,0	100,0	99,7	99,6
	70-74 ans	99,6	99,7	99,6	100,0	96,4	99,6	100,0
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,5	98,7	99,6	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,6	38,1	49,1	36,4	47,5	41,7	52,1
	55-59 ans	37,9	28,0	54,2	19,2	45,5	32,0	56,7
	60-64 ans	33,3	24,0	45,4	26,7	45,7	23,1	45,3
	65-69 ans	35,9	29,1	46,3	19,6	52,6	31,8	45,3
	70-74 ans	35,1	29,0	43,2	36,0	39,3	27,6	43,7
	50-74 ans	36,7	29,4	47,3	28,6	46,7	29,7	47,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,0	4,5	5,6	5,6	5,7	2,1	5,5
	55-59 ans	4,2	5,2	2,5	5,8	2,3	4,9	2,5
	60-64 ans	3,1	3,8	2,1	3,3	2,9	4,0	1,9
	65-69 ans	3,4	2,9	4,1	3,1	2,6	2,9	4,3
	70-74 ans	3,3	3,3	3,4	0,0	0,0	3,9	3,9
	50-74 ans	3,7	3,9	3,5	4,3	3,7	3,7	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,3	1,0	0,0	2,3	0,4	0,6
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,4	0,0	1,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	14,8	13,6	14,5	15,6	15,6	9,6
	55-59 ans	16,8	18,8	13,4	22,1	11,4	17,3	14,0
	60-64 ans	17,6	19,1	15,6	18,9	14,3	19,1	16,0
	65-69 ans	14,9	15,7	13,6	10,3	5,3	17,2	14,8
	70-74 ans	18,7	21,5	15,0	20,0	21,4	21,8	14,1
	50-74 ans	16,4	17,9	14,3	16,4	14,0	18,5	14,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,3	32,6	17,3	31,3	15,6	35,4	20,5
	55-59 ans	29,8	35,6	20,4	37,5	25,0	34,7	19,1
	60-64 ans	33,1	39,0	25,5	37,8	24,3	39,4	25,9
	65-69 ans	33,1	38,6	24,8	39,2	26,3	38,4	24,6
	70-74 ans	27,9	28,7	26,9	26,0	21,4	29,2	27,7
	50-74 ans	30,4	35,3	23,3	34,4	20,6	35,7	24,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	6,1	6,5	7,0	7,8	4,2	4,1
	55-59 ans	7,2	9,1	4,0	12,5	9,1	7,6	2,5
	60-64 ans	7,6	9,0	5,7	11,1	10,0	8,3	4,2
	65-69 ans	8,9	9,9	7,5	22,7	7,9	6,3	7,4
	70-74 ans	10,0	12,1	7,3	14,0	10,7	11,7	6,8
	50-74 ans	8,0	9,3	6,3	12,1	8,7	8,0	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,3	2,1	1,0	1,4
	55-59 ans	1,9	1,8	2,0	1,9	2,3	1,8	1,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,8	1,9	1,8	2,2	1,4	1,8	1,9
	65-69 ans	1,9	1,8	2,0	3,1	2,6	1,4	2,0
	70-74 ans	3,1	3,9	2,1	4,0	0,0	3,9	2,4
	50-74 ans	2,1	2,2	2,0	2,5	1,9	2,1	2,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,6	1,9	0,9	2,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	60-64 ans	1,4	1,1	1,8	0,0	1,4	1,4	1,9
	65-69 ans	0,7	0,9	0,3	0,0	0,0	1,1	0,4
	70-74 ans	0,7	0,7	0,9	0,0	3,6	0,8	0,5
	50-74 ans	0,8	0,7	1,1	0,4	1,9	0,8	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	17,6	7,7	17,4	7,9	18,0	7,3
	55-59 ans	17,9	28,0	9,1	41,3	9,8	23,9	8,9
	60-64 ans	22,5	31,9	14,6	39,7	20,3	30,1	13,5
	65-69 ans	24,8	36,5	14,7	48,2	12,6	34,4	15,0
	70-74 ans	26,8	36,2	19,0	45,3	22,1	35,0	18,7
	50-74 ans	20,2	29,0	12,5	28,5	11,1	29,2	13,1
	50-74 ans **	20,1	28,6	12,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	12,1	4,3	11,9	3,9	12,5	5,0
	55-59 ans	11,4	18,3	5,5	25,9	6,7	16,0	5,2
	60-64 ans	14,7	21,4	9,1	26,5	12,8	20,2	8,3
	65-69 ans	17,1	25,9	9,5	38,2	10,5	23,8	9,3
	70-74 ans	16,1	20,7	12,2	25,6	11,1	20,0	12,4
	50-74 ans	13,1	19,2	7,8	19,3	6,6	19,2	8,2
	50-74 ans **	13,0	18,9	7,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	11,0	4,0	10,7	3,6	11,8	4,6
	55-59 ans	10,3	16,4	5,1	22,6	5,5	14,5	5,0
	60-64 ans	13,4	19,5	8,3	25,7	12,0	18,0	7,6
	65-69 ans	14,7	22,6	7,8	32,1	7,4	20,9	7,9
	70-74 ans	14,5	18,1	11,5	23,6	9,2	17,4	11,7
	50-74 ans	11,7	17,2	7,0	17,3	5,7	17,1	7,5
	50-74 ans **	11,7	16,9	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,6	4,4	11,4	4,3	12,1	4,6
	55-59 ans	11,6	18,6	5,5	25,3	5,5	16,6	5,5
	60-64 ans	14,8	22,0	8,7	28,8	12,8	20,4	7,9
	65-69 ans	16,5	25,6	8,6	36,1	8,4	23,8	8,6
	70-74 ans	17,2	22,3	13,0	27,6	12,9	21,6	13,0
	50-74 ans	13,2	19,4	7,6	19,1	6,5	19,6	8,1
	50-74 ans **	13,1	19,1	7,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	2,7	2,0	1,5	1,0
	55-59 ans	2,7	4,7	1,1	8,6	2,5	3,5	0,7
	60-64 ans	3,4	4,9	2,0	7,8	5,3	4,3	1,4
	65-69 ans	4,6	6,6	2,9	22,1	3,2	3,9	2,8
	70-74 ans	6,1	9,2	3,5	15,7	7,4	8,3	3,0
	50-74 ans	3,5	5,1	2,1	6,9	2,9	4,3	1,8
	50-74 ans **	3,5	5,0	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,1	12,5	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	6,1	3,7	16,7	0,0	0,0	6,7	25,0
	60-64 ans	8,7	6,5	13,3	10,0	0,0	4,8	25,0
	65-69 ans	5,2	2,6	10,0	0,0	33,3	5,0	5,9
	70-74 ans	5,7	5,6	5,9	14,3	0,0	3,4	7,1
	50-74 ans	6,4	5,4	8,6	6,7	4,2	4,5	10,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)