

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 55 - Meuse

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 122	1 983	2 139	1 325	1 418	658	721
	55-59 ans	3 629	1 774	1 855	447	391	1 327	1 464
	60-64 ans	4 076	1 862	2 214	372	349	1 490	1 865
	65-69 ans	4 190	2 000	2 190	282	221	1 718	1 969
	70-74 ans	2 559	1 193	1 366	161	121	1 032	1 245
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 576</b>	<b>8 812</b>	<b>9 764</b>	<b>2 587</b>	<b>2 500</b>	<b>6 225</b>	<b>7 264</b>
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	260	131	129	99	98	32
55-59 ans		214	111	103	34	22	77	81
60-64 ans		234	104	130	30	21	74	109
65-69 ans		259	129	130	24	26	105	104
70-74 ans		166	70	96	12	13	58	83
<b>50-74 ans</b>		<b>1 133</b>	<b>545</b>	<b>588</b>	<b>199</b>	<b>180</b>	<b>346</b>	<b>408</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	185	91	94	61	66	30
	55-59 ans	167	84	83	20	17	64	66
	60-64 ans	204	92	112	23	17	69	95
	65-69 ans	227	111	116	17	20	94	96
	70-74 ans	133	55	78	11	7	44	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>916</b>	<b>433</b>	<b>483</b>	<b>132</b>	<b>127</b>	<b>301</b>	<b>356</b>
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	75	40	35	38	32	2
55-59 ans		47	27	20	14	5	13	15
60-64 ans		30	12	18	7	4	5	14
65-69 ans		32	18	14	7	6	11	8
70-74 ans		33	15	18	1	6	14	12
<b>50-74 ans</b>		<b>217</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>52</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	4 047	1 943	2 104	1 287	1 386	656
	55-59 ans	3 582	1 747	1 835	433	386	1 314	1 449
	60-64 ans	4 046	1 850	2 196	365	345	1 485	1 851
	65-69 ans	4 158	1 982	2 176	275	215	1 707	1 961
	70-74 ans	2 526	1 178	1 348	160	115	1 018	1 233
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 359</b>	<b>8 700</b>	<b>9 659</b>	<b>2 520</b>	<b>2 447</b>	<b>6 180</b>	<b>7 212</b>
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	156	93	63	68	38	25
55-59 ans		152	85	67	30	20	55	47
60-64 ans		209	128	81	27	18	101	63
65-69 ans		265	166	99	27	14	139	85
<b>50-74 ans</b>		<b>787</b>	<b>472</b>	<b>300</b>	<b>152</b>	<b>90</b>	<b>320</b>	<b>225</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	170	104	66	14	8	90	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>952</b>	<b>576</b>	<b>376</b>	<b>166</b>	<b>98</b>	<b>410</b>	<b>278</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	154	91	63	67	38	24	25
	55-59 ans	151	84	67	29	20	55	47
	60-64 ans	208	127	81	27	18	100	63
	65-69 ans	263	166	97	27	14	139	83
	70-74 ans	170	104	66	14	8	90	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>946</b>	<b>572</b>	<b>374</b>	<b>164</b>	<b>98</b>	<b>408</b>	<b>276</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	80	55	57	31	23	24
	55-59 ans	139	76	63	25	18	51	45
	60-64 ans	197	121	76	24	17	97	59
	65-69 ans	246	157	89	24	11	133	78
	70-74 ans	157	97	60	14	7	83	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>874</b>	<b>531</b>	<b>343</b>	<b>144</b>	<b>84</b>	<b>387</b>	<b>259</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	127	77	50	55	30	22	20
	55-59 ans	132	71	61	23	18	48	43
	60-64 ans	187	115	72	23	17	92	55
	65-69 ans	228	148	80	21	9	127	71
	70-74 ans	146	90	56	14	6	76	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>820</b>	<b>501</b>	<b>319</b>	<b>136</b>	<b>80</b>	<b>365</b>	<b>239</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 55 - Meuse

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	134	80	54	57	30	23	24
	55-59 ans	139	76	63	25	18	51	45
	60-64 ans	196	121	75	24	17	97	58
	65-69 ans	245	157	88	24	11	133	77
	70-74 ans	156	96	60	14	7	82	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>870</b>	<b>530</b>	<b>340</b>	<b>144</b>	<b>83</b>	<b>386</b>	<b>257</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	134	79	55	56	31	23	24
	55-59 ans	136	73	63	23	18	50	45
	60-64 ans	196	121	75	24	17	97	58
	65-69 ans	244	156	88	24	11	132	77
	70-74 ans	154	95	59	14	7	81	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>864</b>	<b>524</b>	<b>340</b>	<b>141</b>	<b>84</b>	<b>383</b>	<b>256</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	135	80	55	57	31	23	24
	55-59 ans	139	76	63	25	18	51	45
	60-64 ans	197	121	76	24	17	97	59
	65-69 ans	246	157	89	24	11	133	78
	70-74 ans	157	97	60	14	7	83	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>874</b>	<b>531</b>	<b>343</b>	<b>144</b>	<b>84</b>	<b>387</b>	<b>259</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51	25	26	15	14	10	12
	55-59 ans	44	17	27	4	9	13	18

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44	23	21	3	1	20	20
	65-69 ans	71	36	35	5	5	31	30
	70-74 ans	39	21	18	2	2	19	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>249</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>93</b>	<b>96</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	13	6	7	3	3	3	4
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	9	3	8	1	1	2
	55-59 ans	12	8	4	3	0	5	4
	60-64 ans	25	20	5	4	2	16	3
	65-69 ans	33	20	13	2	2	18	11
	70-74 ans	14	8	6	2	1	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>25</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	46	30	16	24	11	6	5
	55-59 ans	50	33	17	8	6	25	11
	60-64 ans	82	55	27	11	6	44	21
	65-69 ans	97	70	27	11	3	59	24
	70-74 ans	67	44	23	7	3	37	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>232</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>171</b>	<b>81</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	4	6	2	2	2	4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	15	7	8	3	4	4	4
	65-69 ans	18	12	6	3	1	9	5
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	9	4	5	2	1	2	4
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	41	20	33	13	8	7
	55-59 ans	67	43	24	12	6	31	18
	60-64 ans	113	80	33	15	8	65	25
	65-69 ans	136	94	42	13	5	81	37
	70-74 ans	87	56	31	10	4	46	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>464</b>	<b>314</b>	<b>150</b>	<b>83</b>	<b>36</b>	<b>231</b>	<b>114</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 55 - Meuse

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	30	16	24	11	6	5
	55-59 ans	50	33	17	8	6	25	11
	60-64 ans	82	55	27	11	6	44	21
	65-69 ans	97	70	27	11	3	59	24
	70-74 ans	67	44	23	7	3	37	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>232</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>171</b>	<b>81</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	39	26	13	20	9	6	4
	55-59 ans	45	29	16	8	6	21	10
	60-64 ans	73	49	24	10	5	39	19
	65-69 ans	85	64	21	10	2	54	19
	70-74 ans	54	34	20	5	2	29	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>296</b>	<b>202</b>	<b>94</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>149</b>	<b>70</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	44	28	16	22	10	6	6
	55-59 ans	46	29	17	8	6	21	11
	60-64 ans	80	55	25	10	6	45	19
	65-69 ans	92	69	23	12	3	57	20
	70-74 ans	55	34	21	5	2	29	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>215</b>	<b>102</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>158</b>	<b>75</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	4	6	2	2	2	4
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	15	7	8	3	4	4	4
	65-69 ans	18	12	6	3	1	9	5
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	3	6	1	2	2	4
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	13	6	7	2	4	4	3
	65-69 ans	17	11	6	2	1	9	5
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 55 - Meuse

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	1	5	0	2	1	3
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	3	4	1	2	2	2
	55-59 ans	7	4	3	3	0	1	3
	60-64 ans	12	6	6	2	4	4	2
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,6	6,0	7,5	6,9	4,9	4,3
	55-59 ans	5,9	6,3	5,6	7,6	5,6	5,8	5,5
	60-64 ans	5,7	5,6	5,9	8,1	6,0	5,0	5,8
	65-69 ans	6,2	6,5	5,9	8,5	11,8	6,1	5,3
	70-74 ans	6,5	5,9	7,0	7,5	10,7	5,6	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2,0	1,6	2,9	2,3	0,3	0,4
	55-59 ans	1,3	1,5	1,1	3,1	1,3	1,0	1,0
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	1,9	1,1	0,3	0,8
	65-69 ans	0,8	0,9	0,6	2,5	2,7	0,6	0,4
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	0,6	5,0	1,4	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,2	69,5	72,9	61,6	67,3	93,8	90,3
	55-59 ans	78,0	75,7	80,6	58,8	77,3	83,1	81,5
	60-64 ans	87,2	88,5	86,2	76,7	81,0	93,2	87,2
	65-69 ans	87,6	86,0	89,2	70,8	76,9	89,5	92,3
	70-74 ans	80,1	78,6	81,3	91,7	53,8	75,9	85,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,8</b>	<b>79,4</b>	<b>82,1</b>	<b>66,3</b>	<b>70,6</b>	<b>87,0</b>	<b>87,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,8	3,0	5,3	2,7	3,8	3,5
	55-59 ans	4,2	4,9	3,7	6,9	5,2	4,2	3,2
	60-64 ans	5,2	6,9	3,7	7,4	5,2	6,8	3,4
	65-69 ans	6,4	8,4	4,5	9,8	6,5	8,1	4,3
	70-74 ans	6,7	8,8	4,9	8,8	7,0	8,8	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>6,6</b>	<b>4,0</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	97,8	100,0	98,5	100,0	96,0	100,0
	55-59 ans	99,3	98,8	100,0	96,7	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,6
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,7	87,9	87,3	85,1	81,6	95,8	96,0
	55-59 ans	92,1	90,5	94,0	86,2	90,0	92,7	95,7
	60-64 ans	94,7	95,3	93,8	88,9	94,4	97,0	93,7
	65-69 ans	93,5	94,6	91,8	88,9	78,6	95,7	94,0
	70-74 ans	92,4	93,3	90,9	100,0	87,5	92,2	91,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,4</b>	<b>92,8</b>	<b>91,7</b>	<b>87,8</b>	<b>85,7</b>	<b>94,9</b>	<b>93,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,1	96,3	90,9	96,5	96,8	95,7	83,3
	55-59 ans	95,0	93,4	96,8	92,0	100,0	94,1	95,6
	60-64 ans	94,9	95,0	94,7	95,8	100,0	94,8	93,2
	65-69 ans	92,7	94,3	89,9	87,5	81,8	95,5	91,0
	70-74 ans	93,0	92,8	93,3	100,0	85,7	91,6	94,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>94,4</b>	<b>93,0</b>	<b>94,4</b>	<b>95,2</b>	<b>94,3</b>	<b>92,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	4	4
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	5	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	112	125	93	115	83	149	105
	55-59 ans	119	134	101	161	91	123	105
	60-64 ans	113	113	113	123	131	111	108
	65-69 ans	109	113	101	90	88	117	103
	70-74 ans	106	106	106	91	89	109	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>117</b>	<b>103</b>	<b>117</b>	<b>96</b>	<b>117</b>	<b>106</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (61-125)	105 (69-132)	70,5 (57-96)	104 (65,5-136)	71 (60-95)	105 (78-131)	65 (51-125)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88 (61-134)	89,5 (61-138)	87 (61-129)	83 (55-144)	79,5 (44-129)	93 (62-138)	88 (63-127)
	60-64 ans	90 (65-129,5)	94 (68-137)	88,5 (59,5-122)	87 (67,5-153)	96 (73-111)	94 (68-135,5)	83 (58-126)
	65-69 ans	91 (65,5-128)	91,5 (64-128,5)	88 (68-126)	90,5 (64-114)	73 (55-122)	91,5 (64-137)	89 (69-128)
	70-74 ans	85 (63-117,5)	83,5 (63-117)	93 (66-118)	82,5 (68-99)	86 (75-109)	85 (61-118)	96 (65-119)
	<b>50-74 ans</b>	<b>89 (63-128)</b>	<b>91 (65-131)</b>	<b>86 (62-124)</b>	<b>91 (67-128)</b>	<b>78 (58-110)</b>	<b>91 (64-131,5)</b>	<b>88 (63-126)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	4,3	1,6	4,4	2,6	4,0	0,0
	55-59 ans	4,6	4,7	4,5	10,0	5,0	1,8	4,3
	60-64 ans	2,9	3,1	2,5	7,4	0,0	2,0	3,2
	65-69 ans	3,0	3,0	3,0	7,4	0,0	2,2	3,5
	70-74 ans	3,5	2,9	4,5	0,0	12,5	3,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,8	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,8	96,1	100,0	92,0	100,0	98,0	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	98,3
	65-69 ans	99,2	99,4	98,9	100,0	100,0	99,2	98,7
	70-74 ans	98,1	97,9	98,3	100,0	100,0	97,6	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>98,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,8	31,3	47,3	26,3	45,2	43,5	50,0
	55-59 ans	31,7	22,4	42,9	16,0	50,0	25,5	40,0
	60-64 ans	22,3	19,0	27,6	12,5	5,9	20,6	33,9
	65-69 ans	28,9	22,9	39,3	20,8	45,5	23,3	38,5
	70-74 ans	24,8	21,6	30,0	14,3	28,6	22,9	30,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,5</b>	<b>23,0</b>	<b>37,0</b>	<b>20,1</b>	<b>36,9</b>	<b>24,0</b>	<b>37,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	8,8	1,8	8,8	3,2	8,7	0,0
	55-59 ans	5,0	5,3	4,8	8,0	5,6	3,9	4,4
	60-64 ans	6,6	5,0	9,2	12,5	17,6	3,1	6,8
	65-69 ans	3,3	3,8	2,2	4,2	0,0	3,8	2,6
	70-74 ans	5,7	5,2	6,7	7,1	14,3	4,8	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,8	0,6	1,1	0,0	0,0	0,8	1,3
	70-74 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,9	11,3	5,5	14,0	3,2	4,3	8,3
	55-59 ans	8,6	10,5	6,3	12,0	0,0	9,8	8,9
	60-64 ans	12,7	16,5	6,6	16,7	11,8	16,5	5,1
	65-69 ans	13,4	12,7	14,6	8,3	18,2	13,5	14,1
	70-74 ans	8,9	8,2	10,0	14,3	14,3	7,2	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,0</b>	<b>12,2</b>	<b>9,0</b>	<b>13,2</b>	<b>7,1</b>	<b>11,9</b>	<b>9,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,1	37,5	29,1	42,1	35,5	26,1	20,8
	55-59 ans	36,0	43,4	27,0	32,0	33,3	49,0	24,4
	60-64 ans	41,6	45,5	35,5	45,8	35,3	45,4	35,6
	65-69 ans	39,4	44,6	30,3	45,8	27,3	44,4	30,8
	70-74 ans	42,7	45,4	38,3	50,0	42,9	44,6	37,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,1</b>	<b>43,7</b>	<b>32,1</b>	<b>42,4</b>	<b>34,5</b>	<b>44,2</b>	<b>31,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,4	5,0	10,9	3,5	6,5	8,7	16,7
	55-59 ans	5,8	5,3	6,3	12,0	5,6	2,0	6,7
	60-64 ans	7,6	5,8	10,5	12,5	23,5	4,1	6,8
	65-69 ans	7,3	7,6	6,7	12,5	9,1	6,8	6,4
	70-74 ans	8,9	10,3	6,7	7,1	0,0	10,8	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,0	3,6	0,0	3,2	0,0	4,2
	55-59 ans	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,5	1,8	1,8	3,2	4,3	0,0
	55-59 ans	6,5	5,3	7,9	8,0	5,6	3,9	8,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,1	4,1	3,9	0,0	0,0	5,2	5,1
	65-69 ans	3,7	3,2	4,5	4,2	0,0	3,0	5,1
	70-74 ans	5,1	5,2	5,0	7,1	0,0	4,8	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,2	2,6	1,6	4,0	0,0	2,0	2,2
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,8	0,6	1,1	0,0	0,0	0,8	1,3
	70-74 ans	2,5	3,1	1,7	0,0	0,0	3,6	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,1	21,1	9,5	25,6	9,4	12,2	9,7
	55-59 ans	18,7	24,6	13,1	27,7	15,5	23,6	12,4
	60-64 ans	27,9	43,2	15,0	41,1	23,2	43,8	13,5
	65-69 ans	32,7	47,4	19,3	47,3	23,3	47,5	18,9
	70-74 ans	34,4	47,5	23,0	62,5	34,8	45,2	21,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,3</b>	<b>36,1</b>	<b>15,5</b>	<b>32,9</b>	<b>14,7</b>	<b>37,4</b>	<b>15,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>24,2</b>	<b>34,2</b>	<b>15,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,4	15,4	7,6	18,6	7,9	9,1	7,0
	55-59 ans	14,0	18,9	9,3	18,5	15,5	19,0	7,6
	60-64 ans	20,3	29,7	12,3	30,1	17,4	29,6	11,3
	65-69 ans	23,3	35,3	12,4	40,0	14,0	34,6	12,2
	70-74 ans	26,5	37,4	17,1	43,8	26,1	36,3	16,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>26,7</b>	<b>11,4</b>	<b>24,2</b>	<b>11,9</b>	<b>27,7</b>	<b>11,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,9</b>	<b>25,3</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	13,4	6,2	15,5	6,5	9,1	5,6
	55-59 ans	12,6	16,6	8,7	18,5	15,5	16,0	6,9
	60-64 ans	18,0	26,5	10,9	27,4	14,5	26,3	10,3
	65-69 ans	20,4	32,3	9,7	36,4	9,3	31,6	9,7
	70-74 ans	21,4	28,9	14,8	31,3	17,4	28,5	14,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>23,2</b>	<b>9,7</b>	<b>21,0</b>	<b>9,8</b>	<b>24,1</b>	<b>9,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,5</b>	<b>21,9</b>	<b>9,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	14,4	7,6	17,1	7,2	9,1	8,4
	55-59 ans	12,8	16,6	9,3	18,5	15,5	16,0	7,6
	60-64 ans	19,8	29,7	11,4	27,4	17,4	30,3	10,3
	65-69 ans	22,1	34,8	10,6	43,6	14,0	33,4	10,2
	70-74 ans	21,8	28,9	15,6	31,3	17,4	28,5	15,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>24,7</b>	<b>10,6</b>	<b>22,6</b>	<b>11,0</b>	<b>25,6</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,6</b>	<b>23,2</b>	<b>10,5</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,1	2,9	1,6	1,4	3,0	5,6
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	6,9	2,6	0,8	2,1
	60-64 ans	3,7	3,8	3,6	8,2	11,6	2,7	2,2
	65-69 ans	4,3	6,1	2,8	10,9	4,7	5,3	2,5
	70-74 ans	5,5	8,5	3,0	6,3	0,0	8,8	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	33,3	83,3	0,0	100,0	50,0	75,0
	55-59 ans	37,5	50,0	25,0	66,7	100,0	0,0	0,0
	60-64 ans	30,8	16,7	42,9	0,0	50,0	25,0	33,3
	65-69 ans	52,9	45,5	66,7	50,0	100,0	44,4	60,0
	70-74 ans	28,6	20,0	50,0	0,0	0,0	22,2	50,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,6</b>	<b>32,4</b>	<b>55,6</b>	<b>33,3</b>	<b>75,0</b>	<b>32,0</b>	<b>47,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)