

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 60 - Oise

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 144	6 824	7 320	4 979	5 100	1 845	2 220
	55-59 ans	10 933	4 979	5 954	1 531	1 682	3 448	4 272
	60-64 ans	10 900	4 738	6 162	1 284	1 275	3 454	4 887
	65-69 ans	11 021	4 852	6 169	1 058	981	3 794	5 188
	70-74 ans	6 774	2 916	3 858	502	520	2 414	3 338
	50-74 ans	53 772	24 309	29 463	9 354	9 558	14 955	19 905
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 243	617	626	492	462	125	164
	55-59 ans	1 000	456	544	141	191	315	353
	60-64 ans	892	403	489	112	129	291	360
	65-69 ans	832	372	460	93	89	279	371
	70-74 ans	632	278	354	39	55	239	299
	50-74 ans	4 599	2 126	2 473	877	926	1 249	1 547
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	892	431	461	336	317	95	144
	55-59 ans	746	346	400	86	119	260	281
	60-64 ans	685	307	378	72	88	235	290
	65-69 ans	634	285	349	61	51	224	298
	70-74 ans	478	215	263	26	39	189	224
	50-74 ans	3 435	1 584	1 851	581	614	1 003	1 237
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	351	186	165	156	145	30	20
	55-59 ans	254	110	144	55	72	55	72
	60-64 ans	207	96	111	40	41	56	70
	65-69 ans	198	87	111	32	38	55	73
	70-74 ans	154	63	91	13	16	50	75
	50-74 ans	1 164	542	622	296	312	246	310
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 793	6 638	7 155	4 823	4 955	1 815	2 200
	55-59 ans	10 679	4 869	5 810	1 476	1 610	3 393	4 200
	60-64 ans	10 693	4 642	6 051	1 244	1 234	3 398	4 817
	65-69 ans	10 823	4 765	6 058	1 026	943	3 739	5 115
	70-74 ans	6 620	2 853	3 767	489	504	2 364	3 263
	50-74 ans	52 608	23 767	28 841	9 058	9 246	14 709	19 595
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	537	295	242	226	184	69	58
	55-59 ans	444	252	192	90	66	162	126
	60-64 ans	510	288	222	83	48	205	174
	65-69 ans	576	324	252	84	46	240	206

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 60 - Oise

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	428	241	187	51	46	190	141
	50-74 ans	2 495	1 400	1 095	534	390	866	705
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	534	294	240	226	182	68	58
	55-59 ans	443	252	191	90	65	162	126
	60-64 ans	506	285	221	83	48	202	173
	65-69 ans	572	324	248	84	46	240	202
	70-74 ans	425	240	185	51	45	189	140
	50-74 ans	2 480	1 395	1 085	534	386	861	699
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	479	257	222	192	168	65	54
	55-59 ans	405	233	172	80	55	153	117
	60-64 ans	474	266	208	75	44	191	164
	65-69 ans	517	295	222	73	38	222	184
	70-74 ans	369	206	163	42	38	164	125
	50-74 ans	2 244	1 257	987	462	343	795	644
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	469	254	215	190	162	64	53
	55-59 ans	400	230	170	80	55	150	115
	60-64 ans	466	264	202	75	43	189	159
	65-69 ans	510	292	218	72	38	220	180
	70-74 ans	357	199	158	42	38	157	120
	50-74 ans	2 202	1 239	963	459	336	780	627
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	477	256	221	191	168	65	53
	55-59 ans	404	232	172	80	55	152	117
	60-64 ans	471	266	205	75	44	191	161
	65-69 ans	513	293	220	73	38	220	182
	70-74 ans	364	204	160	42	38	162	122
	50-74 ans	2 229	1 251	978	461	343	790	635
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	15	6	9	1	0	5	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	3	8	0	4	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	476	257	219	192	165	65	54
	55-59 ans	405	233	172	80	55	153	117
	60-64 ans	472	266	206	75	44	191	162
	65-69 ans	516	295	221	73	38	222	183
	70-74 ans	366	205	161	42	38	163	123
	50-74 ans	2 235	1 256	979	462	340	794	639
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	482	258	224	192	170	66	54
	55-59 ans	406	233	173	80	56	153	117
	60-64 ans	475	267	208	75	44	192	164
	65-69 ans	520	295	225	73	38	222	187
	70-74 ans	372	207	165	42	39	165	126
	50-74 ans	2 255	1 260	995	462	347	798	648
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	183	84	99	64	75	20	24
	55-59 ans	138	62	76	21	27	41	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	165	76	89	19	23	57	66
	65-69 ans	156	66	90	14	15	52	75
	70-74 ans	108	46	62	6	13	40	49
	50-74 ans	750	334	416	124	153	210	263
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	51	20	31	16	24	4	7
	55-59 ans	47	23	24	6	6	17	18
	60-64 ans	40	20	20	5	4	15	16
	65-69 ans	36	14	22	5	5	9	17
	70-74 ans	27	12	15	1	4	11	11
	50-74 ans	201	89	112	33	43	56	69
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	10	5	5	1	2	4	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	24	15	9	6	4	9	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	91	60	31	43	27	17	4
	55-59 ans	75	48	27	13	6	35	21
	60-64 ans	105	67	38	18	3	49	35
	65-69 ans	120	73	47	19	8	54	39
	70-74 ans	81	49	32	10	6	39	26
	50-74 ans	472	297	175	103	50	194	125
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	120	79	41	58	28	21	13
	55-59 ans	100	72	28	27	8	45	20
	60-64 ans	120	77	43	26	8	51	35
	65-69 ans	159	107	52	24	5	83	47
	70-74 ans	113	74	39	17	9	57	30
	50-74 ans	612	409	203	152	58	257	145
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	7	10	5	6	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	17	7	10	3	7	4
	60-64 ans	28	19	9	5	4	14	5
	65-69 ans	38	29	9	8	5	21	4
	70-74 ans	34	22	12	8	6	14	6
	50-74 ans	141	94	47	36	24	58	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	0	4	0	2	0	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	50-74 ans	25	12	13	6	3	6	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	211	139	72	101	55	38	17
	55-59 ans	175	120	55	40	14	80	41
	60-64 ans	225	144	81	44	11	100	70
	65-69 ans	279	180	99	43	13	137	86
	70-74 ans	194	123	71	27	15	96	56
	50-74 ans	1 084	706	378	255	108	451	270

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	120	79	41	58	28	21	13
	55-59 ans	100	72	28	27	8	45	20
	60-64 ans	120	77	43	26	8	51	35
	65-69 ans	159	107	52	24	5	83	47
	70-74 ans	113	74	39	17	9	57	30
	50-74 ans	612	409	203	152	58	257	145
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	105	70	35	51	25	19	10
	55-59 ans	69	47	22	20	7	27	15
	60-64 ans	91	59	32	16	7	43	25
	65-69 ans	123	86	37	16	3	70	34
	70-74 ans	97	64	33	15	9	49	24
	50-74 ans	485	326	159	118	51	208	108
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	137	94	43	69	32	25	11
	55-59 ans	94	68	26	27	8	41	18
	60-64 ans	130	88	42	26	8	62	34
	65-69 ans	180	120	60	25	7	95	53
	70-74 ans	136	91	45	21	10	70	35
	50-74 ans	677	461	216	168	65	293	151
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	7	10	5	6	2	4
	55-59 ans	24	17	7	10	3	7	4
	60-64 ans	28	19	9	5	4	14	5
	65-69 ans	39	29	10	8	5	21	5
	70-74 ans	34	22	12	8	6	14	6
	50-74 ans	142	94	48	36	24	58	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	7	10	5	6	2	4
	55-59 ans	23	16	7	10	3	6	4
	60-64 ans	28	19	9	5	4	14	5
	65-69 ans	35	25	10	7	5	18	5
	70-74 ans	31	19	12	7	6	12	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 60 - Oise

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	134	86	48	34	24	52	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	50-74 ans	27	19	8	10	4	9	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	2	6	1	4	1	2
	55-59 ans	19	12	7	7	3	5	4
	60-64 ans	23	16	7	4	3	12	4
	65-69 ans	32	22	10	7	5	15	5
	70-74 ans	25	15	10	5	5	10	5
	50-74 ans	107	67	40	24	20	43	20
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	2	5	1	3	1	2
	55-59 ans	11	7	4	5	1	2	3
	60-64 ans	16	12	4	3	3	9	1
	65-69 ans	18	13	5	3	3	10	2
	70-74 ans	17	10	7	3	2	7	5
	50-74 ans	69	44	25	15	12	29	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	14	9	5	4	2	5	3
	70-74 ans	8	5	3	2	3	3	0
	50-74 ans	38	23	15	9	8	14	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	7	5	2	2	2	3	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	30	21	9	7	6	14	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	2	1	
	70-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
	50-74 ans	21	12	9	6	3	6	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	5	9	3	6	2	3
	55-59 ans	22	15	7	9	3	6	4
	60-64 ans	26	17	9	4	4	13	5
	65-69 ans	33	23	10	7	5	16	5
	70-74 ans	26	15	11	5	5	10	6
	50-74 ans	121	75	46	28	23	47	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	20	12	8	5	4	7	4
	60-64 ans	14	8	6	4	2	4	4
	65-69 ans	20	12	8	4	2	8	6
	70-74 ans	25	13	12	2	3	11	9
	50-74 ans	96	55	41	24	15	31	26

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9,0	8,6	9,9	9,1	6,8	7,4
	55-59 ans	9,1	9,2	9,1	9,2	11,4	9,1	8,3
	60-64 ans	8,2	8,5	7,9	8,7	10,1	8,4	7,4
	65-69 ans	7,5	7,7	7,5	8,8	9,1	7,4	7,2
	70-74 ans	9,3	9,5	9,2	7,8	10,6	9,9	9,0
	50-74 ans	8,6	8,7	8,4	9,4	9,7	8,4	7,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,7	2,3	3,1	2,8	1,6	0,9
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	3,6	4,3	1,6	1,7
	60-64 ans	1,9	2,0	1,8	3,1	3,2	1,6	1,4
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	3,0	3,9	1,4	1,4
	70-74 ans	2,3	2,2	2,4	2,6	3,1	2,1	2,2
	50-74 ans	2,2	2,2	2,1	3,2	3,3	1,6	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,8	69,9	73,6	68,3	68,6	76,0	87,8
	55-59 ans	74,6	75,9	73,5	61,0	62,3	82,5	79,6
	60-64 ans	76,8	76,2	77,3	64,3	68,2	80,8	80,6
	65-69 ans	76,2	76,6	75,9	65,6	57,3	80,3	80,3
	70-74 ans	75,6	77,3	74,3	66,7	70,9	79,1	74,9
	50-74 ans	74,7	74,5	74,8	66,2	66,3	80,3	80,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,4	3,4	4,7	3,7	3,8	2,6
	55-59 ans	4,2	5,2	3,3	6,1	4,1	4,8	3,0
	60-64 ans	4,8	6,2	3,7	6,7	3,9	6,0	3,6
	65-69 ans	5,3	6,8	4,2	8,2	4,9	6,4	4,0
	70-74 ans	6,5	8,4	5,0	10,4	9,1	8,0	4,3
	50-74 ans	4,7	5,9	3,8	5,9	4,2	5,9	3,6
50-74 ans **	4,8	5,9	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,7	99,2	100,0	98,9	98,6	100,0
	55-59 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	98,5	100,0	100,0
	60-64 ans	99,2	99,0	99,5	100,0	100,0	98,5	99,4
	65-69 ans	99,3	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,1
	70-74 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	97,8	99,5	99,3
	50-74 ans	99,4	99,6	99,1	100,0	99,0	99,4	99,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	87,4	92,5	85,0	92,3	95,6	93,1
	55-59 ans	91,4	92,5	90,1	88,9	84,6	94,4	92,9
	60-64 ans	93,7	93,3	94,1	90,4	91,7	94,6	94,8
	65-69 ans	90,4	91,0	89,5	86,9	82,6	92,5	91,1
	70-74 ans	86,8	85,8	88,1	82,4	84,4	86,8	89,3
	50-74 ans	90,5	90,1	91,0	86,5	88,9	92,3	92,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	98,8	96,8	99,0	96,4	98,5	98,1
	55-59 ans	98,8	98,7	98,8	100,0	100,0	98,0	98,3
	60-64 ans	98,3	99,2	97,1	100,0	97,7	99,0	97,0
	65-69 ans	98,6	99,0	98,2	98,6	100,0	99,1	97,8
	70-74 ans	96,7	96,6	96,9	100,0	100,0	95,7	96,0
	50-74 ans	98,1	98,6	97,6	99,4	98,0	98,1	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	4	3	4	4	4	3
	60-64 ans	3	4	3	4	3	4	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	4	4	5	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	129	133	125	136	127	124	120
	55-59 ans	120	122	117	134	112	116	119
	60-64 ans	123	130	113	135	123	128	110
	65-69 ans	129	130	127	115	109	135	130
	70-74 ans	125	129	118	148	101	125	124
	50-74 ans	125	129	120	133	119	127	121
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105 (73-152)	107 (73-152)	99,5 (74-149)	106,5 (71,5-147,5)	97,5 (74,5-143,5)	115 (85-156)	105 (54-159)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100 (68-141)	103 (68-145)	97 (67-140)	98 (68,5-145,5)	92 (63-131)	104 (68-143)	103 (70-142)
	60-64 ans	103 (65-148)	106 (67-153)	97 (64-144)	108 (66-161)	96 (59-166,5)	105 (68-151)	99 (65,5-140)
	65-69 ans	104 (67-154)	109 (67-163)	94,5 (67-152)	107 (56-144)	75 (60-115)	110,5 (68-164)	98,5 (69-152)
	70-74 ans	106 (71-155)	105,5 (73-161)	109 (68-146)	125 (83-176)	89 (60-126)	104 (71,5-158,5)	112 (74-151)
	50-74 ans	104 (68-151)	107 (69-153)	99 (67-145)	107 (68-154)	95 (65-140)	106 (69-153)	103 (68-149)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	3,4	2,9	4,0	2,2	1,4	5,2
	55-59 ans	4,5	4,8	4,2	5,6	6,1	4,3	3,2
	60-64 ans	2,7	2,8	2,7	4,8	4,2	2,0	2,3
	65-69 ans	3,5	3,7	3,2	4,8	4,3	3,3	2,9
	70-74 ans	5,8	5,4	6,4	3,9	6,5	5,8	6,4
	50-74 ans	3,8	3,9	3,7	4,5	3,8	3,6	3,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	98,2	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	98,8
	65-69 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,5
	70-74 ans	99,2	99,5	98,8	100,0	100,0	99,4	98,4
	50-74 ans	99,6	99,9	99,2	100,0	99,1	99,9	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,0	32,6	44,2	33,3	44,1	30,3	44,4
	55-59 ans	34,0	26,6	43,9	26,3	48,2	26,8	41,9
	60-64 ans	34,7	28,5	42,8	25,3	52,3	29,7	40,2
	65-69 ans	30,0	22,4	40,0	19,2	39,5	23,4	40,1
	70-74 ans	29,0	22,2	37,6	14,3	33,3	24,2	38,9
	50-74 ans	33,3	26,5	41,8	26,8	44,1	26,3	40,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,6	7,8	13,8	8,3	14,1	6,1	13,0
	55-59 ans	11,6	9,9	13,9	7,5	10,7	11,1	15,4
	60-64 ans	8,4	7,5	9,6	6,7	9,1	7,8	9,8
	65-69 ans	6,9	4,7	9,8	6,8	13,2	4,1	9,1
	70-74 ans	7,3	5,8	9,1	2,4	10,3	6,7	8,7
	50-74 ans	8,9	7,1	11,3	7,1	12,4	7,0	10,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,9	0,9	1,6	1,2	3,0	0,0
	55-59 ans	2,5	2,1	2,9	1,3	3,6	2,6	2,6
	60-64 ans	1,1	1,1	1,0	1,3	0,0	1,0	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	50-74 ans	1,1	1,2	0,9	1,3	1,2	1,1	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,9	23,3	13,8	22,4	15,9	25,8	7,4
	55-59 ans	18,5	20,6	15,6	16,3	10,7	22,9	17,9
	60-64 ans	22,1	25,1	18,3	24,0	6,8	25,5	21,3
	65-69 ans	23,1	24,7	20,9	26,0	21,1	24,3	20,9
	70-74 ans	21,8	23,7	19,4	23,8	15,4	23,6	20,6
	50-74 ans	20,9	23,6	17,6	22,3	14,4	24,3	19,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,9	30,6	18,3	30,2	16,5	31,8	24,1
	55-59 ans	24,6	30,9	16,2	33,8	14,3	29,4	17,1
	60-64 ans	25,3	28,8	20,7	34,7	18,2	26,6	21,3
	65-69 ans	30,6	36,3	23,1	32,9	13,2	37,4	25,1
	70-74 ans	30,4	35,7	23,6	40,5	23,1	34,5	23,8
	50-74 ans	27,1	32,5	20,4	32,9	16,7	32,2	22,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	2,7	4,5	2,6	3,5	3,0	7,4
	55-59 ans	5,9	7,3	4,0	12,5	5,4	4,6	3,4
	60-64 ans	5,9	7,1	4,3	6,7	9,1	7,3	3,0
	65-69 ans	7,3	9,8	4,0	11,0	13,2	9,5	2,1
	70-74 ans	9,1	10,6	7,3	19,0	15,4	8,5	4,8
	50-74 ans	6,3	7,5	4,7	7,8	6,9	7,3	3,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	3,7
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	1,0	0,6
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0,0	0,0	0,9	1,1
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,6	0,8	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,9	1,2	1,3	1,8	0,7	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,1	0,4	1,9	0,0	2,3	0,5	1,8
	65-69 ans	1,0	1,0	0,9	2,7	0,0	0,5	1,1
	70-74 ans	2,2	1,4	3,0	0,0	2,6	1,8	3,2
	50-74 ans	1,1	1,0	1,3	1,3	0,9	0,8	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	20,9	10,1	20,9	11,1	20,9	7,7
	55-59 ans	16,4	24,6	9,5	27,1	8,7	23,6	9,8
	60-64 ans	21,0	31,0	13,4	35,4	8,9	29,4	14,5
	65-69 ans	25,8	37,8	16,3	41,9	13,8	36,6	16,8
	70-74 ans	29,3	43,1	18,8	55,2	29,8	40,6	17,2
	50-74 ans	20,6	29,7	13,1	28,2	11,7	30,7	13,8
	50-74 ans **	20,9	29,5	12,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	11,9	5,7	12,0	5,7	11,6	5,9
	55-59 ans	9,4	14,8	4,8	18,3	5,0	13,3	4,8
	60-64 ans	11,2	16,6	7,1	20,9	6,5	15,0	7,3
	65-69 ans	14,7	22,5	8,6	23,4	5,3	22,2	9,2
	70-74 ans	17,1	25,9	10,4	34,8	17,9	24,1	9,2
	50-74 ans	11,6	17,2	7,0	16,8	6,3	17,5	7,4
	50-74 ans **	11,8	17,1	6,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,5	4,9	10,6	5,0	10,5	4,5
	55-59 ans	6,5	9,7	3,8	13,6	4,3	8,0	3,6
	60-64 ans	8,5	12,7	5,3	12,9	5,7	12,7	5,2
	65-69 ans	11,4	18,0	6,1	15,6	3,2	18,7	6,6
	70-74 ans	14,7	22,4	8,8	30,7	17,9	20,7	7,4
	50-74 ans	9,2	13,7	5,5	13,0	5,5	14,1	5,5
	50-74 ans **	9,3	13,5	5,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	14,2	6,0	14,3	6,5	13,8	5,0
	55-59 ans	8,8	14,0	4,5	18,3	5,0	12,1	4,3
	60-64 ans	12,2	19,0	6,9	20,9	6,5	18,2	7,1
	65-69 ans	16,6	25,2	9,9	24,4	7,4	25,4	10,4
	70-74 ans	20,5	31,9	11,9	42,9	19,8	29,6	10,7
	50-74 ans	12,9	19,4	7,5	18,5	7,0	19,9	7,7
	50-74 ans **	13,0	19,2	7,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,4	1,0	1,2	1,1	1,8
	55-59 ans	2,2	3,5	1,2	6,8	1,9	2,1	1,0
	60-64 ans	2,6	4,1	1,5	4,0	3,2	4,1	1,0
	65-69 ans	3,6	6,1	1,7	7,8	5,3	5,6	1,0
	70-74 ans	5,1	7,7	3,2	16,4	11,9	5,9	1,8
	50-74 ans	2,7	4,0	1,7	4,0	2,6	3,9	1,2
	50-74 ans **	2,8	4,0	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	52,9	71,4	40,0	80,0	33,3	50,0	50,0
	55-59 ans	17,4	25,0	0,0	30,0	0,0	16,7	0,0
	60-64 ans	17,9	15,8	22,2	20,0	25,0	14,3	20,0
	65-69 ans	8,6	12,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	70-74 ans	19,4	21,1	16,7	28,6	16,7	16,7	16,7
	50-74 ans	20,1	22,1	16,7	29,4	16,7	17,3	16,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)