

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 898	5 216	5 682	3 735	3 935	1 481	1 747
	55-59 ans	10 600	4 813	5 787	1 328	1 512	3 485	4 275
	60-64 ans	11 818	5 340	6 478	1 419	1 439	3 921	5 039
	65-69 ans	12 509	5 635	6 874	1 117	1 175	4 518	5 699
	70-74 ans	9 342	4 119	5 223	714	744	3 405	4 479
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 167</b>	<b>25 123</b>	<b>30 044</b>	<b>8 313</b>	<b>8 805</b>	<b>16 810</b>	<b>21 239</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	727	348	379	259	281	89	98
	55-59 ans	689	301	388	99	114	202	274
	60-64 ans	746	337	409	82	90	255	319
	65-69 ans	832	359	473	78	90	281	383
	70-74 ans	702	308	394	65	66	243	328
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 696</b>	<b>1 653</b>	<b>2 043</b>	<b>583</b>	<b>641</b>	<b>1 070</b>	<b>1 402</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	518	259	259	186	183	73	76
	55-59 ans	490	212	278	61	70	151	208
	60-64 ans	566	257	309	51	55	206	254
	65-69 ans	627	281	346	58	62	223	284
	70-74 ans	493	225	268	36	40	189	228
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 694</b>	<b>1 234</b>	<b>1 460</b>	<b>392</b>	<b>410</b>	<b>842</b>	<b>1 050</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	209	89	120	73	98	16	22
	55-59 ans	199	89	110	38	44	51	66
	60-64 ans	180	80	100	31	35	49	65
	65-69 ans	205	78	127	20	28	58	99
	70-74 ans	209	83	126	29	26	54	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 002</b>	<b>419</b>	<b>583</b>	<b>191</b>	<b>231</b>	<b>228</b>	<b>352</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 689	5 127	5 562	3 662	3 837	1 465	1 725
	55-59 ans	10 401	4 724	5 677	1 290	1 468	3 434	4 209
	60-64 ans	11 638	5 260	6 378	1 388	1 404	3 872	4 974
	65-69 ans	12 304	5 557	6 747	1 097	1 147	4 460	5 600
	70-74 ans	9 133	4 036	5 097	685	718	3 351	4 379
	<b>50-74 ans</b>	<b>54 165</b>	<b>24 704</b>	<b>29 461</b>	<b>8 122</b>	<b>8 574</b>	<b>16 582</b>	<b>20 887</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	377	204	173	149	118	55	55
	55-59 ans	396	217	179	68	53	149	126
	60-64 ans	516	299	217	99	58	200	159
	65-69 ans	615	350	265	89	56	261	209

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	570	325	245	68	45	257	200
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 474</b>	<b>1 395</b>	<b>1 079</b>	<b>473</b>	<b>330</b>	<b>922</b>	<b>749</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	371	200	171	146	117	54	54
	55-59 ans	394	216	178	68	53	148	125
	60-64 ans	506	293	213	98	58	195	155
	65-69 ans	608	346	262	88	56	258	206
	70-74 ans	554	313	241	65	44	248	197
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 433</b>	<b>1 368</b>	<b>1 065</b>	<b>465</b>	<b>328</b>	<b>903</b>	<b>737</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	326	169	157	120	108	49	49
	55-59 ans	359	193	166	57	48	136	118
	60-64 ans	452	258	194	80	53	178	141
	65-69 ans	552	318	234	78	48	240	186
	70-74 ans	494	284	210	55	37	229	173
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 183</b>	<b>1 222</b>	<b>961</b>	<b>390</b>	<b>294</b>	<b>832</b>	<b>667</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	312	160	152	115	105	45	47
	55-59 ans	343	188	155	54	43	134	112
	60-64 ans	428	244	184	77	51	167	133
	65-69 ans	533	310	223	74	47	236	176
	70-74 ans	469	269	200	50	37	219	163
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 085</b>	<b>1 171</b>	<b>914</b>	<b>370</b>	<b>283</b>	<b>801</b>	<b>631</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	324	168	156	119	108	49	48
	55-59 ans	356	191	165	55	48	136	117
	60-64 ans	444	253	191	79	53	174	138
	65-69 ans	547	316	231	77	47	239	184
	70-74 ans	489	280	209	53	37	227	172
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 160</b>	<b>1 208</b>	<b>952</b>	<b>383</b>	<b>293</b>	<b>825</b>	<b>659</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	8	5	3	1	0	4	3
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	8	3	5	1	0	2	5
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	322	166	156	117	108	49	48
	55-59 ans	356	192	164	56	48	136	116
	60-64 ans	448	255	193	80	53	175	140
	65-69 ans	551	318	233	78	48	240	185
	70-74 ans	492	283	209	54	37	229	172
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 169</b>	<b>1 214</b>	<b>955</b>	<b>385</b>	<b>294</b>	<b>829</b>	<b>661</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	329	171	158	122	108	49	50
	55-59 ans	360	194	166	57	48	137	118
	60-64 ans	454	260	194	80	53	180	141
	65-69 ans	560	321	239	79	48	242	191
	70-74 ans	500	289	211	56	37	233	174
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 203</b>	<b>1 235</b>	<b>968</b>	<b>394</b>	<b>294</b>	<b>841</b>	<b>674</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	121	45	76	36	50	9	26
	55-59 ans	98	38	60	9	17	29	43

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	127	54	73	11	20	43	53
	65-69 ans	145	65	80	12	14	53	66
	70-74 ans	148	62	86	12	16	50	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>639</b>	<b>264</b>	<b>375</b>	<b>80</b>	<b>117</b>	<b>184</b>	<b>258</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	19	10	9	10	7	0	2
	55-59 ans	18	12	6	6	1	6	5
	60-64 ans	27	12	15	3	3	9	12
	65-69 ans	21	12	9	1	3	11	6
	70-74 ans	21	11	10	2	1	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	47	28	19	19	14	9	5
	55-59 ans	76	44	32	12	13	32	19
	60-64 ans	91	57	34	21	10	36	24
	65-69 ans	121	79	42	16	9	63	33
	70-74 ans	115	72	43	11	9	61	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>450</b>	<b>280</b>	<b>170</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>201</b>	<b>115</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	100	62	38	39	26	23	12
	55-59 ans	111	65	46	20	9	45	37
	60-64 ans	145	97	48	31	16	66	32
	65-69 ans	186	113	73	33	18	80	55
	70-74 ans	137	91	46	22	7	69	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>679</b>	<b>428</b>	<b>251</b>	<b>145</b>	<b>76</b>	<b>283</b>	<b>175</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	13	9	4	5	3	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	11	10	3	5	8	5
	60-64 ans	27	17	10	8	1	9	9
	65-69 ans	40	24	16	9	2	15	14
	70-74 ans	44	29	15	5	3	24	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>41</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	7	5	4	4	3	1
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	13	6	7	3	0	3	7
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	3	0	0	3
	55-59 ans	15	10	5	0	1	10	4
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	18	11	7	2	1	9	6
	70-74 ans	16	12	4	2	0	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>22</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	147	90	57	58	40	32	17
	55-59 ans	187	109	78	32	22	77	56
	60-64 ans	236	154	82	52	26	102	56
	65-69 ans	307	192	115	49	27	143	88
	70-74 ans	252	163	89	33	16	130	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 129</b>	<b>708</b>	<b>421</b>	<b>224</b>	<b>131</b>	<b>484</b>	<b>290</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	100	62	38	39	26	23	12
	55-59 ans	111	65	46	20	9	45	37
	60-64 ans	145	97	48	31	16	66	32
	65-69 ans	186	113	73	33	18	80	55
	70-74 ans	137	91	46	22	7	69	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>679</b>	<b>428</b>	<b>251</b>	<b>145</b>	<b>76</b>	<b>283</b>	<b>175</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	80	53	27	31	18	22	9
	55-59 ans	78	42	36	12	5	30	31
	60-64 ans	114	77	37	27	12	50	25
	65-69 ans	119	72	47	26	13	46	34
	70-74 ans	93	66	27	17	4	49	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>484</b>	<b>310</b>	<b>174</b>	<b>113</b>	<b>52</b>	<b>197</b>	<b>122</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	88	59	29	37	19	22	10
	55-59 ans	96	56	40	17	6	39	34
	60-64 ans	128	85	43	32	14	53	29
	65-69 ans	154	97	57	28	14	69	43
	70-74 ans	122	84	38	22	6	62	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>381</b>	<b>207</b>	<b>136</b>	<b>59</b>	<b>245</b>	<b>148</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
	55-59 ans	22	11	11	3	6	8	5
	60-64 ans	27	17	10	8	1	9	9
	65-69 ans	40	24	16	9	2	15	14
	70-74 ans	46	29	17	5	3	24	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>149</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>44</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
	55-59 ans	21	11	10	3	6	8	4
	60-64 ans	27	17	10	8	1	9	9
	65-69 ans	39	23	16	8	2	15	14
	70-74 ans	44	27	17	5	3	22	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>43</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	11	6	5	2	3	4	2
	55-59 ans	8	3	5	0	3	3	2
	60-64 ans	18	10	8	5	1	5	7
	65-69 ans	25	13	12	3	1	10	11
	70-74 ans	31	19	12	4	2	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>32</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	13	8	5	3	3	5	2
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2
	65-69 ans	12	9	3	4	0	5	3
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	9	5	4	2	2	3	2
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	14	8	6	1	4	7	2
	60-64 ans	13	8	5	4	1	4	4
	65-69 ans	20	15	5	5	0	10	5
	70-74 ans	20	13	7	1	1	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>18</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	22	9	18	7	4	2
	55-59 ans	20	13	7	6	3	7	4
	60-64 ans	43	27	16	16	5	11	11
	65-69 ans	29	15	14	5	5	10	9
	70-74 ans	37	18	19	6	3	12	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>95</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>42</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	6,7	6,7	6,9	7,1	6,0	5,6
	55-59 ans	6,5	6,3	6,7	7,5	7,5	5,8	6,4
	60-64 ans	6,3	6,3	6,3	5,8	6,3	6,5	6,3
	65-69 ans	6,7	6,4	6,9	7,0	7,7	6,2	6,7
	70-74 ans	7,5	7,5	7,5	9,1	8,9	7,1	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,7	2,1	2,0	2,5	1,1	1,3
	55-59 ans	1,9	1,8	1,9	2,9	2,9	1,5	1,5
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,2	2,4	1,2	1,3
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	1,8	2,4	1,3	1,7
	70-74 ans	2,2	2,0	2,4	4,1	3,5	1,6	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	74,4	68,3	71,8	65,1	82,0	77,6
	55-59 ans	71,1	70,4	71,6	61,6	61,4	74,8	75,9
	60-64 ans	75,9	76,3	75,6	62,2	61,1	80,8	79,6
	65-69 ans	75,4	78,3	73,2	74,4	68,9	79,4	74,2
	70-74 ans	70,2	73,1	68,0	55,4	60,6	77,8	69,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,9</b>	<b>74,7</b>	<b>71,5</b>	<b>67,2</b>	<b>64,0</b>	<b>78,7</b>	<b>74,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,1	4,1	3,1	3,8	3,2
	55-59 ans	3,8	4,6	3,2	5,3	3,6	4,3	3,0
	60-64 ans	4,4	5,7	3,4	7,1	4,1	5,2	3,2
	65-69 ans	5,0	6,3	3,9	8,1	4,9	5,9	3,7
	70-74 ans	6,2	8,1	4,8	9,9	6,3	7,7	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>3,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,0	98,8	98,0	99,2	98,2	98,2
	55-59 ans	99,5	99,5	99,4	100,0	100,0	99,3	99,2
	60-64 ans	98,1	98,0	98,2	99,0	100,0	97,5	97,5
	65-69 ans	98,9	98,9	98,9	98,9	100,0	98,9	98,6
	70-74 ans	97,2	96,3	98,4	95,6	97,8	96,5	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>	<b>98,7</b>	<b>98,3</b>	<b>99,4</b>	<b>97,9</b>	<b>98,4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	84,5	91,8	82,2	92,3	90,7	90,7
	55-59 ans	91,1	89,4	93,3	83,8	90,6	91,9	94,4
	60-64 ans	89,3	88,1	91,1	81,6	91,4	91,3	91,0
	65-69 ans	90,8	91,9	89,3	88,6	85,7	93,0	90,3
	70-74 ans	89,2	90,7	87,1	84,6	84,1	92,3	87,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,7</b>	<b>89,3</b>	<b>90,2</b>	<b>83,9</b>	<b>89,6</b>	<b>92,1</b>	<b>90,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	94,7	96,8	95,8	97,2	91,8	95,9
	55-59 ans	95,5	97,4	93,4	94,7	89,6	98,5	94,9
	60-64 ans	94,7	94,6	94,8	96,3	96,2	93,8	94,3
	65-69 ans	96,6	97,5	95,3	94,9	97,9	98,3	94,6
	70-74 ans	94,9	94,7	95,2	90,9	100,0	95,6	94,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,5</b>	<b>95,8</b>	<b>95,1</b>	<b>94,9</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>	<b>94,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	106	97	104	95	108	100
	55-59 ans	93	92	94	84	90	96	96
	60-64 ans	172	225	102	112	94	276	105
	65-69 ans	96	94	99	84	125	98	92
	70-74 ans	89	94	83	99	84	93	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>94</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73,5 (51-110)	75 (56-118)	72 (47-103)	75,5 (56-116)	71 (47-94)	75 (56-122)	73 (48-108)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	73 (48-105)	76 (50-105)	69 (47-104)	73 (49-97)	69,5 (47,5-101,5)	76 (51-112)	68,5 (46-104)
	60-64 ans	71 (50-112,5)	70 (50-110)	74 (52-113)	71,5 (47-124)	68 (53-108)	70 (51-107)	74 (52-116)
	65-69 ans	72 (51-107,5)	74 (52-110)	69 (49-101)	57 (47-94)	74,5 (41,5-109)	76 (55-112,5)	68,5 (50-101)
	70-74 ans	69,5 (50-107)	70,5 (48,5-110,5)	68,5 (50-104)	74 (54-113)	69 (53-103)	69 (48-108)	68 (50-104)
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 (50-109)</b>	<b>73 (51-110)</b>	<b>70 (49-105)</b>	<b>70 (50-109)</b>	<b>70 (48-103)</b>	<b>74 (51-111)</b>	<b>70 (49-106)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,2	10,8	5,2	12,1	5,9	7,3	3,6
	55-59 ans	5,1	6,0	3,9	8,8	5,7	4,7	3,2
	60-64 ans	8,3	9,0	7,4	16,2	8,6	5,5	6,9
	65-69 ans	4,7	4,3	5,3	5,6	8,9	3,8	4,3
	70-74 ans	6,5	5,5	7,8	8,8	6,7	4,7	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>10,8</b>	<b>7,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,2	99,4	97,5	100,0	100,0	98,0
	55-59 ans	99,2	99,5	98,8	98,2	100,0	100,0	98,3
	60-64 ans	99,1	98,8	99,5	100,0	100,0	98,3	99,3
	65-69 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	70-74 ans	99,6	99,6	99,5	98,2	100,0	100,0	99,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,8	26,3	48,1	29,5	46,3	18,4	52,0
	55-59 ans	27,2	19,6	36,1	15,8	35,4	21,2	36,4
	60-64 ans	28,0	20,8	37,6	13,8	37,7	23,9	37,6
	65-69 ans	25,9	20,2	33,5	15,2	29,2	21,9	34,6
	70-74 ans	29,6	21,5	40,8	21,4	43,2	21,5	40,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,0</b>	<b>21,4</b>	<b>38,7</b>	<b>20,3</b>	<b>39,8</b>	<b>21,9</b>	<b>38,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	5,8	5,7	8,2	6,5	0,0	4,0
	55-59 ans	5,0	6,2	3,6	10,5	2,1	4,4	4,2
	60-64 ans	5,9	4,6	7,7	3,8	5,7	5,0	8,5
	65-69 ans	3,8	3,7	3,8	1,3	6,3	4,5	3,1
	70-74 ans	4,2	3,8	4,7	3,6	2,7	3,9	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,6	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

12/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
	50-54 ans	14,3	16,4	12,0	15,6	13,0	18,4	10,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	21,1	22,7	19,3	21,1	27,1	23,4	16,1
	60-64 ans	20,0	21,9	17,5	26,3	18,9	20,0	17,0
	65-69 ans	21,6	24,6	17,6	20,3	18,8	26,0	17,3
	70-74 ans	23,0	24,9	20,4	19,6	24,3	26,2	19,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>22,7</b>	<b>17,6</b>	<b>20,1</b>	<b>18,7</b>	<b>23,9</b>	<b>17,1</b>
	50-54 ans	30,4	36,3	24,1	32,0	24,1	46,9	24,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	30,8	33,5	27,7	35,1	18,8	32,8	31,4
	60-64 ans	31,9	37,3	24,7	38,8	30,2	36,7	22,7
	65-69 ans	33,2	35,2	30,5	41,8	37,5	33,1	28,8
	70-74 ans	27,4	31,5	21,8	39,3	18,9	29,6	22,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>34,7</b>	<b>25,9</b>	<b>36,8</b>	<b>25,9</b>	<b>33,7</b>	<b>26,0</b>
	50-54 ans	4,0	5,3	2,5	4,1	2,8	8,2	2,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	5,8	5,7	6,0	5,3	10,4	5,8	4,2
	60-64 ans	5,9	6,5	5,2	10,0	1,9	5,0	6,4
	65-69 ans	7,1	7,5	6,7	11,4	4,2	6,2	7,3
	70-74 ans	8,8	10,0	7,1	8,9	8,1	10,3	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>7,6</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,1</b>
	50-54 ans	3,6	4,1	3,2	3,3	3,7	6,1	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	3,1	4,1	1,8	5,3	2,1	3,6	1,7
	60-64 ans	2,2	2,7	1,5	3,8	1,9	2,2	1,4
	65-69 ans	2,3	1,9	2,9	3,8	0,0	1,2	3,7
	70-74 ans	2,2	2,1	2,4	3,6	2,7	1,7	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
	50-54 ans	1,8	1,8	1,9	2,5	0,0	0,0	6,0
	55-59 ans	4,2	5,2	3,0	0,0	2,1	7,3	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

13/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	3,5	3,1	3,8	1,9	3,3	3,5
	65-69 ans	3,2	3,4	2,9	2,5	2,1	3,7	3,1
	70-74 ans	3,2	4,2	1,9	3,6	0,0	4,3	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	2,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,7	0,8
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	0,0	0,0	1,1	0,7
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,8	1,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,8	17,6	10,2	15,8	10,4	21,8	9,9
	55-59 ans	18,0	23,1	13,7	24,8	15,0	22,4	13,3
	60-64 ans	20,3	29,3	12,9	37,5	18,5	26,3	11,3
	65-69 ans	25,0	34,6	17,0	44,7	23,5	32,1	15,7
	70-74 ans	27,6	40,4	17,5	48,2	22,3	38,8	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,8</b>	<b>28,7</b>	<b>14,3</b>	<b>27,6</b>	<b>15,3</b>	<b>29,2</b>	<b>13,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>20,1</b>	<b>27,0</b>	<b>13,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	12,1	6,8	10,6	6,8	15,7	7,0
	55-59 ans	10,7	13,8	8,1	15,5	6,1	13,1	8,8
	60-64 ans	12,5	18,4	7,5	22,3	11,4	17,0	6,4
	65-69 ans	15,1	20,3	10,8	30,1	15,7	17,9	9,8
	70-74 ans	15,0	22,5	9,0	32,1	9,7	20,6	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>17,3</b>	<b>8,5</b>	<b>17,9</b>	<b>8,9</b>	<b>17,1</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,2</b>	<b>16,5</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,3	4,9	8,5	4,7	15,0	5,2
	55-59 ans	7,5	8,9	6,3	9,3	3,4	8,7	7,4
	60-64 ans	9,8	14,6	5,8	19,5	8,5	12,9	5,0
	65-69 ans	9,7	13,0	7,0	23,7	11,3	10,3	6,1
	70-74 ans	10,2	16,4	5,3	24,8	5,6	14,6	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>	<b>5,9</b>	<b>13,9</b>	<b>6,1</b>	<b>11,9</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,8</b>	<b>12,1</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,5	5,2	10,1	5,0	15,0	5,8
	55-59 ans	9,2	11,9	7,0	13,2	4,1	11,4	8,1
	60-64 ans	11,0	16,2	6,7	23,1	10,0	13,7	5,8
	65-69 ans	12,5	17,5	8,4	25,5	12,2	15,5	7,7
	70-74 ans	13,4	20,8	7,5	32,1	8,4	18,5	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>15,4</b>	<b>7,0</b>	<b>16,7</b>	<b>6,9</b>	<b>14,8</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,7</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,8	0,9	1,4	0,8	2,7	1,2
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	2,3	4,1	2,3	1,2
	60-64 ans	2,3	3,2	1,6	5,8	0,7	2,3	1,8
	65-69 ans	3,3	4,3	2,4	8,2	1,7	3,4	2,5
	70-74 ans	5,0	7,2	3,3	7,3	4,2	7,2	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	78,6	66,7	100,0	40,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	38,1	27,3	50,0	0,0	50,0	37,5	50,0
	60-64 ans	66,7	58,8	80,0	62,5	100,0	55,6	77,8
	65-69 ans	64,1	56,5	75,0	37,5	50,0	66,7	78,6
	70-74 ans	70,5	70,4	70,6	80,0	66,7	68,2	71,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,1</b>	<b>58,6</b>	<b>72,4</b>	<b>48,3</b>	<b>66,7</b>	<b>63,8</b>	<b>74,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)