

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 299	10 057	10 242	7 162	6 943	2 895	3 299
	55-59 ans	17 331	8 255	9 076	1 729	1 583	6 526	7 493
	60-64 ans	17 760	8 159	9 601	887	815	7 272	8 786
	65-69 ans	16 192	7 689	8 503	529	472	7 160	8 031
	70-74 ans	10 989	5 140	5 849	247	208	4 893	5 641
	50-74 ans	82 571	39 300	43 271	10 554	10 021	28 746	33 250
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 590	789	801	592	579	197	222
	55-59 ans	1 370	688	682	174	145	514	537
	60-64 ans	1 302	596	706	93	70	503	636
	65-69 ans	1 187	578	609	51	43	527	566
	70-74 ans	895	432	463	28	26	404	437
	50-74 ans	6 344	3 083	3 261	938	863	2 145	2 398
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 021	508	513	367	354	141	159
	55-59 ans	940	485	455	113	86	372	369
	60-64 ans	903	416	487	57	43	359	444
	65-69 ans	823	408	415	29	24	379	391
	70-74 ans	545	257	288	11	14	246	274
	50-74 ans	4 232	2 074	2 158	577	521	1 497	1 637
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	569	281	288	225	225	56	63
	55-59 ans	430	203	227	61	59	142	168
	60-64 ans	399	180	219	36	27	144	192
	65-69 ans	364	170	194	22	19	148	175
	70-74 ans	350	175	175	17	12	158	163
	50-74 ans	2 112	1 009	1 103	361	342	648	761
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19 730	9 776	9 954	6 937	6 718	2 839	3 236
	55-59 ans	16 901	8 052	8 849	1 668	1 524	6 384	7 325
	60-64 ans	17 361	7 979	9 382	851	788	7 128	8 594
	65-69 ans	15 828	7 519	8 309	507	453	7 012	7 856
	70-74 ans	10 639	4 965	5 674	230	196	4 735	5 478
	50-74 ans	80 459	38 291	42 168	10 193	9 679	28 098	32 489
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	742	434	308	312	207	122	101
	55-59 ans	655	391	264	98	59	293	205
	60-64 ans	825	500	325	71	44	429	281
	65-69 ans	957	587	370	62	27	525	343

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	744	441	303	32	13	409	290
	50-74 ans	3 923	2 353	1 570	575	350	1 778	1 220
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	735	430	305	308	206	122	99
	55-59 ans	653	390	263	98	58	292	205
	60-64 ans	821	497	324	71	44	426	280
	65-69 ans	941	578	363	60	26	518	337
	70-74 ans	731	436	295	32	13	404	282
	50-74 ans	3 881	2 331	1 550	569	347	1 762	1 203
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	694	402	292	286	197	116	95
	55-59 ans	613	363	250	90	56	273	194
	60-64 ans	776	470	306	66	42	404	264
	65-69 ans	873	536	337	55	22	481	315
	70-74 ans	678	399	279	25	13	374	266
	50-74 ans	3 634	2 170	1 464	522	330	1 648	1 134
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	670	390	280	275	188	115	92
	55-59 ans	588	348	240	86	54	262	186
	60-64 ans	749	459	290	63	40	396	250
	65-69 ans	844	521	323	53	20	468	303
	70-74 ans	659	389	270	23	13	366	257
	50-74 ans	3 510	2 107	1 403	500	315	1 607	1 088
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	13	10	3	0	1	10	2
	60-64 ans	27	19	8	2	2	17	6
	65-69 ans	23	18	5	2	2	16	3
	70-74 ans	24	16	8	0	0	16	8
	50-74 ans	99	69	30	9	10	60	20
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	687	401	286	285	195	116	91
	55-59 ans	606	361	245	89	55	272	190
	60-64 ans	768	469	299	66	41	403	258
	65-69 ans	863	532	331	55	21	477	310
	70-74 ans	661	392	269	24	13	368	256
	50-74 ans	3 585	2 155	1 430	519	325	1 636	1 105
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	1	6	1	2	0	4
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	8	1	7	0	1	1	6
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5
	70-74 ans	17	7	10	1	0	6	10
	50-74 ans	49	15	34	3	5	12	29
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	694	402	292	286	197	116	95
	55-59 ans	613	363	250	90	56	273	194
	60-64 ans	775	470	305	66	41	404	264
	65-69 ans	873	536	337	55	22	481	315
	70-74 ans	678	399	279	25	13	374	266
	50-74 ans	3 633	2 170	1 463	522	329	1 648	1 134
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	694	402	292	286	197	116	95
	55-59 ans	614	364	250	90	56	274	194
	60-64 ans	778	471	307	66	42	405	265
	65-69 ans	878	537	341	56	22	481	319
	70-74 ans	683	402	281	25	13	377	268
	50-74 ans	3 647	2 176	1 471	523	330	1 653	1 141
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	270	135	135	98	88	37	47
	55-59 ans	186	85	101	20	24	65	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	213	97	116	15	16	82	100
	65-69 ans	224	114	110	11	6	103	104
	70-74 ans	188	84	104	5	3	79	101
	50-74 ans	1 081	515	566	149	137	366	429
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	40	21	19	13	11	8	8
	55-59 ans	21	8	13	3	0	5	13
	60-64 ans	38	16	22	1	1	15	21
	65-69 ans	33	15	18	2	0	13	18
	70-74 ans	25	16	9	1	2	15	7
	50-74 ans	157	76	81	20	14	56	67
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	9	7	2	7	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	19	14	5	7	3	7	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	99	59	40	44	28	15	12
	55-59 ans	106	67	39	14	8	53	31
	60-64 ans	129	84	45	8	4	76	41
	65-69 ans	156	92	64	8	4	84	60
	70-74 ans	119	71	48	5	1	66	47
	50-74 ans	609	373	236	79	45	294	191
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	217	141	76	97	57	44	19
	55-59 ans	236	165	71	41	17	124	54
	60-64 ans	311	224	87	30	16	194	71
	65-69 ans	337	232	105	22	6	210	99
	70-74 ans	264	175	89	10	3	165	86
	50-74 ans	1 365	937	428	200	99	737	329
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	36	25	11	18	8	7	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	36	24	12	8	2	16	10
	60-64 ans	64	36	28	9	3	27	25
	65-69 ans	94	62	32	9	5	53	27
	70-74 ans	71	49	22	4	3	45	19
	50-74 ans	301	196	105	48	21	148	84
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	16	8	8	3	2	5	6
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	20	12	8	2	0	10	8
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	67	39	28	11	5	28	23
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	7	6	5	2	2	4
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	44	23	21	9	5	14	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	316	200	116	141	85	59	31
	55-59 ans	342	232	110	55	25	177	85
	60-64 ans	440	308	132	38	20	270	112
	65-69 ans	493	324	169	30	10	294	159
	70-74 ans	383	246	137	15	4	231	133
	50-74 ans	1 974	1 310	664	279	144	1 031	520

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	217	141	76	97	57	44	19
	55-59 ans	236	165	71	41	17	124	54
	60-64 ans	311	224	87	30	16	194	71
	65-69 ans	337	232	105	22	6	210	99
	70-74 ans	264	175	89	10	3	165	86
	50-74 ans	1 365	937	428	200	99	737	329
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	186	123	63	86	45	37	18
	55-59 ans	193	133	60	36	17	97	43
	60-64 ans	245	176	69	24	12	152	57
	65-69 ans	265	188	77	19	4	169	73
	70-74 ans	202	133	69	7	3	126	66
	50-74 ans	1 091	753	338	172	81	581	257
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	206	137	69	94	48	43	21
	55-59 ans	225	156	69	40	18	116	51
	60-64 ans	294	216	78	29	14	187	64
	65-69 ans	320	225	95	21	7	204	88
	70-74 ans	241	160	81	7	3	153	78
	50-74 ans	1 286	894	392	191	90	703	302
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	36	25	11	18	8	7	3
	55-59 ans	36	24	12	8	2	16	10
	60-64 ans	64	36	28	9	3	27	25
	65-69 ans	94	62	32	9	5	53	27
	70-74 ans	71	49	22	4	3	45	19
	50-74 ans	301	196	105	48	21	148	84
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	33	23	10	17	8	6	2
	55-59 ans	33	22	11	8	2	14	9
	60-64 ans	58	33	25	8	2	25	23
	65-69 ans	85	55	30	6	5	49	25
	70-74 ans	68	46	22	4	3	42	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	277	179	98	43	20	136	78
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	33	23	10	17	8	6	2
	55-59 ans	33	22	11	8	2	14	9
	60-64 ans	58	33	25	8	2	25	23
	65-69 ans	84	55	29	6	5	49	24
	70-74 ans	68	46	22	4	3	42	19
	50-74 ans	276	179	97	43	20	136	77
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	22	15	7	12	5	3	2
	55-59 ans	25	16	9	6	1	10	8
	60-64 ans	45	25	20	6	2	19	18
	65-69 ans	63	38	25	3	4	35	21
	70-74 ans	57	36	21	4	2	32	19
	50-74 ans	212	130	82	31	14	99	68
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	11	8	3	5	3	3	0
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	13	8	5	2	0	6	5
	65-69 ans	21	17	4	3	1	14	3
	70-74 ans	11	10	1	0	1	10	0
	50-74 ans	64	49	15	12	6	37	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	8	2	7	2	1	0
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	16	11	5	3	0	8	5
	65-69 ans	26	18	8	1	2	17	6
	70-74 ans	27	19	8	2	1	17	7
	50-74 ans	96	66	30	17	6	49	24
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	12	5	7	2	2	3	5
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4
	70-74 ans	16	7	9	2	1	5	8
	50-74 ans	45	23	22	9	5	14	17
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	11	7	4	0	0	7	4
	65-69 ans	23	12	11	0	1	12	10
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	54	32	22	3	2	29	20
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	32	23	9	17	8	6	1
	55-59 ans	32	21	11	7	2	14	9
	60-64 ans	56	33	23	8	2	25	21
	65-69 ans	83	53	30	6	5	47	25
	70-74 ans	66	44	22	4	3	40	19
	50-74 ans	269	174	95	42	20	132	75
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	15	11	12	9	3	2
	55-59 ans	26	18	8	8	1	10	7
	60-64 ans	28	16	12	3	2	13	10
	65-69 ans	37	27	10	3	0	24	10
	70-74 ans	33	23	10	4	0	19	10
	50-74 ans	150	99	51	30	12	69	39

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	7,8	7,8	8,3	8,3	6,8	6,7
	55-59 ans	7,9	8,3	7,5	10,1	9,2	7,9	7,2
	60-64 ans	7,3	7,3	7,4	10,5	8,6	6,9	7,2
	65-69 ans	7,3	7,5	7,2	9,6	9,1	7,4	7,0
	70-74 ans	8,1	8,4	7,9	11,3	12,5	8,3	7,7
	50-74 ans	7,7	7,8	7,5	8,9	8,6	7,5	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	3,1	3,2	1,9	1,9
	55-59 ans	2,5	2,5	2,5	3,5	3,7	2,2	2,2
	60-64 ans	2,2	2,2	2,3	4,1	3,3	2,0	2,2
	65-69 ans	2,2	2,2	2,3	4,2	4,0	2,1	2,2
	70-74 ans	3,2	3,4	3,0	6,9	5,8	3,2	2,9
	50-74 ans	2,6	2,6	2,5	3,4	3,4	2,3	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	64,4	64,0	62,0	61,1	71,6	71,6
	55-59 ans	68,6	70,5	66,7	64,9	59,3	72,4	68,7
	60-64 ans	69,4	69,8	69,0	61,3	61,4	71,4	69,8
	65-69 ans	69,3	70,6	68,1	56,9	55,8	71,9	69,1
	70-74 ans	60,9	59,5	62,2	39,3	53,8	60,9	62,7
	50-74 ans	66,7	67,3	66,2	61,5	60,4	69,8	68,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,4	3,1	4,5	3,1	4,3	3,1
	55-59 ans	3,9	4,9	3,0	5,9	3,9	4,6	2,8
	60-64 ans	4,8	6,3	3,5	8,3	5,6	6,0	3,3
	65-69 ans	6,0	7,8	4,5	12,2	6,0	7,5	4,4
	70-74 ans	7,0	8,9	5,3	13,9	6,6	8,6	5,3
	50-74 ans	4,9	6,1	3,7	5,6	3,6	6,3	3,8
50-74 ans **	4,8	6,0	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,1	99,0	98,7	99,5	100,0	98,0
	55-59 ans	99,7	99,7	99,6	100,0	98,3	99,7	100,0
	60-64 ans	99,5	99,4	99,7	100,0	100,0	99,3	99,6
	65-69 ans	98,3	98,5	98,1	96,8	96,3	98,7	98,3
	70-74 ans	98,3	98,9	97,4	100,0	100,0	98,8	97,2
	50-74 ans	98,9	99,1	98,7	99,0	99,1	99,1	98,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,4	93,5	95,7	92,9	95,6	95,1	96,0
	55-59 ans	93,9	93,1	95,1	91,8	96,6	93,5	94,6
	60-64 ans	94,5	94,6	94,4	93,0	95,5	94,8	94,3
	65-69 ans	92,8	92,7	92,8	91,7	84,6	92,9	93,5
	70-74 ans	92,7	91,5	94,6	78,1	100,0	92,6	94,3
	50-74 ans	93,6	93,1	94,5	91,7	95,1	93,5	94,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	97,0	95,9	96,2	95,4	99,1	96,8
	55-59 ans	95,9	95,9	96,0	95,6	96,4	96,0	95,9
	60-64 ans	96,5	97,7	94,8	95,5	95,2	98,0	94,7
	65-69 ans	96,7	97,2	95,8	96,4	90,9	97,3	96,2
	70-74 ans	97,2	97,5	96,8	92,0	100,0	97,9	96,6
	50-74 ans	96,6	97,1	95,8	95,8	95,5	97,5	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	123	110	126	106	114	118
	55-59 ans	112	118	105	116	121	118	100
	60-64 ans	115	120	109	129	98	118	110
	65-69 ans	114	118	107	138	111	116	107
	70-74 ans	110	107	113	101	139	108	112
	50-74 ans	114	117	109	125	109	115	109
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90 (61-129)	95 (63-137)	88 (56-124)	96 (63-139)	88 (56-123)	92,5 (63-126)	86 (56-125)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	86 (60-123)	87 (61-123)	86 (58-126)	84,5 (56-130)	88 (60,5-138,5)	87 (62-122)	86 (58-119)
	60-64 ans	88 (60-130)	92,5 (64-133)	82 (55-125)	104 (57-138)	73,5 (57-117)	91 (64-132,5)	83 (55-126)
	65-69 ans	87 (61-119)	86 (60-120)	90 (62-118)	76 (53-139)	69 (51-124)	87 (61-120)	90 (63-118)
	70-74 ans	87 (61-124)	87 (61-120)	86 (61-131)	82 (65-111)	78 (61-122)	87 (61-121)	86,5 (62-131)
	50-74 ans	88 (61-125)	89 (62-126)	87 (60-125)	89 (61-136)	85 (56-126)	89 (62-125)	87 (60-124)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	3,5	3,6	3,8	4,3	2,5	2,0
	55-59 ans	4,0	4,6	3,0	8,2	1,7	3,4	3,4
	60-64 ans	3,4	3,2	3,7	4,2	4,5	3,0	3,6
	65-69 ans	3,9	4,6	2,7	4,8	0,0	4,6	2,9
	70-74 ans	4,4	5,2	3,3	12,5	0,0	4,6	3,4
	50-74 ans	3,8	4,2	3,2	5,2	3,4	3,9	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	97,6	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,9	33,6	46,2	34,3	44,7	31,9	49,5
	55-59 ans	30,3	23,4	40,4	22,2	42,9	23,7	39,7
	60-64 ans	27,4	20,6	37,8	22,7	38,1	20,2	37,7
	65-69 ans	25,5	21,2	32,3	19,6	27,3	21,4	32,6
	70-74 ans	27,5	20,9	37,0	20,0	23,1	21,0	37,7
	50-74 ans	29,6	23,7	38,5	28,5	41,5	22,1	37,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	5,2	6,5	4,5	5,6	6,9	8,4
	55-59 ans	3,4	2,2	5,2	3,3	0,0	1,8	6,7
	60-64 ans	4,9	3,4	7,2	1,5	2,4	3,7	7,9
	65-69 ans	3,8	2,8	5,3	3,6	0,0	2,7	5,6
	70-74 ans	3,7	4,0	3,2	4,0	15,4	4,0	2,6
	50-74 ans	4,3	3,5	5,5	3,8	4,2	3,4	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,7	0,7	2,4	0,5	0,0	1,1
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	0,0	1,8	1,1	0,5
	60-64 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 68 - Haut-Rhin

12/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	4,5	0,2	0,0
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,3	1,3	0,9	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	14,7	13,7	15,4	14,2	12,9	12,6
	55-59 ans	17,3	18,4	15,6	15,6	14,3	19,3	16,0
	60-64 ans	16,6	17,8	14,7	12,1	9,5	18,8	15,5
	65-69 ans	17,8	17,1	18,8	14,3	18,2	17,5	18,8
	70-74 ans	17,4	17,7	17,1	20,0	7,7	17,5	17,5
	50-74 ans	16,7	17,1	16,0	15,1	13,6	17,8	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,3	35,1	26,0	33,9	28,9	37,9	20,0
	55-59 ans	38,4	45,3	28,4	45,6	30,4	45,3	27,8
	60-64 ans	40,0	47,6	28,3	45,5	38,1	47,9	26,8
	65-69 ans	38,4	43,2	30,8	39,3	27,3	43,7	31,0
	70-74 ans	38,7	43,5	31,7	40,0	23,1	43,8	32,1
	50-74 ans	37,4	43,1	29,1	38,2	30,0	44,6	28,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	6,2	3,8	6,3	4,1	6,0	3,2
	55-59 ans	5,9	6,6	4,8	8,9	3,6	5,8	5,2
	60-64 ans	8,2	7,6	9,1	13,6	7,1	6,7	9,4
	65-69 ans	10,7	11,5	9,4	16,1	22,7	11,0	8,5
	70-74 ans	10,4	12,2	7,8	16,0	23,1	11,9	7,1
	50-74 ans	8,3	9,0	7,1	9,2	6,4	9,0	7,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,7	1,0	1,4	1,0	2,6	1,1
	55-59 ans	2,6	2,2	3,2	3,3	3,6	1,8	3,1
	60-64 ans	1,5	1,7	1,3	3,0	0,0	1,5	1,5
	65-69 ans	2,3	2,2	2,3	3,6	0,0	2,1	2,5
	70-74 ans	1,3	1,0	1,8	0,0	7,7	1,1	1,5
	50-74 ans	1,8	1,8	1,9	2,1	1,5	1,7	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	1,7	2,1	1,7	1,0	1,7	4,2
	55-59 ans	1,3	1,1	1,6	1,1	3,6	1,1	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	0,8	1,3	1,5	2,4	0,7	1,1
	65-69 ans	1,1	1,3	0,9	3,6	0,0	1,0	0,9
	70-74 ans	0,7	0,2	1,4	0,0	0,0	0,3	1,5
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	1,7	1,5	0,8	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	2,4	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,0	20,5	11,7	20,3	12,7	20,8	9,6
	55-59 ans	20,2	28,8	12,4	33,0	16,4	27,7	11,6
	60-64 ans	25,3	38,6	14,1	44,7	25,4	37,9	13,0
	65-69 ans	31,1	43,1	20,3	59,2	22,1	41,9	20,2
	70-74 ans	36,0	49,5	24,1	65,2	20,4	48,8	24,3
	50-74 ans	24,5	34,2	15,7	27,4	14,9	36,7	16,0
	50-74 ans **	24,3	33,7	15,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,0	14,4	7,6	14,0	8,5	15,5	5,9
	55-59 ans	14,0	20,5	8,0	24,6	11,2	19,4	7,4
	60-64 ans	17,9	28,1	9,3	35,3	20,3	27,2	8,3
	65-69 ans	21,3	30,9	12,6	43,4	13,2	29,9	12,6
	70-74 ans	24,8	35,2	15,7	43,5	15,3	34,8	15,7
	50-74 ans	17,0	24,5	10,1	19,6	10,2	26,2	10,1
	50-74 ans **	16,8	24,1	10,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	12,6	6,3	12,4	6,7	13,0	5,6
	55-59 ans	11,4	16,5	6,8	21,6	11,2	15,2	5,9
	60-64 ans	14,1	22,1	7,4	28,2	15,2	21,3	6,6
	65-69 ans	16,7	25,0	9,3	37,5	8,8	24,1	9,3
	70-74 ans	19,0	26,8	12,2	30,4	15,3	26,6	12,0
	50-74 ans	13,6	19,7	8,0	16,9	8,4	20,7	7,9
	50-74 ans **	13,4	19,4	8,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,0	6,9	13,6	7,1	15,1	6,5
	55-59 ans	13,3	19,4	7,8	24,0	11,8	18,2	7,0
	60-64 ans	16,9	27,1	8,3	34,1	17,8	26,2	7,4
	65-69 ans	20,2	29,9	11,4	41,4	15,5	29,1	11,2
	70-74 ans	22,7	32,2	14,3	30,4	15,3	32,3	14,2
	50-74 ans	16,0	23,3	9,3	18,7	9,3	25,0	9,3
	50-74 ans **	15,8	23,0	9,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,1	2,6	1,2	2,5	0,9
	55-59 ans	2,1	3,0	1,4	4,8	1,3	2,5	1,4
	60-64 ans	3,7	4,5	3,0	10,6	3,8	3,8	2,9
	65-69 ans	5,9	8,2	3,9	17,8	11,0	7,6	3,4
	70-74 ans	6,7	9,9	3,9	17,4	15,3	9,5	3,5
	50-74 ans	3,7	5,1	2,5	4,7	2,2	5,3	2,6
	50-74 ans **	3,6	4,9	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	4,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)