

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 79 - Deux-Sèvres

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 147	3 817	4 330	2 557	2 858	1 260	1 472
	55-59 ans	7 091	3 255	3 836	569	658	2 686	3 178
	60-64 ans	7 415	3 369	4 046	553	500	2 816	3 546
	65-69 ans	7 543	3 448	4 095	423	374	3 025	3 721
	70-74 ans	5 125	2 384	2 741	223	221	2 161	2 520
	50-74 ans	35 321	16 273	19 048	4 325	4 611	11 948	14 437
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	571	279	292	206	220	73	72
	55-59 ans	538	248	290	58	70	190	220
	60-64 ans	525	239	286	55	50	184	236
	65-69 ans	508	235	273	37	35	198	238
	70-74 ans	417	188	229	28	31	160	198
	50-74 ans	2 559	1 189	1 370	384	406	805	964
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	439	222	217	156	157	66	60
	55-59 ans	447	209	238	37	44	172	194
	60-64 ans	453	203	250	40	42	163	208
	65-69 ans	436	206	230	26	26	180	204
	70-74 ans	327	147	180	20	20	127	160
	50-74 ans	2 102	987	1 115	279	289	708	826
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	132	57	75	50	63	7	12
	55-59 ans	91	39	52	21	26	18	26
	60-64 ans	72	36	36	15	8	21	28
	65-69 ans	72	29	43	11	9	18	34
	70-74 ans	90	41	49	8	11	33	38
	50-74 ans	457	202	255	105	117	97	138
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 015	3 760	4 255	2 507	2 795	1 253	1 460
	55-59 ans	7 000	3 216	3 784	548	632	2 668	3 152
	60-64 ans	7 343	3 333	4 010	538	492	2 795	3 518
	65-69 ans	7 471	3 419	4 052	412	365	3 007	3 687
	70-74 ans	5 035	2 343	2 692	215	210	2 128	2 482
	50-74 ans	34 864	16 071	18 793	4 220	4 494	11 851	14 299
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	296	177	119	130	78	47	41
	55-59 ans	272	148	124	30	28	118	96
	60-64 ans	319	199	120	50	18	149	102
	65-69 ans	335	181	154	34	31	147	123

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 79 - Deux-Sèvres

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	266	169	97	21	7	148	90
	50-74 ans	1 488	874	614	265	162	609	452
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	291	175	116	129	77	46	39
	55-59 ans	272	148	124	30	28	118	96
	60-64 ans	315	196	119	49	18	147	101
	65-69 ans	328	177	151	33	31	144	120
	70-74 ans	253	159	94	19	6	140	88
	50-74 ans	1 459	855	604	260	160	595	444
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	276	168	108	123	71	45	37
	55-59 ans	251	137	114	26	24	111	90
	60-64 ans	301	186	115	49	17	137	98
	65-69 ans	308	168	140	31	28	137	112
	70-74 ans	241	153	88	18	6	135	82
	50-74 ans	1 377	812	565	247	146	565	419
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	261	159	102	116	67	43	35
	55-59 ans	238	132	106	25	20	107	86
	60-64 ans	284	174	110	43	16	131	94
	65-69 ans	283	153	130	29	25	124	105
	70-74 ans	219	140	79	18	6	122	73
	50-74 ans	1 285	758	527	231	134	527	393
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 79 - Deux-Sèvres

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	275	168	107	123	70	45	37
	55-59 ans	250	136	114	26	24	110	90
	60-64 ans	299	186	113	49	17	137	96
	65-69 ans	307	167	140	31	28	136	112
	70-74 ans	238	152	86	18	6	134	80
	50-74 ans	1 369	809	560	247	145	562	415
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	275	168	107	123	71	45	36
	55-59 ans	251	137	114	26	24	111	90
	60-64 ans	298	186	112	49	17	137	95
	65-69 ans	306	167	139	30	28	137	111
	70-74 ans	239	152	87	18	6	134	81
	50-74 ans	1 369	810	559	246	146	564	413
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	277	169	108	124	71	45	37
	55-59 ans	253	138	115	26	24	112	91
	60-64 ans	301	186	115	49	17	137	98
	65-69 ans	310	169	141	31	28	138	113
	70-74 ans	243	155	88	19	6	136	82
	50-74 ans	1 384	817	567	249	146	568	421
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	86	40	46	29	31	11	15
	55-59 ans	72	37	35	6	7	31	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	71	29	42	5	5	24	37
	65-69 ans	74	25	49	4	8	21	41
	70-74 ans	57	27	30	1	0	26	30
	50-74 ans	360	158	202	45	51	113	151
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	5	6	5	4	0	2
	55-59 ans	11	6	5	0	1	6	4
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	50-74 ans	58	28	30	9	8	19	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	51	35	16	22	10	13	6
	55-59 ans	55	31	24	7	3	24	21
	60-64 ans	65	42	23	9	6	33	17
	65-69 ans	59	42	17	11	5	31	12
	70-74 ans	43	27	16	2	2	25	14
	50-74 ans	273	177	96	51	26	126	70
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	101	74	27	57	17	17	10
	55-59 ans	85	49	36	10	9	39	27
	60-64 ans	119	88	31	25	4	63	27
	65-69 ans	127	74	53	12	12	62	41
	70-74 ans	99	73	26	10	3	63	23
	50-74 ans	531	358	173	114	45	244	128
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	5	5	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	7	8	2	2	5	6
	60-64 ans	20	13	7	5	0	8	7
	65-69 ans	17	9	8	0	1	9	7
	70-74 ans	22	19	3	4	0	15	3
	50-74 ans	85	54	31	16	8	38	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	4	2	8	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	3	7	1	1	2	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	152	109	43	79	27	30	16
	55-59 ans	140	80	60	17	12	63	48
	60-64 ans	184	130	54	34	10	96	44
	65-69 ans	186	116	70	23	17	93	53
	70-74 ans	142	100	42	12	5	88	37
	50-74 ans	804	535	269	165	71	370	198

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 79 - Deux-Sèvres

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	101	74	27	57	17	17	10
	55-59 ans	85	49	36	10	9	39	27
	60-64 ans	119	88	31	25	4	63	27
	65-69 ans	127	74	53	12	12	62	41
	70-74 ans	99	73	26	10	3	63	23
	50-74 ans	531	358	173	114	45	244	128
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	95	71	24	54	14	17	10
	55-59 ans	81	47	34	10	8	37	26
	60-64 ans	113	84	29	23	4	61	25
	65-69 ans	121	71	50	11	11	60	39
	70-74 ans	90	67	23	10	3	57	20
	50-74 ans	500	340	160	108	40	232	120
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	103	76	27	58	16	18	11
	55-59 ans	92	51	41	10	9	41	32
	60-64 ans	128	97	31	26	4	71	27
	65-69 ans	134	80	54	14	11	66	43
	70-74 ans	103	76	27	10	3	66	24
	50-74 ans	560	380	180	118	43	262	137
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	5	6	1	0
	55-59 ans	15	7	8	2	2	5	6
	60-64 ans	20	13	7	5	0	8	7
	65-69 ans	17	9	8	0	1	9	7
	70-74 ans	22	19	3	4	0	15	3
	50-74 ans	86	54	32	16	9	38	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	2	5	4
	60-64 ans	16	11	5	4	0	7	5
	65-69 ans	15	7	8	0	1	7	7
	70-74 ans	19	16	3	3	0	13	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 79 - Deux-Sèvres

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	73	46	27	13	8	33	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	8	2	6	0	1	2	5
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	37	19	18	5	5	14	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	2	4	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	10	9	1	2	0	7	1
	50-74 ans	36	27	9	8	3	19	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	7	7	0	2	0	5	0
	50-74 ans	21	18	3	5	2	13	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	15	9	6	3	1	6	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	9	8	1	3	0	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	12	7	5	2	2	5	3
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	15	7	8	0	1	7	7
	70-74 ans	17	15	2	3	0	12	2
	50-74 ans	66	42	24	12	7	30	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	7	8	6	6	1	2
	55-59 ans	17	9	8	4	4	5	4
	60-64 ans	9	7	2	0	0	7	2
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	63	35	28	13	11	22	17

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,3	6,7	8,1	7,7	5,8	4,9
	55-59 ans	7,6	7,6	7,6	10,2	10,6	7,1	6,9
	60-64 ans	7,1	7,1	7,1	9,9	10,0	6,5	6,7
	65-69 ans	6,7	6,8	6,7	8,7	9,4	6,5	6,4
	70-74 ans	8,1	7,9	8,4	12,6	14,0	7,4	7,9
	50-74 ans	7,2	7,3	7,2	8,9	8,8	6,7	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,5	1,7	2,0	2,2	0,6	0,8
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	3,7	4,0	0,7	0,8
	60-64 ans	1,0	1,1	0,9	2,7	1,6	0,7	0,8
	65-69 ans	1,0	0,8	1,1	2,6	2,4	0,6	0,9
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	3,6	5,0	1,5	1,5
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	2,4	2,5	0,8	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,9	79,6	74,3	75,7	71,4	90,4	83,3
	55-59 ans	83,1	84,3	82,1	63,8	62,9	90,5	88,2
	60-64 ans	86,3	84,9	87,4	72,7	84,0	88,6	88,1
	65-69 ans	85,8	87,7	84,2	70,3	74,3	90,9	85,7
	70-74 ans	78,4	78,2	78,6	71,4	64,5	79,4	80,8
	50-74 ans	82,1	83,0	81,4	72,7	71,2	88,0	85,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,7	2,8	5,2	2,8	3,8	2,8
	55-59 ans	3,9	4,6	3,3	5,5	4,4	4,4	3,0
	60-64 ans	4,3	6,0	3,0	9,3	3,7	5,3	2,9
	65-69 ans	4,5	5,3	3,8	8,3	8,5	4,9	3,3
	70-74 ans	5,3	7,2	3,6	9,8	3,3	7,0	3,6
	50-74 ans	4,3	5,4	3,3	6,3	3,6	5,1	3,2
50-74 ans **	4,3	5,4	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,9	97,5	99,2	98,7	97,9	95,1
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,7	98,5	99,2	98,0	100,0	98,7	99,0
	65-69 ans	97,9	97,8	98,1	97,1	100,0	98,0	97,6
	70-74 ans	95,1	94,1	96,9	90,5	85,7	94,6	97,8
	50-74 ans	98,1	97,8	98,4	98,1	98,8	97,7	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	96,0	93,1	95,3	92,2	97,8	94,9
	55-59 ans	92,3	92,6	91,9	86,7	85,7	94,1	93,8
	60-64 ans	95,6	94,9	96,6	100,0	94,4	93,2	97,0
	65-69 ans	93,9	94,9	92,7	93,9	90,3	95,1	93,3
	70-74 ans	95,3	96,2	93,6	94,7	100,0	96,4	93,2
	50-74 ans	94,4	95,0	93,5	95,0	91,3	95,0	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,6	94,6	94,4	94,3	94,4	95,6	94,6
	55-59 ans	94,8	96,4	93,0	96,2	83,3	96,4	95,6
	60-64 ans	94,4	93,5	95,7	87,8	94,1	95,6	95,9
	65-69 ans	91,9	91,1	92,9	93,5	89,3	90,5	93,8
	70-74 ans	90,9	91,5	89,8	100,0	100,0	90,4	89,0
	50-74 ans	93,3	93,3	93,3	93,5	91,8	93,3	93,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	4	3	3	3	4
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	119	122	115	119	122	128	101
	55-59 ans	111	123	97	151	91	116	99
	60-64 ans	115	112	119	132	111	105	121
	65-69 ans	109	107	110	96	141	110	102
	70-74 ans	104	104	106	118	124	102	104
	50-74 ans	112	113	110	122	119	109	106
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97 (66-139)	97 (67-138)	90 (62-139)	97 (62-134)	90 (63-146)	98 (81-156)	90 (56-130)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	89 (68-135)	98,5 (68,5-150)	84 (64-119)	128 (86-186)	77 (60-121)	95 (65-142)	88 (65-118)
	60-64 ans	92,5 (68-130,5)	89 (66-130)	103 (70-131)	83 (74-160)	90 (68-104)	89 (64,5-124,5)	104 (70-131)
	65-69 ans	88 (70-121)	89,5 (70-123)	86 (69-120)	82 (65-107)	96 (69-148)	90 (71-124)	83 (69-117,5)
	70-74 ans	87 (63-124)	85 (57-122)	89 (68,5-130,5)	91,5 (66-159)	133 (75-158)	84 (57-122)	88,5 (68-128)
	50-74 ans	90 (67-131)	90 (67-132)	89 (68-127)	94 (67-136)	90 (63-140)	90 (67-130)	88,5 (68-126)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	4,0	6,7	4,6	7,7	2,1	4,9
	55-59 ans	6,3	6,1	6,5	13,3	14,3	4,2	4,2
	60-64 ans	2,8	3,5	1,7	0,0	0,0	4,7	2,0
	65-69 ans	3,3	3,3	3,2	5,9	3,2	2,7	3,3
	70-74 ans	4,1	3,6	5,2	4,8	0,0	3,4	5,6
	50-74 ans	4,2	4,0	4,6	4,9	6,8	3,6	3,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	97,3
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0	96,9
	65-69 ans	99,4	99,4	99,3	96,8	100,0	100,0	99,1
	70-74 ans	99,2	99,3	98,9	100,0	100,0	99,3	98,8
	50-74 ans	99,4	99,8	98,9	99,6	100,0	99,8	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31,0	23,7	42,6	23,4	43,7	24,4	40,5
	55-59 ans	28,5	26,8	30,4	23,1	29,2	27,7	30,8
	60-64 ans	23,6	15,6	36,5	10,2	29,4	17,5	37,8
	65-69 ans	23,9	14,8	34,8	12,9	28,6	15,2	36,3
	70-74 ans	23,5	17,4	34,1	5,3	0,0	19,1	36,6
	50-74 ans	26,0	19,3	35,6	18,1	34,9	19,9	35,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,0	3,0	5,6	4,0	5,6	0,0	5,4
	55-59 ans	4,3	4,3	4,3	0,0	4,2	5,4	4,4
	60-64 ans	4,3	3,2	6,1	4,1	11,8	2,9	5,1
	65-69 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	3,6	4,3	4,4
	70-74 ans	4,1	2,6	6,8	5,3	0,0	2,2	7,3
	50-74 ans	4,2	3,4	5,3	3,6	5,5	3,3	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	2,4	0,9	2,4	1,4	2,2	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	1,2	0,7	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,4	20,7	14,8	17,7	14,1	28,9	16,2
	55-59 ans	21,7	22,5	20,9	26,9	12,5	21,4	23,1
	60-64 ans	21,6	22,6	20,0	18,4	35,3	24,1	17,3
	65-69 ans	19,0	24,9	12,1	35,5	17,9	22,5	10,6
	70-74 ans	17,7	17,4	18,2	10,5	33,3	18,4	17,1
	50-74 ans	19,7	21,7	16,9	20,5	17,8	22,2	16,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36,5	43,8	25,0	46,0	23,9	37,8	27,0
	55-59 ans	33,6	35,5	31,3	38,5	37,5	34,8	29,7
	60-64 ans	39,5	47,3	27,0	51,0	23,5	46,0	27,6
	65-69 ans	41,0	43,8	37,6	38,7	42,9	44,9	36,3
	70-74 ans	40,7	47,1	29,5	52,6	50,0	46,3	28,0
	50-74 ans	38,4	43,8	30,5	45,8	30,8	43,0	30,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,0	3,6	4,6	4,0	7,0	2,2	0,0
	55-59 ans	5,9	5,1	7,0	7,7	8,3	4,5	6,6
	60-64 ans	6,6	7,0	6,1	10,2	0,0	5,8	7,1
	65-69 ans	5,5	5,3	5,7	0,0	3,6	6,5	6,2
	70-74 ans	9,1	12,3	3,4	21,1	0,0	11,0	3,7
	50-74 ans	6,1	6,6	5,5	6,4	5,5	6,7	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0,6	2,8	0,8	2,8	0,0	2,7
	55-59 ans	2,0	2,2	1,7	0,0	0,0	2,7	2,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	1,6	0,0	4,1	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	1,3	1,8	0,7	0,0	0,0	2,2	0,9
	70-74 ans	1,2	1,3	1,1	5,3	0,0	0,7	1,2
	50-74 ans	1,4	1,5	1,2	1,6	1,4	1,4	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,7
	55-59 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	60-64 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,0
	65-69 ans	1,6	1,2	2,1	3,2	3,6	0,7	1,8
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,7	0,4	1,2	0,4	0,7	0,4	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	19,0	29,0	10,1	31,5	9,7	23,9	11,0
	55-59 ans	20,0	24,9	15,9	31,0	19,0	23,6	15,2
	60-64 ans	25,1	39,0	13,5	63,2	20,3	34,3	12,5
	65-69 ans	24,9	33,9	17,3	55,8	46,6	30,9	14,4
	70-74 ans	28,2	42,7	15,6	55,8	23,8	41,4	14,9
	50-74 ans	23,1	33,3	14,3	39,1	15,8	31,2	13,8
	50-74 ans **	23,0	32,7	14,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	19,7	6,3	22,7	6,1	13,6	6,8
	55-59 ans	12,1	15,2	9,5	18,2	14,2	14,6	8,6
	60-64 ans	16,2	26,4	7,7	46,5	8,1	22,5	7,7
	65-69 ans	17,0	21,6	13,1	29,1	32,9	20,6	11,1
	70-74 ans	19,7	31,2	9,7	46,5	14,3	29,6	9,3
	50-74 ans	15,2	22,3	9,2	27,0	10,0	20,6	9,0
	50-74 ans **	15,1	21,9	8,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	18,9	5,6	21,5	5,0	13,6	6,8
	55-59 ans	11,6	14,6	9,0	18,2	12,7	13,9	8,2
	60-64 ans	15,4	25,2	7,2	42,8	8,1	21,8	7,1
	65-69 ans	16,2	20,8	12,3	26,7	30,1	20,0	10,6
	70-74 ans	17,9	28,6	8,5	46,5	14,3	26,8	8,1
	50-74 ans	14,3	21,2	8,5	25,6	8,9	19,6	8,4
	50-74 ans **	14,2	20,8	8,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	20,2	6,3	23,1	5,7	14,4	7,5
	55-59 ans	13,1	15,9	10,8	18,2	14,2	15,4	10,2
	60-64 ans	17,4	29,1	7,7	48,3	8,1	25,4	7,7
	65-69 ans	17,9	23,4	13,3	34,0	30,1	21,9	11,7
	70-74 ans	20,5	32,4	10,0	46,5	14,3	31,0	9,7
	50-74 ans	16,1	23,6	9,6	28,0	9,6	22,1	9,6
	50-74 ans **	16,0	23,2	9,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,0	2,1	0,8	0,0
	55-59 ans	2,1	2,2	2,1	3,6	3,2	1,9	1,9
	60-64 ans	2,7	3,9	1,7	9,3	0,0	2,9	2,0
	65-69 ans	2,3	2,6	2,0	0,0	2,7	3,0	1,9
	70-74 ans	4,4	8,1	1,1	18,6	0,0	7,0	1,2
	50-74 ans	2,5	3,4	1,7	3,8	2,0	3,2	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,3	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	70,0	60,0	80,0	50,0	80,0	100,0	0,0
	55-59 ans	38,5	14,3	66,7	0,0	0,0	20,0	100,0
	60-64 ans	50,0	54,5	40,0	50,0	0,0	57,1	40,0
	65-69 ans	53,3	28,6	75,0	0,0	100,0	28,6	71,4
	70-74 ans	47,4	43,8	66,7	33,3	0,0	46,2	66,7
	50-74 ans	50,7	41,3	66,7	38,5	62,5	42,4	68,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)