Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage		Dépistages Su	•
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 748	3 665	4 083	2 569	2 698	1 096	1 385
(quei qu'eil soit le l'esuitat)	55-59 ans	6 450	2 976	3 474	794	822	2 182	2 652
	60-64 ans	7 236	3 290	3 946	809	769	2 481	3 177
	65-69 ans	7 787	3 509	4 278	631	614	2 878	3 664
	70-74 ans	5 281	2 400	2 881	348	313	2 052	2 568
	50-74 ans	34 502	15 840	18 662	5 151	5 216	10 689	13 446
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non	30-74 alls	34 302	15 640	10 002	3 131	3210	10 009	13 440
analysable (NA)	50-54 ans	530	254	276	195	190	59	86
	55-59 ans	452	223	229	70	60	153	169
	60-64 ans	470	207	263	53	63	154	200
	65-69 ans	529	232	297	42	51	190	246
	70-74 ans	425	198	227	40	32	158	195
	50-74 ans	2 406	1 114	1 292	400	396	714	896
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à								
un test NA	50-54 ans	397	192	205	147	135	45	70
	55-59 ans	357	174	183	55	42	119	141
	60-64 ans	368	167	201	38	42	129	159
	65-69 ans	429	186	243	30	39	156	204
	70-74 ans	327	147	180	31	24	116	156
	50-74 ans	1 878	866	1 012	301	282	565	730
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	133	62	71	48	55	14	16
	55-59 ans	95	49	46	15	18	34	28
	60-64 ans	102	40	62	15	21	25	41
	65-69 ans	100	46	54	12	12	34	42
	70-74 ans	98	51	47	9	8	42	39
	50-74 ans	528	248	280	99	114	149	166
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 615	3 603	4 012	2 521	2 643	1 082	1 369
7100 Montale de personnes depisitees (avec un test unalysable)	55-59 ans	6 355	2 927	3 428	779	804	2 148	2 624
	60-64 ans	7 134	3 250	3 884	794	748	2 456	3 136
	65-69 ans	7 687	3 463	4 224	619	602	2 844	3 622
	70-74 ans	5 183	2 349	2 834	339	305	2 010	2 529
	50-74 ans	33 974	15 592	18 382	5 052	5 102	10 540	13 280
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	271	162	109	113	72	49	37
and the second s	55-59 ans	258	150	108	52	27	98	81
	60-64 ans	330	204	126	67	24	137	102
	65-69 ans	350	196	154	49	33	147	121
	50 00 and	300	100	.04	-10	00		121

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	328	192	136	42	15	150	121
	50-74 ans	1 537	904	633	323	171	581	462
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	271	162	109	113	72	49	37
	55-59 ans	257	150	107	52	26	98	81
	60-64 ans	327	201	126	66	24	135	102
	65-69 ans	347	194	153	49	33	145	120
	70-74 ans	324	190	134	40	14	150	120
	50-74 ans	1 526	897	629	320	169	577	460
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	149	100	103	65	46	35
	55-59 ans	228	133	95	47	22	86	73
	60-64 ans	308	191	117	63	21	128	96
	65-69 ans	321	176	145	43	33	133	112
	70-74 ans	293	171	122	34	13	137	109
	50-74 ans	1 399	820	579	290	154	530	425
A00 N	50.54	0.40	4.40	07	404	00	45	0.4
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	243	146	97	101	63	45	34
	55-59 ans	221	127	94	42	21	85	73
	60-64 ans	303	186	117	61	21	125	96
	65-69 ans	313	171	142	41	32	130	110
	70-74 ans	284	164	120	32	12	132	108
	50-74 ans	1 364	794	570	277	149	517	421
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	243	144	99	99	64	45	35
	55-59 ans	222	131	91	45	21	86	70
	60-64 ans	295	182	113	60	20	122	93
	65-69 ans	312	172	140	42	32	130	108
	70-74 ans	284	165	119	33	13	132	106
	50-74 ans	1 356	794	562	279	150	515	412
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une	50.54	•	_				_	•
autre exploration colique	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	43	26	17	11	4	15	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique	50-54 ans	2	4	1	0	1	4	0
autre que la coloscopie (sans coloscopie)			1	· ·		•	1	
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	8	3	5	1	2	2	3
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	43	25	18	6	5	19	13
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	246	146	100	101	65	45	35
·	55-59 ans	226	132	94	46	21	86	73
	60-64 ans	307	190	117	62	21	128	96
	65-69 ans	317	175	142	43	31	132	111
	70-74 ans	290	168	122	33	13	135	109
	50-74 ans	1 386	811	575	285	151	526	424
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre)	50-54 ans	251	150	101	103	66	47	35
	55-59 ans	239	140	99	48	24	92	75
	60-64 ans	316	194	122	64	23	130	99
	65-69 ans	330	183	147	45	33	138	114
	70-74 ans	306	178	128	36	13	142	115
	50-74 ans	1 442	845	597	296	159	549	438
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	105	56	49	36	29	20	20
	55-59 ans	89	47	42	13	12	34	30

Effectifs sur la période 2016-2017	Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	106	48	58	14	13	34	45
	65-69 ans	90	32	58	8	13	24	45
	70-74 ans	92	45	47	3	6	42	41
	50-74 ans	482	228	254	74	73	154	181
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de	50.54	4.4	_	0	-	^	0	0
moins de 10 mm	50-54 ans	11	5	6	5	6	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	13	10	3	4	0	6	3
	65-69 ans	9	1	8	0	1	1	7
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
400 N	50-74 ans	45	25	20	14	8	11	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	. 1	1	1	2	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	7	4	3	1	4	3
	30-74 alls	- ''	,	7	J	•	-	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	21	8	11	6	10	2
	55-59 ans	40	21	19	7	3	14	16
	60-64 ans	52	36	16	14	1	22	15
	65-69 ans	64	36	28	7	6	29	22
	70-74 ans	56	33	23	8	1	25	22
	50-74 ans	241	147	94	47	17	100	77
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	63	35	28	26	19	9	9
	55-59 ans	73	53	20	19	8	34	12
	60-64 ans	104	71	33	25	6	46	27
	65-69 ans	101	67	34	19	7	48	27
	70-74 ans	107	68	39	14	4	54	35
	50-74 ans	448	294	154	103	44	191	110
A22. Nambro de navannos avent réalisé un avent - (l								
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	26	20	6	15	5	5	1
ou autie, ayant detecte au moins un cancer colorectai	30-34 alls	20	20	0	13	5	5	

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	8	7	4	0	4	7
	60-64 ans	26	18	8	5	2	13	6
	65-69 ans	43	31	12	10	5	21	7
	70-74 ans	32	19	13	5	1	14	12
	50-74 ans	142	96	46	39	13	57	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	17	13	4	4	1	9	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	6	1	4	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	30	24	6	5	1	19	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	50-74 ans	15	9	6	5	1	4	5
A0= A1	50.54			•		0-	4.0	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	92	56	36	37	25	19	11
	55-59 ans	113	74	39	26	11	48	28
	60-64 ans	156	107	49	39	7	68	42
	65-69 ans	165	103	62	26	13	77	49
	70-74 ans	163	101	62	22	5	79	57
	50-74 ans	689	441	248	150	61	291	187

Effectifs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial [§]	bséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou								
présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	63	35	28	26	19	9	9
	55-59 ans	73	53	20	19	8	34	12
	60-64 ans	104	71	33	25	6	46	27
	65-69 ans	101	67	34	19	7	48	27
	70-74 ans	107	68	39	14	4	54	35
	50-74 ans	448	294	154	103	44	191	110
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	46	29	17	21	11	8	6
	55-59 ans	57	43	14	14	6	29	8
	60-64 ans	81	55	26	17	4	38	22
	65-69 ans	83	54	29	14	5	40	24
	70-74 ans	73	45	28	11	4	34	24
	50-74 ans	340	226	114	77	30	149	84
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	52	31	21	23	14	8	7
	55-59 ans	64	49	15	19	6	30	9
	60-64 ans	93	63	30	21	5	42	25
	65-69 ans	102	65	37	18	7	47	30
	70-74 ans	96	64	32	15	4	49	28
	50-74 ans	407	272	135	96	36	176	99
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	26	20	6	15	5	5	1
	55-59 ans	15	8	7	4	0	4	7
	60-64 ans	26	18	8	5	2	13	6
	65-69 ans	43	31	12	10	5	21	7
	70-74 ans	32	19	13	5	1	14	12
	50-74 ans	142	96	46	39	13	57	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des								
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	20	6	15	5	5	1
	55-59 ans	15	8	7	4	0	4	7
	60-64 ans	26	18	8	5	2	13	6
	65-69 ans	43	31	12	10	5	21	7
	70-74 ans	32	19	13	5	1	14	12

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	142	96	46	39	13	57	33
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade					_			_
inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	16	12	4	5	1	7	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu	50-54 ans	24	40	0	10	F	F	4
(stade inconnu exclus)			18	6	13	5	5	1
	55-59 ans	15	8	7	4	0	4	7
	60-64 ans	23	16	7	4	2	12	5
	65-69 ans	37	27	10	9	4	18	6
	70-74 ans	27	15	12	4	1	11	11
ACC. Nambra da nargannas avent un concer invesió de etada TNM	50-74 ans	126	84	42	34	12	50	30
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	14	10	4	7	3	3	1
Commu	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	16	10	6	2	2	8	4
	65-69 ans	18	13	5	4	3	9	2
	70-74 ans	20	11	9	4	1	7	8
	50-74 ans	76	49	2 7	19	9	30	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	8	2	6	2	2	0
A34- Nombre de personnes presentant dir carcinome in situ	55-59 ans	7	3	4	2	0	1	4
	60-64 ans	7	6	1	2	0	1	4
	65-69 ans	19	14	5	5	1	9	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	, 50	35	15	15	3	20	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	30-74 alls	30	33	13	15	3	20	12
1	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	38	25	13	7	3	18	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
2	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Effectifs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	50-74 ans	17	12	5	7	2	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	9	5	4	1	5	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50.54	•	•	•		•	•	•
4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	3	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	26	20	6	15	5	5	1
700 Nombre de personnes ayant un cancer dent le pri est comma	55-59 ans	15	8	7	10	0	4	7
	60-64 ans	25	17	8	5	2	12	6
	65-69 ans	42	30	12	9	5	21	7
	70-74 ans	31	18	13	5	1	13	12
	50-74 ans	139	93	46	38	13	55	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1
A40- 1 claus de vae	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	10	6	3	3	1	J 4	2
	65-69 ans	10	8	4	2	1	4	3 2
	70-74 ans		_	2	ა	1	3	_
		8	5	3	2	1	3	2
	50-74 ans	55	37	18	18	8	19	10

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable	50.54	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	5 4	0.0
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,9	6,8	7,6	7,0	5,4	6,2
	55-59 ans	7,0	7,5	6,6	8,8	7,3	7,0	6,4
	60-64 ans	6,5	6,3	6,7	6,6	8,2	6,2	6,3
	65-69 ans	6,8	6,6	6,9	6,7	8,3	6,6	6,7
	70-74 ans	8,0	8,3	7,9	11,5	10,2	7,7	7,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi	50-74 ans	7,0	7,0	6,9	7,8	7,6	6,7	6,7
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0	1,3	1,2
a un toot analycable our la portode ovalace) (70)	55-59 ans	1,5	1,6	1,3	1,9	2,2	1,6	1,1
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	1,9	2,7	1,0	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	1,9	2,0	1,2	1,1
	70-74 ans	1,9	2,1	1,6	2,6	2,6	2,0	1,5
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	1,9	2,2	1,4	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un		-,-	.,0	.,•	-,-	_,_	.,.	- ,_
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,9	75,6	74,3	75,4	71,1	76,3	81,4
	55-59 ans	79,0	78,0	79,9	78,6	70,0	77,8	83,4
	60-64 ans	78,3	80,7	76,4	71,7	66,7	83,8	79,5
	65-69 ans	81,1	80,2	81,8	71,4	76,5	82,1	82,9
	70-74 ans	76,9	74,2	79,3	77,5	75,0	73,4	80,0
	50-74 ans	78,1	77,7	78,3	75,3	71,2	79,1	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes								
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,5	2,7	4,5	2,7	4,5	2,7
	55-59 ans	4,1	5,1	3,2	6,7	3,4	4,6	3,1
	60-64 ans	4,6	6,3	3,2	8,4	3,2	5,6	3,3
	65-69 ans	4,6	5,7	3,6	7,9	5,5	5,2	3,3
	70-74 ans	6,3	8,2	4,8	12,4	4,9	7,5	4,8
	50-74 ans	4,5	5,8	3,4	6,4	3,4	5,5	3,5
P05 P	50-74 ans **	4,5	5,7	3,4	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cligibles a la coloscopie	55-59 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	96,3	100,0	100,0
	60-64 ans	99,1	98,5	100,0	98,5	100,0	98,5	100,0
	65-69 ans	99,1	99,0	99,4	100,0	100,0	98,6	99,2
	70-74 ans	98,8	99,0	98,5	95,2	93,3	100,0	99,2
	50-74 ans	99,3	99,0 99,2	99,4	99,1	98,8	99,3	99,6
	30-74 ans	99,3	99,2	99,4	99,1	98,8	99,3	99,6

Indicateurs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après								
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,9	92,0	91,7	91,2	90,3	93,9	94,6
	55-59 ans	88,7	88,7	88,8	90,4	84,6	87,8	90,1
	60-64 ans	94,2	95,0	92,9	95,5	87,5	94,8	94,1
	65-69 ans	92,5	90,7	94,8	87,8	100,0	91,7	93,3
	70-74 ans	90,4	90,0	91,0	85,0	92,9	91,3	90,8
	50-74 ans	91,7	91,4	92,1	90,6	91,1	91,9	92,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie		•	•	•	•	·	•	
complète	50-54 ans	97,6	98,0	97,0	98,1	96,9	97,8	97,1
	55-59 ans	96,9	95,5	98,9	89,4	95,5	98,8	100,0
	60-64 ans	98,4	97,4	100,0	96,8	100,0	97,7	100,0
	65-69 ans	97,5	97,2	97,9	95,3	97,0	97,7	98,2
	70-74 ans	96,9	95,9	98,4	94,1	92,3	96,4	99,1
	50-74 ans	97,5	96,8	98,4	95,5	96,8	97,5	99,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient	F0 F4 and	2	2	2	2	2	2	2
(en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3 3	3	3
	70-74 ans 50-74 ans	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
' ' '	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en								
jours)	50-54 ans	121	124	115	130	116	111	115
	55-59 ans	113	115	111	102	126	122	107
	60-64 ans	116	111	125	118	170	107	115
	65-69 ans	113	110	117	116	127	107	115
	70-74 ans	111	117	104	143	130	110	101
COA Dálai a falian (CA CO) antes la efacilitat diverto.	50-74 ans	115	115	115	122	128	111	110
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98 (74-137)	100 (76-139)	97 (74-137)	104 (82-154)	97 (74-138)	85,5 (67-133)	97 (72-136)
1 2 2 2 7		(/	()	- ()	- (- ()-)	-,- ()	- ()

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,5 (76,5-130)	100 (77-130)	98 (75-130)	102 (68-126)	110,5 (78-169)	100 (81-131)	98 (68-123)
	60-64 ans	96 (76-127,5)	95 (76-124)	97 (76-133)	112 (74-129)	108 (79-184)	94 (77-117)	89 (75,5-129)
	65-69 ans	93 (74-127)	89 (71-120,5)	97 (77-131)	92 (69-122)	97 (81-130)	88 (71-120)	97,5 (76-134,5)
	70-74 ans	91 (73-123)	94 (76-126)	87,5 (70-123)	118,5 (84-175)	87 (71-136)	93 (74-121)	88 (70-119)
	50-74 ans	95 (75-129)	95 (75-126,5)	95 (75-130)	102,5 (75-134)	97 (75-140)	93 (75-121)	95 (73-125)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,9	6,2	5,5	7,1	6,9	4,1	2,7
	55-59 ans	4,3	5,3	2,8	5,8	3,7	5,1	2,5
	60-64 ans	3,0	2,9	3,2	3,0	4,2	2,9	2,9
	65-69 ans	2,9	4,1	1,3	6,1	0,0	3,4	1,7
	70-74 ans	2,4	2,6	2,2	4,8	6,7	2,0	1,7
	50-74 ans	3,6	4,1	2,8	5,6	4,7	3,3	2,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie	====			400.0	00.4	4000		400.0
connu	50-54 ans	98,8	98,0	100,0	98,1	100,0	97,8	100,0
	55-59 ans	99,1	99,2	98,9	97,9	95,5	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,8	99,4	97,9	100,0	93,9	99,2	99,1
	70-74 ans	99,0	98,2	100,0	97,1	100,0	98,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-74 ans	99,1	98,9	99,3	98,3	98,1	99,2	99,8
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,8	37,3	48,5	35,0	43,9	42,6	57,1
alagnosiiquo (solosospio su aalio) asiin lo rosaliat sol risiliia.	55-59 ans	37,2	33,6	42,4	27,1	50,0	37,0	40,0
	60-64 ans	33,5	24,7	47,5	21,9	56,5	26,2	45,5
	65-69 ans	27,3	17,5	39,5	17,8	39,4	17,4	39,5
	70-74 ans	30,1	25,3	36,7	8,3	46,2	29,6	35,7
	50-74 ans	33,4	27,0	42,5	25,0	45,9	28,1	41,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen		,-		,-		,-		, .
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	3,3	5,9	4,9	9,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,9	2,9	3,0	4,2	4,2	2,2	2,7
	60-64 ans	4,1	5,2	2,5	6,3	0,0	4,6	3,0
	65-69 ans	2,7	0,5	5,4	0,0	3,0	0,7	6,1
	70-74 ans	1,6	2,8	0,0	8,3	0,0	1,4	0,0
	50-74 ans	3,1	3,0	3,4	4,7	5,0	2,0	2,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	60-64 ans	1,3	1,5	0,8	1,6	4,3	1,5	0,0

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,2	1,1	1,4	0,0	0,0	1,4	1,8
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,7	1,0	0,6	0,7	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un	E0 E4 ene	44.0	110	7.0	40.7	0.4	24.2	F 7
adénome non avancé	50-54 ans	11,6	14,0	7,9	10,7	9,1	21,3	5,7
	55-59 ans	16,7	15,0	19,2	14,6	12,5	15,2	21,3
	60-64 ans	16,5	18,6	13,1	21,9	4,3	16,9	15,2
	65-69 ans	19,4	19,7	19,0	15,6	18,2	21,0	19,3
	70-74 ans	18,3	18,5	18,0	22,2	7,7	17,6	19,1
DOC Deursentege de nersennes quant qui un avenen	50-74 ans	16,7	17,4	15,7	15,9	10,7	18,2	17,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé	50-54 ans	25,1	23,3	27,7	25,2	28,8	19,1	25,7
	55-59 ans	30,5	37,9	20,2	39,6	33,3	37,0	16,0
	60-64 ans	32,9	36,6	27,0	39,1	26,1	35,4	27,3
	65-69 ans	30,6	36,6	23,1	42,2	21,2	34,8	23,7
	70-74 ans	35,0	38,2	30,5	38,9	30,8	38,0	30,4
	50-74 ans	31,1	34,8	25,8	34,8	27,7	34,8	25,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	00 1 1 0.10	0.,.	0.,0	20,0	01,0	,-	0.,0	20,1
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	10,4	13,3	5,9	14,6	7,6	10,6	2,9
	55-59 ans	6,3	5,7	7,1	8,3	0,0	4,3	9,3
	60-64 ans	8,2	9,3	6,6	7,8	8,7	10,0	6,1
	65-69 ans	13,0	16,9	8,2	22,2	15,2	15,2	6,1
	70-74 ans	10,5	10,7	10,2	13,9	7,7	9,9	10,4
	50-74 ans	9,8	11,4	7,7	13,2	8,2	10,4	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de								
lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
, (55-59 ans	1,3	1,4	1,0	4,2	0,0	0,0	1,3
	60-64 ans	1,6	2,1	0,8	0,0	0,0	3,1	1,0
	65-69 ans	1,5	2,7	0,0	2,2	0,0	2,9	0,0
	70-74 ans	1,3	1,1	1,6	2,8	7,7	0,7	0,9
	50-74 ans	1,2	1,5	0,7	1,4	0,6	1,6	0,7
	30-74 ans	1,2	1,0	0,1	1,7	0,0	1,0	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI								
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4,0	1,0	3,9	1,5	4,3	0,0
	55-59 ans	1,7	2,1	1,0	0,0	0,0	3,3	1,3

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,6	2,1	0,8	1,6	0,0	2,3	1,0
	65-69 ans	2,7	3,8	1,4	0,0	0,0	5,1	1,8
	70-74 ans	1,6	2,2	0,8	0,0	0,0	2,8	0,9
	50-74 ans	2,1	2,8	1,0	1,7	0,6	3,5	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.4	0.0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	2,0	1,0	1,9	0,0	2,1	2,9
	55-59 ans	1,3	1,4	1,0	2,1	0,0	1,1	1,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,2	1,1	1,4	0,0	3,0	1,4	0,9
	70-74 ans	1,3	1,1	1,6	5,6	0,0	0,0	1,7
	50-74 ans	1,0	1,1	1,0	1,7	0,6	0,7	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,1	15,5	9,0	14,7	9,5	17,6	8,0
	55-59 ans	17,8	25,3	11,4	33,4	13,7	22,3	10,7
	60-64 ans	21,9	32,9	12,6	49,1	9,4	27,7	13,4
	65-69 ans	21,5	29,7	14,7	42,0	21,6	27,1	13,5
	70-74 ans	31,4	43,0	21,9	64,9	16,4	39,3	22,5
	50-74 ans	20,3	28,3	13,5	29,7	12,0	27,6	14,1
	50-74 ans **	20,0	27,5	13,2	,-	-		-
		,	•	,				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	9,7	7,0	10,3	7,2	8,3	6,6
	55-59 ans	11,5	18,1	5,8	24,4	10,0	15,8	4,6
	60-64 ans	14,6	21,8	8,5	31,5	8,0	18,7	8,6
	65-69 ans	13,1	19,3	8,0	30,7	11,6	16,9	7,5
	70-74 ans	20,6	28,9	13,8	41,3	13,1	26,9	13,8
	50-74 ans	13,2	18,9	8,4	20,4	8,6	18,1	8,3
	50-74 ans **	13,1	18,4	8,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	8,0	4,2	8,3	4,2	7,4	4,4
	55-59 ans	9,0	14,7	4,1	18,0	7,5	13,5	3,0
	60-64 ans	11,4	16,9	6,7	21,4	5,3	15,5	7,0
	65-69 ans	10,8	15,6	6,9	22,6	8,3	14,1	6,6
	70-74 ans	14,1	19,2	9,9	32,4	13,1	16,9	9,5
	50-74 ans	10,0	14,5	6,2	15,2	5,9	14,1	6,3
	50-74 ans **	9,9	14,2	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	6,8	8,6	5,2	9,1	5,3	7,4	5,1
	55-59 ans	10,1	16,7	4,4	24,4	7,5	14,0	3,4
	60-64 ans	13,0	19,4	7,7	26,4	6,7	17,1	8,0
	65-69 ans	13,3	18,8	8,8	29,1	11,6	16,5	8,3
	70-74 ans	18,5	27,2	11,3	44,2	13,1	24,4	11,1
	50-74 ans	12,0	17,4	7,3	19,0	7,1	16,7	7,5
	50-74 ans **	11,8	17,0	7,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,6	1,5	6,0	1,9	4,6	0,7
	55-59 ans	2,4	2,7	2,0	5,1	0,0	1,9	2,7
	60-64 ans	3,6	5,5	2,1	6,3	2,7	5,3	1,9
	65-69 ans	5,6	9,0	2,8	16,2	8,3	7,4	1,9
	70-74 ans	6,2	8,1	4,6	14,7	3,3	7,0	4,7
	50-74 ans	4,2	6,2	2,5	7,7	2,5	5,4	2,5
	50-74 ans **	4,0	5,7	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	7,7	10,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	11,5	11,1	12,5	20,0	0,0	7,7	16,7
	65-69 ans	14,0	12,9	16,7	10,0	20,0	14,3	14,3
	70-74 ans	15,6	21,1	7,7	20,0	0,0	21,4	8,3
	50-74 ans	11,3	12,5	8,7	12,8	7,7	12,3	9,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)