

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

1/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 9 704 | 4 572 | 5 132 | 3 055 | 3 315 | 1 517 | 1 817 |
| | 55-59 ans | 7 824 | 3 582 | 4 242 | 884 | 938 | 2 698 | 3 304 |
| | 60-64 ans | 8 700 | 3 949 | 4 751 | 845 | 834 | 3 104 | 3 917 |
| | 65-69 ans | 9 105 | 4 251 | 4 854 | 721 | 632 | 3 530 | 4 222 |
| | 70-74 ans | 5 713 | 2 670 | 3 043 | 340 | 325 | 2 330 | 2 718 |
| | 50-74 ans | 41 046 | 19 024 | 22 022 | 5 845 | 6 044 | 13 179 | 15 978 |
| | A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 595 | 294 | 301 | 233 | 210 | 61 |
| 55-59 ans | | 467 | 225 | 242 | 72 | 59 | 153 | 183 |
| 60-64 ans | | 458 | 212 | 246 | 63 | 63 | 149 | 183 |
| 65-69 ans | | 499 | 229 | 270 | 47 | 52 | 182 | 218 |
| 70-74 ans | | 358 | 171 | 187 | 37 | 23 | 134 | 164 |
| 50-74 ans | | 2 377 | 1 131 | 1 246 | 452 | 407 | 679 | 839 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | | 50-54 ans | 469 | 237 | 232 | 187 | 157 | 50 |
| | 55-59 ans | 366 | 174 | 192 | 48 | 41 | 126 | 151 |
| | 60-64 ans | 388 | 180 | 208 | 51 | 47 | 129 | 161 |
| | 65-69 ans | 408 | 188 | 220 | 31 | 38 | 157 | 182 |
| | 70-74 ans | 290 | 136 | 154 | 27 | 12 | 109 | 142 |
| | 50-74 ans | 1 921 | 915 | 1 006 | 344 | 295 | 571 | 711 |
| | A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 126 | 57 | 69 | 46 | 53 | 11 |
| 55-59 ans | | 101 | 51 | 50 | 24 | 18 | 27 | 32 |
| 60-64 ans | | 70 | 32 | 38 | 12 | 16 | 20 | 22 |
| 65-69 ans | | 91 | 41 | 50 | 16 | 14 | 25 | 36 |
| 70-74 ans | | 68 | 35 | 33 | 10 | 11 | 25 | 22 |
| 50-74 ans | | 456 | 216 | 240 | 108 | 112 | 108 | 128 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | | 50-54 ans | 9 578 | 4 515 | 5 063 | 3 009 | 3 262 | 1 506 |
| | 55-59 ans | 7 723 | 3 531 | 4 192 | 860 | 920 | 2 671 | 3 272 |
| | 60-64 ans | 8 630 | 3 917 | 4 713 | 833 | 818 | 3 084 | 3 895 |
| | 65-69 ans | 9 014 | 4 210 | 4 804 | 705 | 618 | 3 505 | 4 186 |
| | 70-74 ans | 5 645 | 2 635 | 3 010 | 330 | 314 | 2 305 | 2 696 |
| | 50-74 ans | 40 590 | 18 808 | 21 782 | 5 737 | 5 932 | 13 071 | 15 850 |
| | A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 354 | 198 | 156 | 146 | 103 | 52 |
| 55-59 ans | | 347 | 208 | 139 | 66 | 38 | 142 | 101 |
| 60-64 ans | | 433 | 256 | 177 | 76 | 50 | 180 | 127 |
| 65-69 ans | | 455 | 273 | 182 | 61 | 30 | 212 | 152 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 363 | 222 | 141 | 40 | 20 | 182 | 121 |
| | 50-74 ans | 1 952 | 1 157 | 795 | 389 | 241 | 768 | 554 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 350 | 197 | 153 | 145 | 102 | 52 | 51 |
| | 55-59 ans | 345 | 207 | 138 | 66 | 38 | 141 | 100 |
| | 60-64 ans | 427 | 253 | 174 | 74 | 49 | 179 | 125 |
| | 65-69 ans | 448 | 268 | 180 | 59 | 30 | 209 | 150 |
| | 70-74 ans | 357 | 218 | 139 | 40 | 20 | 178 | 119 |
| | 50-74 ans | 1 927 | 1 143 | 784 | 384 | 239 | 759 | 545 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 322 | 181 | 141 | 133 | 93 | 48 | 48 |
| | 55-59 ans | 321 | 192 | 129 | 58 | 33 | 134 | 96 |
| | 60-64 ans | 406 | 238 | 168 | 67 | 46 | 171 | 122 |
| | 65-69 ans | 419 | 251 | 168 | 55 | 25 | 196 | 143 |
| | 70-74 ans | 335 | 205 | 130 | 37 | 19 | 168 | 111 |
| | 50-74 ans | 1 803 | 1 067 | 736 | 350 | 216 | 717 | 520 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 302 | 172 | 130 | 128 | 84 | 44 | 46 |
| | 55-59 ans | 299 | 182 | 117 | 55 | 30 | 127 | 87 |
| | 60-64 ans | 377 | 228 | 149 | 65 | 39 | 163 | 110 |
| | 65-69 ans | 398 | 236 | 162 | 52 | 25 | 184 | 137 |
| | 70-74 ans | 311 | 189 | 122 | 36 | 18 | 153 | 104 |
| | 50-74 ans | 1 687 | 1 007 | 680 | 336 | 196 | 671 | 484 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 322 | 181 | 141 | 133 | 93 | 48 | 48 |
| | 55-59 ans | 320 | 192 | 128 | 58 | 33 | 134 | 95 |
| | 60-64 ans | 403 | 238 | 165 | 67 | 46 | 171 | 119 |
| | 65-69 ans | 416 | 250 | 166 | 55 | 25 | 195 | 141 |
| | 70-74 ans | 329 | 202 | 127 | 36 | 19 | 166 | 108 |
| | 50-74 ans | 1 790 | 1 063 | 727 | 349 | 216 | 714 | 511 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 317 | 179 | 138 | 133 | 91 | 46 | 47 |
| | 55-59 ans | 318 | 190 | 128 | 56 | 32 | 134 | 96 |
| | 60-64 ans | 403 | 238 | 165 | 67 | 44 | 171 | 121 |
| | 65-69 ans | 415 | 249 | 166 | 55 | 24 | 194 | 142 |
| | 70-74 ans | 331 | 203 | 128 | 37 | 18 | 166 | 110 |
| | 50-74 ans | 1 784 | 1 059 | 725 | 348 | 209 | 711 | 516 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 322 | 181 | 141 | 133 | 93 | 48 | 48 |
| | 55-59 ans | 321 | 192 | 129 | 58 | 33 | 134 | 96 |
| | 60-64 ans | 407 | 238 | 169 | 67 | 46 | 171 | 123 |
| | 65-69 ans | 419 | 251 | 168 | 55 | 25 | 196 | 143 |
| | 70-74 ans | 336 | 206 | 130 | 37 | 19 | 169 | 111 |
| | 50-74 ans | 1 805 | 1 068 | 737 | 350 | 216 | 718 | 521 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 127 | 57 | 70 | 42 | 46 | 15 | 24 |
| | 55-59 ans | 102 | 45 | 57 | 14 | 14 | 31 | 43 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

4/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 96 | 50 | 46 | 16 | 15 | 34 | 31 |
| | 65-69 ans | 112 | 58 | 54 | 12 | 3 | 46 | 51 |
| | 70-74 ans | 82 | 38 | 44 | 8 | 7 | 30 | 37 |
| | 50-74 ans | 519 | 248 | 271 | 92 | 85 | 156 | 186 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 43 | 23 | 20 | 6 | 6 | 17 | 14 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 53 | 37 | 16 | 26 | 9 | 11 | 7 |
| | 55-59 ans | 53 | 35 | 18 | 7 | 3 | 28 | 15 |
| | 60-64 ans | 75 | 48 | 27 | 15 | 6 | 33 | 21 |
| | 65-69 ans | 100 | 66 | 34 | 14 | 6 | 52 | 28 |
| | 70-74 ans | 87 | 49 | 38 | 7 | 6 | 42 | 32 |
| | 50-74 ans | 368 | 235 | 133 | 69 | 30 | 166 | 103 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 90 | 58 | 32 | 43 | 20 | 15 | 12 |
| | 55-59 ans | 110 | 76 | 34 | 19 | 9 | 57 | 25 |
| | 60-64 ans | 154 | 99 | 55 | 25 | 12 | 74 | 43 |
| | 65-69 ans | 143 | 89 | 54 | 18 | 9 | 71 | 45 |
| | 70-74 ans | 115 | 82 | 33 | 11 | 4 | 71 | 29 |
| | 50-74 ans | 612 | 404 | 208 | 116 | 54 | 288 | 154 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 15 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

5/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 23 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 39 | 22 | 17 | 8 | 6 | 14 | 11 |
| | 65-69 ans | 33 | 25 | 8 | 9 | 3 | 16 | 5 |
| | 70-74 ans | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 15 | 6 |
| | 50-74 ans | 137 | 88 | 49 | 35 | 18 | 53 | 31 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 17 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 21 | 9 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 143 | 95 | 48 | 69 | 29 | 26 | 19 |
| | 55-59 ans | 163 | 111 | 52 | 26 | 12 | 85 | 40 |
| | 60-64 ans | 230 | 148 | 82 | 40 | 18 | 108 | 64 |
| | 65-69 ans | 244 | 155 | 89 | 32 | 15 | 123 | 74 |
| | 70-74 ans | 203 | 132 | 71 | 18 | 10 | 114 | 61 |
| | 50-74 ans | 983 | 641 | 342 | 185 | 84 | 456 | 258 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 90 | 58 | 32 | 43 | 20 | 15 | 12 |
| | 55-59 ans | 110 | 76 | 34 | 19 | 9 | 57 | 25 |
| | 60-64 ans | 154 | 99 | 55 | 25 | 12 | 74 | 43 |
| | 65-69 ans | 143 | 89 | 54 | 18 | 9 | 71 | 45 |
| | 70-74 ans | 115 | 82 | 33 | 11 | 4 | 71 | 29 |
| | 50-74 ans | 612 | 404 | 208 | 116 | 54 | 288 | 154 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 77 | 52 | 25 | 39 | 16 | 13 | 9 |
| | 55-59 ans | 87 | 60 | 27 | 17 | 7 | 43 | 20 |
| | 60-64 ans | 134 | 86 | 48 | 19 | 12 | 67 | 36 |
| | 65-69 ans | 113 | 71 | 42 | 15 | 8 | 56 | 34 |
| | 70-74 ans | 97 | 70 | 27 | 11 | 4 | 59 | 23 |
| | 50-74 ans | 508 | 339 | 169 | 101 | 47 | 238 | 122 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 88 | 62 | 26 | 46 | 17 | 16 | 9 |
| | 55-59 ans | 97 | 68 | 29 | 17 | 7 | 51 | 22 |
| | 60-64 ans | 158 | 103 | 55 | 22 | 14 | 81 | 41 |
| | 65-69 ans | 137 | 86 | 51 | 16 | 10 | 70 | 41 |
| | 70-74 ans | 125 | 88 | 37 | 14 | 5 | 74 | 32 |
| | 50-74 ans | 605 | 407 | 198 | 115 | 53 | 292 | 145 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 15 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 23 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 39 | 22 | 17 | 8 | 6 | 14 | 11 |
| | 65-69 ans | 33 | 25 | 8 | 9 | 3 | 16 | 5 |
| | 70-74 ans | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 15 | 6 |
| | 50-74 ans | 137 | 88 | 49 | 35 | 18 | 53 | 31 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 20 | 11 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| | 60-64 ans | 37 | 20 | 17 | 6 | 6 | 14 | 11 |
| | 65-69 ans | 30 | 23 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 125 | 77 | 48 | 28 | 18 | 49 | 30 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 32 | 17 | 15 | 5 | 6 | 12 | 9 |
| | 65-69 ans | 27 | 21 | 6 | 8 | 3 | 13 | 3 |
| | 70-74 ans | 23 | 16 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 112 | 69 | 43 | 25 | 18 | 44 | 25 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 22 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| | 70-74 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 72 | 41 | 31 | 16 | 14 | 25 | 17 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 40 | 28 | 12 | 9 | 4 | 19 | 8 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 36 | 25 | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 88 - Vosges

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 20 | 11 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| | 60-64 ans | 35 | 18 | 17 | 5 | 6 | 13 | 11 |
| | 65-69 ans | 30 | 23 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 18 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 |
| | 50-74 ans | 123 | 75 | 48 | 27 | 18 | 48 | 30 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 42 | 30 | 12 | 14 | 6 | 16 | 6 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

9/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,1 | 6,4 | 5,9 | 7,6 | 6,3 | 4,0 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 6,0 | 6,3 | 5,7 | 8,1 | 6,3 | 5,7 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 7,5 | 7,6 | 4,8 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 6,5 | 8,2 | 5,2 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 10,9 | 7,1 | 5,8 | 6,0 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 7,7 | 6,7 | 5,2 | 5,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2,9 | 3,4 | 1,1 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 78,8 | 80,6 | 77,1 | 80,3 | 74,8 | 82,0 | 82,4 |
| | 55-59 ans | 78,4 | 77,3 | 79,3 | 66,7 | 69,5 | 82,4 | 82,5 |
| | 60-64 ans | 84,7 | 84,9 | 84,6 | 81,0 | 74,6 | 86,6 | 88,0 |
| | 65-69 ans | 81,8 | 82,1 | 81,5 | 66,0 | 73,1 | 86,3 | 83,5 |
| | 70-74 ans | 81,0 | 79,5 | 82,4 | 73,0 | 52,2 | 81,3 | 86,6 |
| | 50-74 ans | 80,8 | 80,9 | 80,7 | 76,1 | 72,5 | 84,1 | 84,7 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,7 | 4,4 | 3,1 | 4,9 | 3,2 | 3,5 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5,9 | 3,3 | 7,7 | 4,1 | 5,3 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 5,0 | 6,5 | 3,8 | 9,1 | 6,1 | 5,8 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 5,0 | 6,5 | 3,8 | 8,7 | 4,9 | 6,0 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 6,4 | 8,4 | 4,7 | 12,1 | 6,4 | 7,9 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 6,2 | 3,6 | 6,8 | 4,1 | 5,9 | 3,5 |
| 50-74 ans ** | 4,8 | 6,1 | 3,6 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,9 | 99,5 | 98,1 | 99,3 | 99,0 | 100,0 | 96,2 |
| | 55-59 ans | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,0 |
| | 60-64 ans | 98,6 | 98,8 | 98,3 | 97,4 | 98,0 | 99,4 | 98,4 |
| | 65-69 ans | 98,5 | 98,2 | 98,9 | 96,7 | 100,0 | 98,6 | 98,7 |
| | 70-74 ans | 98,3 | 98,2 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 98,3 |
| | 50-74 ans | 98,7 | 98,8 | 98,6 | 98,7 | 99,2 | 98,8 | 98,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

10/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92,0 | 91,9 | 92,2 | 91,7 | 91,2 | 92,3 | 94,1 |
| | 55-59 ans | 93,0 | 92,8 | 93,5 | 87,9 | 86,8 | 95,0 | 96,0 |
| | 60-64 ans | 95,1 | 94,1 | 96,6 | 90,5 | 93,9 | 95,5 | 97,6 |
| | 65-69 ans | 93,5 | 93,7 | 93,3 | 93,2 | 83,3 | 93,8 | 95,3 |
| | 70-74 ans | 93,8 | 94,0 | 93,5 | 92,5 | 95,0 | 94,4 | 93,3 |
| | 50-74 ans | 93,6 | 93,4 | 93,9 | 91,1 | 90,4 | 94,5 | 95,4 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,8 | 95,0 | 92,2 | 96,2 | 90,3 | 91,7 | 95,8 |
| | 55-59 ans | 93,1 | 94,8 | 90,7 | 94,8 | 90,9 | 94,8 | 90,6 |
| | 60-64 ans | 92,9 | 95,8 | 88,7 | 97,0 | 84,8 | 95,3 | 90,2 |
| | 65-69 ans | 95,0 | 94,0 | 96,4 | 94,5 | 100,0 | 93,9 | 95,8 |
| | 70-74 ans | 92,8 | 92,2 | 93,8 | 97,3 | 94,7 | 91,1 | 93,7 |
| | 50-74 ans | 93,6 | 94,4 | 92,4 | 96,0 | 90,7 | 93,6 | 93,1 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-2) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-2) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-2) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 100 | 105 | 92 | 115 | 90 | 77 | 98 |
| | 55-59 ans | 92 | 87 | 101 | 100 | 126 | 81 | 92 |
| | 60-64 ans | 92 | 94 | 90 | 97 | 89 | 93 | 91 |
| | 65-69 ans | 92 | 90 | 94 | 118 | 106 | 82 | 92 |
| | 70-74 ans | 102 | 104 | 100 | 138 | 127 | 96 | 95 |
| | 50-74 ans | 95 | 96 | 95 | 112 | 100 | 87 | 93 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 72,5 (51-109) | 75 (49-114) | 70 (53-100) | 84 (50-126) | 68 (52-96) | 68,5 (45,5-87,5) | 71,5 (55,5-101,5) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

11/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 69 (52-96) | 68 (50-90,5) | 72 (54-116) | 69 (51-104) | 83 (70-158) | 66 (50-89) | 69 (53-110) |
| | 60-64 ans | 70 (53-101) | 69 (51-102) | 71 (54,5-95) | 80 (48-105) | 75,5 (54-107) | 66 (52-101) | 69 (55-94) |
| | 65-69 ans | 70 (53-97) | 71 (54-97) | 69,5 (50-97) | 78 (68-123) | 96 (61-109) | 67 (52,5-95,5) | 67 (48-89) |
| | 70-74 ans | 74 (54-104) | 75 (55-103) | 69 (54-104) | 86 (62-134) | 82 (47-101) | 72,5 (54-100) | 69 (54-105) |
| | 50-74 ans | 71 (53-101) | 71 (53-102) | 71 (53,5-101) | 78,5 (55-118) | 77 (54-110,5) | 68 (51-96) | 69 (53-97) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 4,5 | 5,3 | 3,5 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2,0 | 2,6 | 1,1 | 3,3 | 3,3 | 2,4 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 1,1 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 98,4 | 98,9 | 97,9 | 100,0 | 97,8 | 95,8 | 97,9 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 99,0 | 99,2 | 96,6 | 97,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 99,3 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 99,2 |
| | 65-69 ans | 99,0 | 99,2 | 98,8 | 100,0 | 96,0 | 99,0 | 99,3 |
| | 70-74 ans | 98,8 | 99,0 | 98,5 | 100,0 | 94,7 | 98,8 | 99,1 |
| | 50-74 ans | 98,9 | 99,3 | 98,5 | 99,4 | 96,8 | 99,2 | 99,2 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 39,4 | 31,5 | 49,6 | 31,6 | 49,5 | 31,3 | 50,0 |
| | 55-59 ans | 31,8 | 23,4 | 44,2 | 24,1 | 42,4 | 23,1 | 44,8 |
| | 60-64 ans | 23,6 | 21,0 | 27,2 | 23,9 | 32,6 | 19,9 | 25,2 |
| | 65-69 ans | 26,7 | 23,1 | 32,1 | 21,8 | 12,0 | 23,5 | 35,7 |
| | 70-74 ans | 24,4 | 18,4 | 33,8 | 21,6 | 36,8 | 17,8 | 33,3 |
| | 50-74 ans | 28,8 | 23,2 | 36,8 | 26,3 | 39,4 | 21,7 | 35,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 2,1 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 4,7 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 2,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 88 - Vosges

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 16,5 | 20,4 | 11,3 | 19,5 | 9,7 | 22,9 | 14,6 |
| | 55-59 ans | 16,5 | 18,2 | 14,0 | 12,1 | 9,1 | 20,9 | 15,6 |
| | 60-64 ans | 18,4 | 20,2 | 16,0 | 22,4 | 13,0 | 19,3 | 17,1 |
| | 65-69 ans | 23,9 | 26,3 | 20,2 | 25,5 | 24,0 | 26,5 | 19,6 |
| | 70-74 ans | 25,9 | 23,8 | 29,2 | 18,9 | 31,6 | 24,9 | 28,8 |
| | 50-74 ans | 20,4 | 22,0 | 18,0 | 19,7 | 13,9 | 23,1 | 19,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 28,0 | 32,0 | 22,7 | 32,3 | 21,5 | 31,3 | 25,0 |
| | 55-59 ans | 34,3 | 39,6 | 26,4 | 32,8 | 27,3 | 42,5 | 26,0 |
| | 60-64 ans | 37,8 | 41,6 | 32,5 | 37,3 | 26,1 | 43,3 | 35,0 |
| | 65-69 ans | 34,1 | 35,5 | 32,1 | 32,7 | 36,0 | 36,2 | 31,5 |
| | 70-74 ans | 34,2 | 39,8 | 25,4 | 29,7 | 21,1 | 42,0 | 26,1 |
| | 50-74 ans | 33,9 | 37,8 | 28,2 | 33,1 | 25,0 | 40,1 | 29,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,7 | 3,9 | 5,7 | 3,8 | 7,5 | 4,2 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 13,8 | 3,0 | 4,5 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 9,6 | 9,2 | 10,1 | 11,9 | 13,0 | 8,2 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 7,9 | 10,0 | 4,8 | 16,4 | 12,0 | 8,2 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 8,0 | 9,7 | 5,4 | 13,5 | 5,3 | 8,9 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 7,6 | 8,2 | 6,6 | 10,0 | 8,3 | 7,4 | 6,0 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 3,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 88 - Vosges

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 2,9 | 0,8 | 8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,9 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 2,6 | 0,9 | 1,1 | 0,6 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 4,2 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,0 | 2,3 | 3,4 | 6,1 | 0,0 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 5,3 | 1,8 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 3,2 | 0,8 | 1,0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 14,9 | 21,0 | 9,5 | 22,9 | 8,9 | 17,3 | 10,5 |
| | 55-59 ans | 21,1 | 31,4 | 12,4 | 30,2 | 13,0 | 31,8 | 12,2 |
| | 60-64 ans | 26,7 | 37,8 | 17,4 | 48,0 | 22,0 | 35,0 | 16,4 |
| | 65-69 ans | 27,1 | 36,8 | 18,5 | 45,4 | 24,3 | 35,1 | 17,7 |
| | 70-74 ans | 36,0 | 50,1 | 23,6 | 54,5 | 31,8 | 49,5 | 22,6 |
| | 50-74 ans | 24,2 | 34,1 | 15,7 | 32,2 | 14,2 | 34,9 | 16,3 |
| | 50-74 ans ** | 24,0 | 33,5 | 15,4 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,4 | 12,8 | 6,3 | 14,3 | 6,1 | 10,0 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 14,2 | 21,5 | 8,1 | 22,1 | 9,8 | 21,3 | 7,6 |
| | 60-64 ans | 17,8 | 25,3 | 11,7 | 30,0 | 14,7 | 24,0 | 11,0 |
| | 65-69 ans | 15,9 | 21,1 | 11,2 | 25,5 | 14,6 | 20,3 | 10,8 |
| | 70-74 ans | 20,4 | 31,1 | 11,0 | 33,3 | 12,7 | 30,8 | 10,8 |
| | 50-74 ans | 15,1 | 21,5 | 9,5 | 20,2 | 9,1 | 22,0 | 9,7 |
| | 50-74 ans ** | 15,1 | 21,4 | 9,3 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,0 | 11,5 | 4,9 | 13,0 | 4,9 | 8,6 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 17,0 | 6,4 | 19,8 | 7,6 | 16,1 | 6,1 |
| | 60-64 ans | 15,5 | 22,0 | 10,2 | 22,8 | 14,7 | 21,7 | 9,2 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 16,9 | 8,7 | 21,3 | 12,9 | 16,0 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 26,6 | 9,0 | 33,3 | 12,7 | 25,6 | 8,5 |
| | 50-74 ans | 12,5 | 18,0 | 7,8 | 17,6 | 7,9 | 18,2 | 7,7 |
| | 50-74 ans ** | 12,6 | 17,9 | 7,6 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 88 - Vosges

14/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,2 | 13,7 | 5,1 | 15,3 | 5,2 | 10,6 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 12,6 | 19,3 | 6,9 | 19,8 | 7,6 | 19,1 | 6,7 |
| | 60-64 ans | 18,3 | 26,3 | 11,7 | 26,4 | 17,1 | 26,3 | 10,5 |
| | 65-69 ans | 15,2 | 20,4 | 10,6 | 22,7 | 16,2 | 20,0 | 9,8 |
| | 70-74 ans | 22,1 | 33,4 | 12,3 | 42,4 | 15,9 | 32,1 | 11,9 |
| | 50-74 ans | 14,9 | 21,6 | 9,1 | 20,0 | 8,9 | 22,3 | 9,1 |
| | 50-74 ans ** | 14,9 | 21,4 | 8,9 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 3,0 | 4,0 | 2,1 | 9,3 | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 5,6 | 3,6 | 9,6 | 7,3 | 4,5 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 3,7 | 5,9 | 1,7 | 12,8 | 4,9 | 4,6 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 4,8 | 7,6 | 2,3 | 15,2 | 3,2 | 6,5 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 4,7 | 2,2 | 6,1 | 3,0 | 4,1 | 2,0 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 4,5 | 2,3 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 7,7 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 10,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 15,0 | 11,8 | 16,7 | 0,0 | 14,3 | 18,2 |
| | 65-69 ans | 10,0 | 8,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 25,0 |
| | 70-74 ans | 8,0 | 11,1 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 0,0 | 10,2 | 16,7 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)