

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 658	12 744	13 914	9 667	10 468	3 077	3 446
	55-59 ans	20 650	9 230	11 420	3 193	3 860	6 037	7 560
	60-64 ans	17 244	7 154	10 090	2 130	2 959	5 024	7 131
	65-69 ans	15 804	6 663	9 141	1 672	2 186	4 991	6 955
	70-74 ans	11 800	4 830	6 970	1 066	1 547	3 764	5 423
	50-74 ans	92 156	40 621	51 535	17 728	21 020	22 893	30 515
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 649	832	817	679	654	153	163
	55-59 ans	1 400	620	780	239	302	381	478
	60-64 ans	1 082	441	641	150	232	291	409
	65-69 ans	931	391	540	107	146	284	394
	70-74 ans	856	349	507	88	136	261	371
	50-74 ans	5 918	2 633	3 285	1 263	1 470	1 370	1 815
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 253	648	605	513	470	135	135
	55-59 ans	1 078	500	578	171	196	329	382
	60-64 ans	868	355	513	102	167	253	346
	65-69 ans	754	320	434	77	93	243	341
	70-74 ans	604	249	355	46	88	203	267
	50-74 ans	4 557	2 072	2 485	909	1 014	1 163	1 471
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	396	184	212	166	184	18	28
	55-59 ans	322	120	202	68	106	52	96
	60-64 ans	214	86	128	48	65	38	63
	65-69 ans	177	71	106	30	53	41	53
	70-74 ans	252	100	152	42	48	58	104
	50-74 ans	1 361	561	800	354	456	207	344
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 262	12 560	13 702	9 501	10 284	3 059	3 418
	55-59 ans	20 328	9 110	11 218	3 125	3 754	5 985	7 464
	60-64 ans	17 030	7 068	9 962	2 082	2 894	4 986	7 068
	65-69 ans	15 627	6 592	9 035	1 642	2 133	4 950	6 902
	70-74 ans	11 548	4 730	6 818	1 024	1 499	3 706	5 319
	50-74 ans	90 795	40 060	50 735	17 374	20 564	22 686	30 171
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	866	452	414	347	318	105	96
	55-59 ans	796	434	362	185	138	249	224
	60-64 ans	716	360	356	123	128	237	228
	65-69 ans	797	421	376	107	100	314	276

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	610	305	305	76	75	229	230
	50-74 ans	3 785	1 972	1 813	838	759	1 134	1 054
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	857	448	409	343	313	105	96
	55-59 ans	788	429	359	181	138	248	221
	60-64 ans	707	357	350	123	127	234	223
	65-69 ans	790	415	375	105	100	310	275
	70-74 ans	604	301	303	75	75	226	228
	50-74 ans	3 746	1 950	1 796	827	753	1 123	1 043
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	742	385	357	288	268	97	89
	55-59 ans	677	368	309	144	113	224	196
	60-64 ans	611	308	303	98	109	210	194
	65-69 ans	697	362	335	85	86	277	249
	70-74 ans	519	256	263	53	60	203	203
	50-74 ans	3 246	1 679	1 567	668	636	1 011	931
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	719	372	347	281	261	91	86
	55-59 ans	653	356	297	139	111	217	186
	60-64 ans	585	294	291	95	106	199	185
	65-69 ans	665	341	324	81	85	260	239
	70-74 ans	487	239	248	48	55	191	193
	50-74 ans	3 109	1 602	1 507	644	618	958	889
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	18	12	6	7	1	5	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	737	382	355	287	267	95	88
	55-59 ans	671	366	305	143	112	223	193
	60-64 ans	608	307	301	98	109	209	192
	65-69 ans	686	355	331	82	86	273	245
	70-74 ans	508	251	257	53	58	198	199
	50-74 ans	3 210	1 661	1 549	663	632	998	917
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4
	70-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
	50-74 ans	36	18	18	5	4	13	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	50-74 ans	27	14	13	7	2	7	11
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	739	384	355	287	268	97	87
	55-59 ans	674	366	308	143	112	223	196
	60-64 ans	608	307	301	97	108	210	193
	65-69 ans	693	361	332	85	85	276	247
	70-74 ans	518	256	262	53	60	203	202
	50-74 ans	3 232	1 674	1 558	665	633	1 009	925
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	747	387	360	290	269	97	91
	55-59 ans	679	369	310	145	113	224	197
	60-64 ans	615	311	304	99	110	212	194
	65-69 ans	705	367	338	87	86	280	252
	70-74 ans	527	259	268	54	60	205	208
	50-74 ans	3 273	1 693	1 580	675	638	1 018	942
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	351	145	206	106	152	39	54
	55-59 ans	245	113	132	50	43	63	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	204	79	125	28	44	51	81
	65-69 ans	225	89	136	18	41	71	95
	70-74 ans	181	69	112	17	19	52	93
	50-74 ans	1 206	495	711	219	299	276	412
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	44	26	18	21	14	5	4
	55-59 ans	34	18	16	6	5	12	11
	60-64 ans	32	16	16	6	2	10	14
	65-69 ans	30	14	16	5	1	9	15
	70-74 ans	20	5	15	1	3	4	12
	50-74 ans	160	79	81	39	25	40	56
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	4	5	2	3	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	95	60	35	39	27	21	8
	55-59 ans	101	56	45	21	18	35	27
	60-64 ans	105	57	48	18	14	39	34
	65-69 ans	112	62	50	9	12	53	38
	70-74 ans	89	54	35	9	15	45	20
	50-74 ans	502	289	213	96	86	193	127
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	201	124	77	99	61	25	16
	55-59 ans	241	156	85	62	37	94	48
	60-64 ans	217	127	90	30	42	97	48
	65-69 ans	264	159	105	39	24	120	81
	70-74 ans	171	97	74	17	15	80	59
	50-74 ans	1 094	663	431	247	179	416	252
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	32	20	12	17	8	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	43	19	24	5	6	14	18
	60-64 ans	42	24	18	10	6	14	12
	65-69 ans	53	33	20	14	3	19	17
	70-74 ans	53	31	22	9	7	22	15
	50-74 ans	223	127	96	55	30	72	66
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	3	2	3	3
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	8	5	3	4	1	1	2
	65-69 ans	7	6	1	2	1	4	0
	70-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
	50-74 ans	33	18	15	10	6	8	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	17	6	11	3	3	3	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	297	185	112	138	88	47	24
	55-59 ans	342	212	130	83	55	129	75
	60-64 ans	322	184	138	48	56	136	82
	65-69 ans	376	221	155	48	36	173	119
	70-74 ans	260	151	109	26	30	125	79
	50-74 ans	1 597	953	644	343	265	610	379

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	201	124	77	99	61	25	16
	55-59 ans	241	156	85	62	37	94	48
	60-64 ans	217	127	90	30	42	97	48
	65-69 ans	264	159	105	39	24	120	81
	70-74 ans	171	97	74	17	15	80	59
	50-74 ans	1 094	663	431	247	179	416	252
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	166	105	61	82	46	23	15
	55-59 ans	203	135	68	55	31	80	37
	60-64 ans	176	100	76	25	36	75	40
	65-69 ans	227	138	89	35	22	103	67
	70-74 ans	143	82	61	14	12	68	49
	50-74 ans	915	560	355	211	147	349	208
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	184	119	65	90	48	29	17
	55-59 ans	225	146	79	57	35	89	44
	60-64 ans	207	118	89	32	41	86	48
	65-69 ans	268	167	101	40	26	127	75
	70-74 ans	173	100	73	18	17	82	56
	50-74 ans	1 057	650	407	237	167	413	240
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	21	12	18	8	3	4
	55-59 ans	43	19	24	5	6	14	18
	60-64 ans	42	24	18	10	6	14	12
	65-69 ans	53	33	20	14	3	19	17
	70-74 ans	53	31	22	9	7	22	15
	50-74 ans	224	128	96	56	30	72	66
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	33	21	12	18	8	3	4
	55-59 ans	41	18	23	5	6	13	17
	60-64 ans	36	21	15	8	4	13	11
	65-69 ans	47	27	20	11	3	16	17
	70-74 ans	52	30	22	9	7	21	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	209	117	92	51	28	66	64
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	11	6	5	3	1	3	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	32	20	12	17	8	3	4
	55-59 ans	39	17	22	5	6	12	16
	60-64 ans	34	21	13	8	3	13	10
	65-69 ans	44	26	18	10	2	16	16
	70-74 ans	48	27	21	8	7	19	14
	50-74 ans	197	111	86	48	26	63	60
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	23	14	9	11	6	3	3
	55-59 ans	23	12	11	3	2	9	9
	60-64 ans	27	17	10	7	3	10	7
	65-69 ans	29	15	14	6	1	9	13
	70-74 ans	38	19	19	6	7	13	12
	50-74 ans	140	77	63	33	19	44	44
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	6	3	6	2	0	1
	55-59 ans	16	5	11	2	4	3	7
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	15	11	4	4	1	7	3
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	50-74 ans	57	34	23	15	7	19	16
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	12	7	5	1	2	6	3
	60-64 ans	12	9	3	4	0	5	3
	65-69 ans	7	2	5	1	1	1	4
	70-74 ans	14	5	9	1	3	4	6
	50-74 ans	55	30	25	12	8	18	17
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	8	4	4	2	0	2	4
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	34	21	13	9	1	12	12
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	9	4	5	3	3	1	2
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	11	5	6	2	3	3	3
	50-74 ans	40	20	20	9	8	11	12
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	11	6	5	3	2	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	33	21	12	18	8	3	4
	55-59 ans	40	18	22	5	6	13	16
	60-64 ans	34	21	13	8	3	13	10
	65-69 ans	43	25	18	10	2	15	16
	70-74 ans	48	27	21	7	7	20	14
	50-74 ans	198	112	86	48	26	64	60
A40- Perdus de vue	50-54 ans	78	48	30	42	27	6	3
	55-59 ans	70	39	31	22	16	17	15
	60-64 ans	59	28	31	16	13	12	18
	65-69 ans	53	34	19	12	7	22	12
	70-74 ans	50	27	23	14	13	13	10
	50-74 ans	310	176	134	106	76	70	58

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,5	5,9	7,0	6,2	5,0	4,7
	55-59 ans	6,8	6,7	6,8	7,5	7,8	6,3	6,3
	60-64 ans	6,3	6,2	6,4	7,0	7,8	5,8	5,7
	65-69 ans	5,9	5,9	5,9	6,4	6,7	5,7	5,7
	70-74 ans	7,3	7,2	7,3	8,3	8,8	6,9	6,8
	50-74 ans	6,4	6,5	6,4	7,1	7,0	6,0	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8	0,6	0,8
	55-59 ans	1,6	1,3	1,8	2,1	2,7	0,9	1,3
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	2,3	2,2	0,8	0,9
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	1,8	2,4	0,8	0,8
	70-74 ans	2,1	2,1	2,2	3,9	3,1	1,5	1,9
	50-74 ans	1,5	1,4	1,6	2,0	2,2	0,9	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,0	77,9	74,1	75,6	71,9	88,2	82,8
	55-59 ans	77,0	80,6	74,1	71,5	64,9	86,4	79,9
	60-64 ans	80,2	80,5	80,0	68,0	72,0	86,9	84,6
	65-69 ans	81,0	81,8	80,4	72,0	63,7	85,6	86,5
	70-74 ans	70,6	71,3	70,0	52,3	64,7	77,8	72,0
	50-74 ans	77,0	78,7	75,6	72,0	69,0	84,9	81,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,0	3,7	3,1	3,4	2,8
	55-59 ans	3,9	4,8	3,2	5,9	3,7	4,2	3,0
	60-64 ans	4,2	5,1	3,6	5,9	4,4	4,8	3,2
	65-69 ans	5,1	6,4	4,2	6,5	4,7	6,3	4,0
	70-74 ans	5,3	6,4	4,5	7,4	5,0	6,2	4,3
	50-74 ans	4,2	4,9	3,6	4,8	3,7	5,0	3,5
50-74 ans **	4,3	5,0	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,1	98,8	98,8	98,4	100,0	100,0
	55-59 ans	99,0	98,8	99,2	97,8	100,0	99,6	98,7
	60-64 ans	98,7	99,2	98,3	100,0	99,2	98,7	97,8
	65-69 ans	99,1	98,6	99,7	98,1	100,0	98,7	99,6
	70-74 ans	99,0	98,7	99,3	98,7	100,0	98,7	99,1
	50-74 ans	99,0	98,9	99,1	98,7	99,2	99,0	99,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 92 - Hauts-de-Seine

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,6	85,9	87,3	84,0	85,6	92,4	92,7
	55-59 ans	85,9	85,8	86,1	79,6	81,9	90,3	88,7
	60-64 ans	86,4	86,3	86,6	79,7	85,8	89,7	87,0
	65-69 ans	88,2	87,2	89,3	81,0	86,0	89,4	90,5
	70-74 ans	85,9	85,0	86,8	70,7	80,0	89,8	89,0
	50-74 ans	86,7	86,1	87,2	80,8	84,5	90,0	89,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	96,6	97,2	97,6	97,4	93,8	96,6
	55-59 ans	96,5	96,7	96,1	96,5	98,2	96,9	94,9
	60-64 ans	95,7	95,5	96,0	96,9	97,2	94,8	95,4
	65-69 ans	95,4	94,2	96,7	95,3	98,8	93,9	96,0
	70-74 ans	93,8	93,4	94,3	90,6	91,7	94,1	95,1
	50-74 ans	95,8	95,4	96,2	96,4	97,2	94,8	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	4	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	99	109	103	108	88	113
	55-59 ans	100	95	106	101	115	92	100
	60-64 ans	92	94	90	96	99	93	85
	65-69 ans	94	94	95	99	99	93	93
	70-74 ans	97	100	93	108	110	98	88
	50-74 ans	98	96	99	101	107	93	94
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (44-112)	68 (45-107)	67 (41-116)	71,5 (48-116)	69,5 (41,5-120,5)	60 (42-96)	60 (41-93)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	65 (46-104)	64 (45,5-100,5)	68 (46-111)	63 (45-103,5)	71 (48-125)	64 (45,5-98)	63 (45-103,5)
	60-64 ans	66 (43-107)	68 (45-109,5)	63 (42-103)	75 (46-118)	66 (43-104)	67 (42-106)	62 (42-99)
	65-69 ans	66 (43-104)	64 (43-106)	67 (43-101)	71 (44-107)	68 (44-111)	63 (43-104)	65 (43-98)
	70-74 ans	68 (43-108)	71 (43-117)	67,5 (43-100)	60 (35,5-115,5)	66 (45-104)	73 (47-117)	68 (43-100)
	50-74 ans	67 (44-107)	67 (45-108)	66 (43-105)	68 (45-112)	68 (44-115,5)	66 (44-105)	64 (43-100)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,0	10,6	7,2	12,1	8,5	5,7	3,1
	55-59 ans	8,8	9,0	8,6	11,9	11,6	6,8	6,7
	60-64 ans	8,2	7,8	8,7	13,0	10,2	5,1	7,9
	65-69 ans	6,6	8,1	5,1	11,2	7,0	7,0	4,3
	70-74 ans	8,2	8,9	7,5	18,4	17,3	5,7	4,3
	50-74 ans	8,2	8,9	7,4	12,6	10,0	6,2	5,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,7	99,4	99,7	100,0	100,0	97,8
	55-59 ans	99,6	99,5	99,7	99,3	99,1	99,6	100,0
	60-64 ans	99,5	99,7	99,3	99,0	99,1	100,0	99,5
	65-69 ans	99,4	99,7	99,1	100,0	98,8	99,6	99,2
	70-74 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	50-74 ans	99,6	99,7	99,4	99,6	99,5	99,8	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,0	37,5	57,2	36,6	56,5	40,2	59,3
	55-59 ans	36,1	30,6	42,6	34,5	38,1	28,1	45,2
	60-64 ans	33,2	25,4	41,1	28,3	40,0	24,1	41,8
	65-69 ans	31,9	24,3	40,2	20,7	47,7	25,4	37,7
	70-74 ans	34,3	26,6	41,8	31,5	31,7	25,4	44,7
	50-74 ans	36,8	29,2	45,0	32,4	46,9	27,1	43,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	6,7	5,0	7,2	5,2	5,2	4,4
	55-59 ans	5,0	4,9	5,2	4,1	4,4	5,4	5,6
	60-64 ans	5,2	5,1	5,3	6,1	1,8	4,7	7,2
	65-69 ans	4,3	3,8	4,7	5,7	1,2	3,2	6,0
	70-74 ans	3,8	1,9	5,6	1,9	5,0	2,0	5,8
	50-74 ans	4,9	4,7	5,1	5,8	3,9	3,9	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	0,7	0,4	1,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,9	0,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	0,8
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,7	15,5	9,7	13,4	10,0	21,6	8,8
	55-59 ans	14,9	15,2	14,5	14,5	15,9	15,6	13,7
	60-64 ans	17,1	18,3	15,8	18,2	12,7	18,4	17,5
	65-69 ans	15,9	16,9	14,8	10,3	14,0	18,9	15,1
	70-74 ans	16,9	20,8	13,1	16,7	25,0	22,0	9,6
	50-74 ans	15,3	17,1	13,5	14,2	13,5	19,0	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,9	32,0	21,4	34,1	22,7	25,8	17,6
	55-59 ans	35,5	42,3	27,4	42,8	32,7	42,0	24,4
	60-64 ans	35,3	40,8	29,6	30,3	38,2	45,8	24,7
	65-69 ans	37,4	43,3	31,1	44,8	27,9	42,9	32,1
	70-74 ans	32,4	37,5	27,6	31,5	25,0	39,0	28,4
	50-74 ans	33,4	39,2	27,3	36,6	28,1	40,9	26,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	5,2	3,3	5,9	3,0	3,1	4,4
	55-59 ans	6,3	5,1	7,7	3,4	5,3	6,3	9,1
	60-64 ans	6,8	7,7	5,9	10,1	5,5	6,6	6,2
	65-69 ans	7,5	9,0	5,9	16,1	3,5	6,8	6,7
	70-74 ans	10,1	12,0	8,2	16,7	11,7	10,7	7,2
	50-74 ans	6,8	7,5	6,1	8,1	4,7	7,1	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	1,0	0,7	3,1	3,3
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,3	1,6	1,0	4,0	0,9	0,5	1,0
	65-69 ans	1,0	1,6	0,3	2,3	1,2	1,4	0,0
	70-74 ans	1,1	0,4	1,9	1,9	1,7	0,0	1,9
	50-74 ans	1,0	1,1	0,9	1,5	0,9	0,8	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,3	0,8	0,3	0,4	0,0	2,2
	55-59 ans	0,6	0,8	0,3	0,7	0,0	0,9	0,5
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	1,0	0,9	0,0	0,5
	65-69 ans	0,6	0,3	0,9	0,0	1,2	0,4	0,8
	70-74 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,7	0,4	0,5	0,3	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	14,7	8,2	14,5	8,6	15,4	7,0
	55-59 ans	16,8	23,3	11,6	26,6	14,7	21,6	10,0
	60-64 ans	18,9	26,0	13,9	23,1	19,4	27,3	11,6
	65-69 ans	24,1	33,5	17,2	29,2	16,9	34,9	17,2
	70-74 ans	22,5	31,9	16,0	25,4	20,0	33,7	14,9
	50-74 ans	17,6	23,8	12,7	19,7	12,9	26,9	12,6
	50-74 ans **	18,3	24,4	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	9,9	5,6	10,4	5,9	8,2	4,7
	55-59 ans	11,9	17,1	7,6	19,8	9,9	15,7	6,4
	60-64 ans	12,7	18,0	9,0	14,4	14,5	19,5	6,8
	65-69 ans	16,9	24,1	11,6	23,8	11,3	24,2	11,7
	70-74 ans	14,8	20,5	10,9	16,6	10,0	21,6	11,1
	50-74 ans	12,0	16,6	8,5	14,2	8,7	18,3	8,4
	50-74 ans **	12,6	17,0	8,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,4	4,5	8,6	4,5	7,5	4,4
	55-59 ans	10,0	14,8	6,1	17,6	8,3	13,4	5,0
	60-64 ans	10,3	14,1	7,6	12,0	12,4	15,0	5,7
	65-69 ans	14,5	20,9	9,9	21,3	10,3	20,8	9,7
	70-74 ans	12,4	17,3	8,9	13,7	8,0	18,3	9,2
	50-74 ans	10,1	14,0	7,0	12,1	7,1	15,4	6,9
	50-74 ans **	10,5	14,3	7,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,5	4,7	9,5	4,7	9,5	5,0
	55-59 ans	11,1	16,0	7,0	18,2	9,3	14,9	5,9
	60-64 ans	12,2	16,7	8,9	15,4	14,2	17,2	6,8
	65-69 ans	17,1	25,3	11,2	24,4	12,2	25,7	10,9
	70-74 ans	15,0	21,1	10,7	17,6	11,3	22,1	10,5
	50-74 ans	11,6	16,2	8,0	13,6	8,1	18,2	8,0
	50-74 ans **	12,1	16,6	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	0,9	1,9	0,8	1,0	1,2
	55-59 ans	2,1	2,1	2,1	1,6	1,6	2,3	2,4
	60-64 ans	2,5	3,4	1,8	4,8	2,1	2,8	1,7
	65-69 ans	3,4	5,0	2,2	8,5	1,4	3,8	2,5
	70-74 ans	4,6	6,6	3,2	8,8	4,7	5,9	2,8
	50-74 ans	2,5	3,2	1,9	3,2	1,5	3,2	2,2
	50-74 ans **	2,6	3,3	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	3,0	4,8	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,9	5,6	4,3	0,0	0,0	7,7	5,9
	60-64 ans	5,6	0,0	13,3	0,0	25,0	0,0	9,1
	65-69 ans	4,3	3,7	5,0	9,1	0,0	0,0	5,9
	70-74 ans	7,7	10,0	4,5	11,1	0,0	9,5	6,7
	50-74 ans	5,3	5,1	5,4	5,9	3,6	4,5	6,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)