

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017
27/02/2020 - Santé publique France

1/8

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017, pour 99 départements

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39 638	22 312	17 326	16 055	12 104	6 257	5 222
	55-59 ans	37 993	21 778	16 215	6 262	4 185	15 516	12 030
	60-64 ans	45 168	26 036	19 132	6 380	4 038	19 656	15 094
	65-69 ans	52 244	30 443	21 801	6 068	3 633	24 375	18 168
	70-74 ans	40 200	23 024	17 176	3 439	2 322	19 585	14 854
	50-74 ans	215 243	123 593	91 650	38 204	26 282	85 389	65 368
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40 237	22 607	17 630	16 284	12 327	6 323	5 303
	55-59 ans	38 547	22 049	16 498	6 346	4 279	15 703	12 219
	60-64 ans	45 886	26 398	19 488	6 470	4 132	19 928	15 356
	65-69 ans	53 210	30 948	22 262	6 182	3 716	24 766	18 546
	70-74 ans	41 178	23 556	17 622	3 525	2 379	20 031	15 243
	50-74 ans	219 058	125 558	93 500	38 807	26 833	86 751	66 667
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	16 131	7 406	8 725	5 264	6 047	2 142	2 678
	55-59 ans	13 248	5 972	7 276	1 566	1 793	4 406	5 483
	60-64 ans	13 815	6 011	7 804	1 372	1 522	4 639	6 282
	65-69 ans	15 295	6 763	8 532	1 279	1 369	5 484	7 163
	70-74 ans	11 860	5 460	6 400	789	830	4 671	5 570
	50-74 ans	70 349	31 612	38 737	10 270	11 561	21 342	27 176
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2 181	1 225	956	869	677	356	279
	55-59 ans	1 809	997	812	270	190	727	622
	60-64 ans	1 970	1 093	877	248	183	845	694
	65-69 ans	1 993	1 107	886	209	139	898	747
	70-74 ans	1 417	776	641	102	87	674	554
	50-74 ans	9 370	5 198	4 172	1 698	1 276	3 500	2 896
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	193	132	61	97	45	35	16
	55-59 ans	186	123	63	36	19	87	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

27/02/2020 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	185	114	71	39	14	75	57
	65-69 ans	171	100	71	22	8	78	63
	70-74 ans	128	74	54	12	6	62	48
	50-74 ans	863	543	320	206	92	337	228
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6 158	3 898	2 260	2 760	1 568	1 138	692
	55-59 ans	6 622	4 202	2 420	1 182	605	3 020	1 815
	60-64 ans	8 376	5 255	3 121	1 193	617	4 062	2 504
	65-69 ans	10 290	6 476	3 814	1 188	584	5 288	3 230
	70-74 ans	8 059	4 988	3 071	652	407	4 336	2 664
	50-74 ans	39 505	24 819	14 686	6 975	3 781	17 844	10 905
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	10 951	7 248	3 703	5 272	2 635	1 976	1 068
	55-59 ans	11 679	7 790	3 889	2 333	1 063	5 457	2 826
	60-64 ans	15 006	10 017	4 989	2 499	1 168	7 518	3 821
	65-69 ans	17 276	11 381	5 895	2 255	995	9 126	4 900
	70-74 ans	12 987	8 199	4 788	1 182	621	7 017	4 167
	50-74 ans	67 899	44 635	23 264	13 541	6 482	31 094	16 782
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2 015	1 196	819	893	588	303	231
	55-59 ans	2 479	1 518	961	533	304	985	657
	60-64 ans	3 669	2 279	1 390	705	360	1 574	1 030
	65-69 ans	4 830	3 158	1 672	821	359	2 337	1 313
	70-74 ans	4 068	2 538	1 530	548	267	1 990	1 263
	50-74 ans	17 061	10 689	6 372	3 500	1 878	7 189	4 494
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	428	238	190	167	124	71	66
	55-59 ans	336	190	146	52	37	138	109
	60-64 ans	368	220	148	55	27	165	121
	65-69 ans	450	251	199	49	29	202	170

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

27/02/2020 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	316	167	149	25	15	142	134
	50-74 ans	1 898	1 066	832	348	232	718	600
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1 725	1 017	708	767	486	250	222
	55-59 ans	1 771	1 045	726	308	198	737	528
	60-64 ans	2 035	1 177	858	298	186	879	672
	65-69 ans	2 360	1 421	939	299	178	1 122	761
	70-74 ans	1 868	1 085	783	173	118	912	665
	50-74 ans	9 759	5 745	4 014	1 845	1 166	3 900	2 848
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	455	247	208	195	157	52	51
	55-59 ans	415	212	203	66	70	146	133
	60-64 ans	460	232	228	61	55	171	173
	65-69 ans	544	290	254	59	55	231	199
	70-74 ans	474	269	205	42	28	227	177
	50-74 ans	2 348	1 250	1 098	423	365	827	733
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17 163	11 184	5 979	8 062	4 216	3 122	1 763
	55-59 ans	18 369	12 037	6 332	3 529	1 674	8 508	4 658
	60-64 ans	23 470	15 327	8 143	3 703	1 793	11 624	6 350
	65-69 ans	27 671	17 927	9 744	3 465	1 592	14 462	8 152
	70-74 ans	21 128	13 235	7 893	1 845	1 038	11 390	6 855
	50-74 ans	107 801	69 710	38 091	20 604	10 313	49 106	27 778
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10 951	7 248	3 703	5 272	2 635	1 976	1 068
	55-59 ans	11 680	7 790	3 890	2 333	1 064	5 457	2 826
	60-64 ans	15 007	10 017	4 990	2 499	1 168	7 518	3 822
	65-69 ans	17 277	11 381	5 896	2 255	995	9 126	4 901
	70-74 ans	12 987	8 199	4 788	1 182	621	7 017	4 167
	50-74 ans	67 902	44 635	23 267	13 541	6 483	31 094	16 784
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9 098	6 050	3 048	4 407	2 188	1 643	860

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

27/02/2020 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9 500	6 345	3 155	1 950	880	4 395	2 275
	60-64 ans	12 145	8 134	4 011	2 071	963	6 063	3 048
	65-69 ans	13 819	9 166	4 653	1 850	801	7 316	3 852
	70-74 ans	10 101	6 396	3 705	930	485	5 466	3 220
	50-74 ans	54 663	36 091	18 572	11 208	5 317	24 883	13 255
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10 437	7 019	3 418	5 097	2 449	1 922	969
	55-59 ans	11 311	7 705	3 606	2 331	994	5 374	2 612
	60-64 ans	14 756	10 039	4 717	2 544	1 108	7 495	3 609
	65-69 ans	17 250	11 622	5 628	2 300	961	9 322	4 667
	70-74 ans	12 962	8 393	4 569	1 198	606	7 195	3 963
	50-74 ans	66 716	44 778	21 938	13 470	6 118	31 308	15 820
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2 020	1 198	822	895	590	303	232
	55-59 ans	2 485	1 520	965	533	307	987	658
	60-64 ans	3 672	2 282	1 390	708	360	1 574	1 030
	65-69 ans	4 841	3 164	1 677	823	359	2 341	1 318
	70-74 ans	4 082	2 545	1 537	550	269	1 995	1 268
	50-74 ans	17 100	10 709	6 391	3 509	1 885	7 200	4 506

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017, pour 99 départements

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,9	98,7	98,8	98,6	99,2	98,9
	55-59 ans	99,0	99,1	98,8	99,1	98,4	99,1	98,9
	60-64 ans	98,8	99,0	98,6	99,0	98,2	99,0	98,7
	65-69 ans	98,9	99,0	98,6	99,0	98,3	99,1	98,7
	70-74 ans	98,6	98,7	98,5	98,9	98,7	98,7	98,5
	50-74 ans	98,8	99,0	98,6	98,9	98,5	99,0	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,1	32,8	49,5	32,3	49,1	33,9	50,5
	55-59 ans	34,4	27,1	44,1	24,7	41,9	28,1	44,9
	60-64 ans	30,1	22,8	40,0	21,2	36,8	23,3	40,9
	65-69 ans	28,7	21,9	38,3	20,7	36,8	22,1	38,6
	70-74 ans	28,8	23,2	36,3	22,4	34,9	23,3	36,5
	50-74 ans	32,1	25,2	41,4	26,5	43,1	24,6	40,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	5,4	5,4	5,3	5,5	5,6	5,3
	55-59 ans	4,7	4,5	4,9	4,3	4,4	4,6	5,1
	60-64 ans	4,3	4,1	4,5	3,8	4,4	4,2	4,5
	65-69 ans	3,7	3,6	4,0	3,4	3,7	3,6	4,0
	70-74 ans	3,4	3,3	3,6	2,9	3,7	3,4	3,6
	50-74 ans	4,3	4,1	4,5	4,4	4,8	4,0	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,6	0,4	0,6	0,3
	55-59 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,3	17,2	12,8	16,9	12,7	18,0	13,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

27/02/2020 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,2	19,1	14,7	18,6	14,1	19,2	14,9
	60-64 ans	18,3	19,9	16,0	18,4	14,9	20,4	16,3
	65-69 ans	19,3	20,9	17,1	19,2	15,7	21,4	17,4
	70-74 ans	19,6	21,2	17,4	18,5	17,1	21,6	17,5
	50-74 ans	18,0	19,8	15,7	18,0	14,1	20,6	16,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27,2	32,1	21,0	32,4	21,4	31,3	20,1
	55-59 ans	30,3	35,3	23,6	36,8	24,8	34,8	23,1
	60-64 ans	32,7	37,9	25,6	38,6	28,3	37,7	24,9
	65-69 ans	32,5	36,8	26,5	36,5	26,8	36,8	26,4
	70-74 ans	31,5	34,8	27,2	33,5	26,1	35,0	27,3
	50-74 ans	31,0	35,5	24,9	34,9	24,2	35,8	25,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	5,3	4,6	5,5	4,8	4,8	4,4
	55-59 ans	6,4	6,9	5,8	8,4	7,1	6,3	5,4
	60-64 ans	8,0	8,6	7,1	10,9	8,7	7,9	6,7
	65-69 ans	9,1	10,2	7,5	13,3	9,7	9,4	7,1
	70-74 ans	9,9	10,8	8,7	15,5	11,2	9,9	8,3
	50-74 ans	7,8	8,5	6,8	9,0	7,0	8,3	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2
	55-59 ans	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9
	70-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,9
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,3	4,5	4,0	4,7	3,9	4,0	4,2
	55-59 ans	4,6	4,7	4,4	4,9	4,6	4,7	4,3
	60-64 ans	4,4	4,5	4,4	4,6	4,5	4,4	4,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

27/02/2020 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,4	4,6	4,2	4,8	4,8	4,5	4,1
	70-74 ans	4,5	4,6	4,4	4,9	5,0	4,6	4,4
	50-74 ans	4,5	4,6	4,3	4,8	4,3	4,5	4,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	0,8	1,0
	55-59 ans	1,1	1,0	1,2	1,0	1,6	0,9	1,1
	60-64 ans	1,0	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9	1,1
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	1,0	1,5	0,9	1,1
	70-74 ans	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
	50-74 ans	1,1	1,0	1,2	1,1	1,4	1,0	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	17,9	8,7	18,1	9,0	17,3	8,2
	55-59 ans	16,6	23,8	10,6	27,7	12,2	22,4	10,1
	60-64 ans	20,6	30,0	13,0	34,1	15,6	28,9	12,4
	65-69 ans	24,0	34,4	15,4	39,5	17,6	33,4	15,0
	70-74 ans	26,9	37,2	18,4	39,1	21,0	37,0	18,1
	50-74 ans	19,6	27,7	12,8	25,3	12,0	28,8	13,2
	50-74 ans **	19,5	27,0	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,6	5,4	11,9	5,6	10,9	5,0
	55-59 ans	10,6	15,4	6,5	18,3	7,8	14,4	6,1
	60-64 ans	13,2	19,6	8,0	23,0	10,2	18,7	7,5
	65-69 ans	15,0	21,9	9,3	25,7	11,0	21,1	9,0
	70-74 ans	16,6	23,1	11,2	25,0	12,5	22,8	11,0
	50-74 ans	12,4	17,7	7,8	16,6	7,5	18,3	8,0
	50-74 ans **	12,3	17,3	7,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,7	4,5	9,9	4,7	9,1	4,0
	55-59 ans	8,6	12,5	5,3	15,3	6,4	11,6	4,9
	60-64 ans	10,7	15,9	6,4	19,1	8,4	15,1	5,9
	65-69 ans	12,0	17,6	7,3	21,1	8,9	16,9	7,1
	70-74 ans	12,9	18,0	8,6	19,7	9,8	17,7	8,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

27/02/2020 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	10,0	14,3	6,2	13,7	6,2	14,6	6,3
	50-74 ans **	9,9	14,0	6,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,2	5,0	11,5	5,2	10,6	4,5
	55-59 ans	10,2	15,2	6,0	18,3	7,2	14,2	5,7
	60-64 ans	13,0	19,7	7,5	23,4	9,7	18,7	7,0
	65-69 ans	14,9	22,3	8,9	26,2	10,6	21,5	8,6
	70-74 ans	16,5	23,6	10,7	25,4	12,2	23,3	10,4
	50-74 ans	12,2	17,8	7,4	16,5	7,1	18,4	7,5
	50-74 ans **	12,1	17,3	7,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,9	1,2	2,0	1,3	1,7	1,1
	55-59 ans	2,2	3,0	1,6	4,2	2,2	2,6	1,4
	60-64 ans	3,2	4,5	2,2	6,5	3,1	3,9	2,0
	65-69 ans	4,2	6,1	2,6	9,4	4,0	5,4	2,4
	70-74 ans	5,2	7,2	3,6	11,6	5,4	6,5	3,3
	50-74 ans	3,1	4,3	2,1	4,3	2,2	4,2	2,1
	50-74 ans **	3,0	4,1	2,1	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)