

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**  
28/02/2020 - Santé publique France

1/4

**Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017, pour 44 départements<sup>†</sup>**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	1 014	594	420	434	293	160	127
	55-59 ans	1 109	680	429	234	116	446	313
	60-64 ans	1 746	1 102	644	320	166	782	478
	65-69 ans	2 283	1 494	789	365	157	1 129	632
	70-74 ans	1 828	1 160	668	237	118	923	550
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 980</b>	<b>5 030</b>	<b>2 950</b>	<b>1 590</b>	<b>850</b>	<b>3 440</b>	<b>2 100</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	93	53	40	43	26	10	14
	55-59 ans	112	74	38	29	9	45	29
	60-64 ans	178	115	63	42	14	73	49
	65-69 ans	233	163	70	39	22	124	48
	70-74 ans	205	131	74	27	13	104	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>821</b>	<b>536</b>	<b>285</b>	<b>180</b>	<b>84</b>	<b>356</b>	<b>201</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	921	541	380	391	267	150	113
	55-59 ans	997	606	391	205	107	401	284
	60-64 ans	1 568	987	581	278	152	709	429
	65-69 ans	2 050	1 331	719	326	135	1 005	584
	70-74 ans	1 623	1 029	594	210	105	819	489
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 159</b>	<b>4 494</b>	<b>2 665</b>	<b>1 410</b>	<b>766</b>	<b>3 084</b>	<b>1 899</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	595	342	253	246	178	96	75
	55-59 ans	621	379	242	134	58	245	184
	60-64 ans	1 047	647	400	193	115	454	285
	65-69 ans	1 410	885	525	217	101	668	424
	70-74 ans	1 171	715	456	158	84	557	372
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 844</b>	<b>2 968</b>	<b>1 876</b>	<b>948</b>	<b>536</b>	<b>2 020</b>	<b>1 340</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	326	199	127	145	89	54	38
	55-59 ans	376	227	149	71	49	156	100
	60-64 ans	521	340	181	85	37	255	144
	65-69 ans	640	446	194	109	34	337	160
	70-74 ans	452	314	138	52	21	262	117

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**  
28/02/2020 - Santé publique France

2/4

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 315</b>	<b>1 526</b>	<b>789</b>	<b>462</b>	<b>230</b>	<b>1 064</b>	<b>559</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	282	174	108	124	70	50	38
	55-59 ans	293	180	113	58	29	122	84
	60-64 ans	491	314	177	89	45	225	132
	65-69 ans	650	435	215	98	38	337	177
	70-74 ans	496	322	174	56	29	266	145
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 212</b>	<b>1 425</b>	<b>787</b>	<b>425</b>	<b>211</b>	<b>1 000</b>	<b>576</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	114	66	48	49	36	17	12
	55-59 ans	134	83	51	29	10	54	41
	60-64 ans	230	129	101	42	35	87	66
	65-69 ans	299	183	116	50	26	133	90
	70-74 ans	328	187	141	51	23	136	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 105</b>	<b>648</b>	<b>457</b>	<b>221</b>	<b>130</b>	<b>427</b>	<b>327</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	147	78	69	53	51	25	18
	55-59 ans	153	92	61	35	13	57	48
	60-64 ans	240	144	96	38	28	106	68
	65-69 ans	324	194	130	46	21	148	109
	70-74 ans	251	141	110	33	23	108	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 115</b>	<b>649</b>	<b>466</b>	<b>205</b>	<b>136</b>	<b>444</b>	<b>330</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	52	24	28	20	21	4	7
	55-59 ans	41	24	17	12	6	12	11
	60-64 ans	86	60	26	24	7	36	19
	65-69 ans	137	73	64	23	16	50	48
	70-74 ans	96	65	31	18	9	47	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>412</b>	<b>246</b>	<b>166</b>	<b>97</b>	<b>59</b>	<b>149</b>	<b>107</b>

<sup>‡</sup> Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**  
28/02/2020 - Santé publique France

3/4

**Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017, pour 44 départements<sup>†</sup>**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	9,2	8,9	9,5	9,9	8,9	6,3	11,0
	55-59 ans	10,1	10,9	8,9	12,4	7,8	10,1	9,3
	60-64 ans	10,2	10,4	9,8	13,1	8,4	9,3	10,3
	65-69 ans	10,2	10,9	8,9	10,7	14,0	11,0	7,6
	70-74 ans	11,2	11,3	11,1	11,4	11,0	11,3	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>	<b>9,7</b>	<b>11,3</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>	<b>9,6</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	35,4	36,8	33,4	37,1	33,3	36,0	33,6
	55-59 ans	37,7	37,5	38,1	34,6	45,8	38,9	35,2
	60-64 ans	33,2	34,4	31,2	30,6	24,3	36,0	33,6
	65-69 ans	31,2	33,5	27,0	33,4	25,2	33,5	27,4
	70-74 ans	27,8	30,5	23,2	24,8	20,0	32,0	23,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,3</b>	<b>34,0</b>	<b>29,6</b>	<b>32,8</b>	<b>30,0</b>	<b>34,5</b>	<b>29,4</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	64,6	63,2	66,6	62,9	66,7	64,0	66,4
	55-59 ans	62,3	62,5	61,9	65,4	54,2	61,1	64,8
	60-64 ans	66,8	65,6	68,8	69,4	75,7	64,0	66,4
	65-69 ans	68,8	66,5	73,0	66,6	74,8	66,5	72,6
	70-74 ans	72,2	69,5	76,8	75,2	80,0	68,0	76,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,7</b>	<b>66,0</b>	<b>70,4</b>	<b>67,2</b>	<b>70,0</b>	<b>65,5</b>	<b>70,6</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	47,4	50,9	42,7	50,4	39,3	52,1	50,7
	55-59 ans	47,2	47,5	46,7	43,3	50,0	49,8	45,7
	60-64 ans	46,9	48,5	44,3	46,1	39,1	49,6	46,3
	65-69 ans	46,1	49,2	41,0	45,2	37,6	50,4	41,7
	70-74 ans	42,4	45,0	38,2	35,4	34,5	47,8	39,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,7</b>	<b>48,0</b>	<b>42,0</b>	<b>44,8</b>	<b>39,4</b>	<b>49,5</b>	<b>43,0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

28/02/2020 - Santé publique France

4/4

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	19,2	19,3	19,0	19,9	20,2	17,7	16,0
	55-59 ans	21,6	21,9	21,1	21,6	17,2	22,0	22,3
	60-64 ans	22,0	19,9	25,3	21,8	30,4	19,2	23,2
	65-69 ans	21,2	20,7	22,1	23,0	25,7	19,9	21,2
	70-74 ans	28,0	26,2	30,9	32,3	27,4	24,4	31,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,8</b>	<b>21,8</b>	<b>24,4</b>	<b>23,3</b>	<b>24,3</b>	<b>21,1</b>	<b>24,4</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	24,7	22,8	27,3	21,5	28,7	26,0	24,0
	55-59 ans	24,6	24,3	25,2	26,1	22,4	23,3	26,1
	60-64 ans	22,9	22,3	24,0	19,7	24,3	23,3	23,9
	65-69 ans	23,0	21,9	24,8	21,2	20,8	22,2	25,7
	70-74 ans	21,4	19,7	24,1	20,9	27,4	19,4	23,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,0</b>	<b>21,9</b>	<b>24,8</b>	<b>21,6</b>	<b>25,4</b>	<b>22,0</b>	<b>24,6</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,7	7,0	11,1	8,1	11,8	4,2	9,3
	55-59 ans	6,6	6,3	7,0	9,0	10,3	4,9	6,0
	60-64 ans	8,2	9,3	6,5	12,4	6,1	7,9	6,7
	65-69 ans	9,7	8,2	12,2	10,6	15,8	7,5	11,3
	70-74 ans	8,2	9,1	6,8	11,4	10,7	8,4	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,0</b>

‡ Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire