

Tableau 7c : Principaux indicateurs standardisés* d'évaluation du programme national de dépistage organisé du cancer colorectal pour la période 2016-2017, par région et par département tous sexes

| | Taux de tests positifs (%) | Taux de tests non analysables non refaits [§] (%) | Pourcentage de personnes perdues de vue parmi les personnes ayant eu un test positif (%) [†] | Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%) | Taux d'adénomes avancés pour 1 000 personnes dépistées [€] | VPP du programme pour les adénomes avancés (%) [€] | Taux de cancers colorectaux pour 1 000 personnes dépistées | VPP du programme pour les cancers colorectaux (%) |
|--------------------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,2 | 1,5 | 3,4 | 92,5 | 12,6 | 31,1 | 3,5 | 8,6 |
| . Ain | 4,1 | 1,2 | 10,8 | 88,1 | 11,0 | 28,2 | 3,5 | 8,8 |
| . Allier | 4,6 | 1,9 | 1,5 | 93,8 | 15,0 | 32,3 | 2,6 | 5,6 |
| . Ardèche | 4,0 | 1,6 | 3,4 | 95,3 | 12,6 | 31,4 | 3,8 | 8,9 |
| . Cantal | 4,8 | 1,4 | 4,1 | 92,8 | 14,8 | 31,7 | 2,9 | 6,5 |
| . Drôme | 4,3 | 1,5 | 3,3 | 94,1 | 14,3 | 33,8 | 3,9 | 9,0 |
| . Isère | 4,1 | 1,1 | 1,7 | 93,8 | 13,2 | 32,9 | 3,9 | 9,5 |
| . Loire | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 95,4 | 12,4 | 28,9 | 4,3 | 10,1 |
| . Haute-Loire | 4,4 | 1,5 | 3,9 | 94,0 | 12,6 | 29,5 | 4,8 | 11,5 |
| . Puy-de-Dôme | 4,4 | 1,4 | 4,1 | 93,8 | 13,4 | 31,2 | 3,1 | 7,0 |
| . Rhône | 4,1 | 2,3 | 0,8 | 90,6 | 12,7 | 32,6 | 3,5 | 9,0 |
| . Savoie | 3,9 | 1,1 | 6,2 | 92,0 | 10,8 | 29,0 | 3,2 | 8,0 |
| . Haute-Savoie | 4,0 | 1,2 | 5,4 | 90,4 | 11,0 | 29,2 | 2,9 | 7,5 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4,4 | 1,4 | 9,1 | 86,2 | 10,7 | 27,0 | 2,7 | 6,7 |
| . Côte-d'Or | 4,1 | 2,1 | 5,1 | 90,3 | 11,5 | 30,8 | 2,4 | 6,0 |
| . Doubs | 4,4 | 1,3 | 16,0 | 80,8 | 12,2 | 32,5 | 3,0 | 7,8 |
| . Jura | 4,3 | 1,1 | 23,5 | 73,0 | 9,1 | 27,5 | 2,4 | 7,5 |
| . Nièvre | 5,2 | 2,5 | 2,4 | 92,6 | 14,4 | 28,8 | 3,0 | 5,7 |
| . Haute-Saône | 4,6 | 1,2 | 18,5 | 77,7 | 10,3 | 27,6 | 2,8 | 7,4 |
| . Saône-et-Loire | 4,2 | 1,0 | 4,1 | 92,1 | 7,4 | 18,1 | 2,6 | 6,6 |
| . Yonne | 4,8 | 1,3 | 0,1 | 90,1 | 13,1 | 29,2 | 2,8 | 6,3 |
| . Territoire de Belfort | 4,8 | 1,4 | 15,3 | 81,2 | 12,3 | 29,8 | 3,4 | 7,9 |
| Bretagne | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 92,9 | 12,1 | 29,7 | 3,4 | 8,2 |
| . Côtes-d'Armor | 4,2 | 2,0 | 5,2 | 91,1 | 11,4 | 28,8 | 3,3 | 8,3 |
| . Finistère | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 94,5 | 12,5 | 28,7 | 4,2 | 9,6 |
| . Ille-et-Vilaine | 4,0 | 2,0 | 6,2 | 92,4 | 11,6 | 30,0 | 3,0 | 7,7 |
| . Morbihan | 4,2 | 2,1 | 4,3 | 93,1 | 12,9 | 31,8 | 3,0 | 7,4 |
| Centre-Val de Loire | 4,6 | 1,6 | 7,9 | 89,3 | 12,6 | 29,3 | 2,8 | 6,4 |
| . Cher | 4,6 | 1,8 | 6,3 | 91,8 | 11,4 | 25,9 | 2,9 | 6,4 |
| . Eure-et-Loir | 4,7 | 1,5 | 16,2 | 76,7 | 10,1 | 26,8 | 1,9 | 4,8 |
| . Indre | 5,0 | 1,3 | 2,6 | 90,9 | 14,9 | 30,7 | 3,6 | 8,3 |
| . Indre-et-Loire | 4,2 | 1,7 | 2,8 | 96,2 | 13,6 | 32,1 | 2,8 | 6,3 |
| . Loir-et-Cher | 4,5 | 1,5 | 10,8 | 89,0 | 12,4 | 29,1 | 2,8 | 6,5 |
| . Loiret | 4,7 | 1,7 | 7,7 | 90,4 | 13,2 | 29,7 | 2,9 | 6,8 |
| Corse | 4,7 | 3,7 | 17,8 | 76,3 | 8,2 | 22,2 | 1,9 | 4,6 |
| Grand Est | 4,8 | 1,7 | 4,8 | 91,6 | 14,3 | 30,8 | 3,3 | 7,0 |
| . Ardennes | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 95,3 | 14,2 | 28,8 | 3,4 | 6,8 |
| . Aube | 5,0 | 0,9 | 7,0 | 89,7 | 14,3 | 30,8 | 3,9 | 8,4 |
| . Marne | 4,9 | 0,9 | 10,2 | 88,8 | 14,0 | 30,9 | 3,5 | 7,4 |
| . Haute-Marne | 5,0 | 1,0 | 7,6 | 91,2 | 14,0 | 29,5 | 3,7 | 7,2 |
| . Meurthe-et-Moselle | 4,7 | 1,5 | 3,7 | 91,6 | 13,0 | 28,5 | 3,5 | 7,4 |
| . Meuse | 5,0 | 1,2 | 3,4 | 91,7 | 17,9 | 36,9 | 3,4 | 7,4 |
| . Moselle | 4,9 | 1,6 | 4,7 | 89,1 | 13,4 | 29,8 | 3,0 | 6,5 |
| . Bas-Rhin | 4,7 | 2,6 | 4,2 | 92,4 | 13,5 | 28,9 | 3,0 | 6,3 |
| . Haut-Rhin | 4,8 | 2,6 | 3,7 | 94,0 | 16,8 | 35,4 | 3,6 | 7,4 |
| . Vosges | 4,8 | 1,1 | 2,1 | 93,5 | 15,1 | 32,3 | 3,3 | 7,1 |
| Guadeloupe | 3,7 | 7,8 | 11,8 | 86,3 | 8,4 | 25,4 | 2,0 | 6,2 |

**Participation au programme national de dépistage organisé
du cancer colorectal - Années 2016-2017**

| | Taux de tests positifs (%) | Taux de tests non analysables non refaits [§] (%) | Pourcentage de personnes perdues de vue parmi les personnes ayant eu un test positif (%) [†] | Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%) | Taux d'adénomes avancés pour 1 000 personnes dépistées [€] | VPP du programme pour les adénomes avancés (%) [€] | Taux de cancers colorectaux pour 1 000 personnes dépistées | VPP du programme pour les cancers colorectaux (%) |
|---------------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| Guyane | 3,9 | 15,9 | 25,8 | 52,6 | 5,9 | 29,7 | 0,6 | 2,4 |
| Hauts-de-France | 5,0 | 2,3 | 8,9 | 86,2 | 11,2 | 24,9 | 3,4 | 7,3 |
| . Aisne | 5,1 | 1,7 | 6,1 | 89,7 | 9,9 | 20,8 | 3,2 | 6,8 |
| . Nord | 4,9 | 2,6 | 12,6 | 81,5 | 10,2 | 24,4 | 3,3 | 7,7 |
| . Oise | 4,8 | 2,2 | 3,8 | 90,7 | 11,8 | 25,6 | 2,8 | 5,8 |
| . Pas-de-Calais | 5,1 | 2,2 | 7,6 | 88,2 | 12,8 | 27,2 | 3,7 | 7,5 |
| . Somme | 5,0 | 1,8 | 6,7 | 90,8 | 11,6 | 24,5 | 3,7 | 7,9 |
| Île-de-France | 4,5 | 1,7 | 11,1 | 85,7 | 12,5 | 30,9 | 2,7 | 6,6 |
| . Paris | 4,3 | 1,9 | 18,0 | 73,6 | 8,8 | 26,6 | 2,3 | 6,8 |
| . Seine-et-Marne | 4,7 | 1,5 | 8,4 | 90,5 | 14,1 | 31,3 | 3,3 | 7,3 |
| . Yvelines | 4,1 | 1,6 | 7,9 | 90,5 | 11,8 | 30,7 | 2,6 | 6,4 |
| . Essonne | 4,4 | 1,2 | 4,5 | 90,7 | 14,8 | 35,4 | 2,1 | 5,0 |
| . Hauts-de-Seine | 4,3 | 1,5 | 8,3 | 86,6 | 12,6 | 32,7 | 2,6 | 6,6 |
| . Seine-Saint-Denis | 5,0 | 2,6 | 15,0 | 84,0 | 12,7 | 28,8 | 2,9 | 6,6 |
| . Val-de-Marne | 4,7 | 1,6 | 12,5 | 85,6 | 14,0 | 33,7 | 3,1 | 7,2 |
| . Val-d'Oise | 4,7 | 1,8 | 13,4 | 84,2 | 11,1 | 27,5 | 2,8 | 7,0 |
| La Réunion | 4,3 | 3,2 | 7,4 | 90,3 | 12,4 | 30,9 | 3,1 | 7,5 |
| Martinique | 4,3 | 2,8 | 9,4 | 88,0 | 8,7 | 22,1 | 3,4 | 8,8 |
| Normandie | 4,7 | 1,1 | 6,8 | 89,1 | 11,2 | 25,9 | 3,0 | 6,7 |
| . Calvados | 4,1 | 0,9 | 5,3 | 94,2 | 8,9 | 22,3 | 2,2 | 5,3 |
| . Eure | 5,1 | 0,9 | 4,4 | 92,9 | 14,1 | 28,8 | 3,5 | 7,1 |
| . Manche | 4,6 | 0,8 | 5,0 | 94,3 | 12,8 | 29,0 | 3,8 | 8,3 |
| . Orne | 4,6 | 1,2 | 6,4 | 90,4 | 11,0 | 24,9 | 3,0 | 6,7 |
| . Seine-Maritime | 4,9 | 1,4 | 9,8 | 81,5 | 10,3 | 25,0 | 2,7 | 6,5 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4,5 | 1,4 | 6,1 | 90,3 | 13,9 | 32,7 | 3,0 | 6,9 |
| . Charente | 4,5 | 1,3 | 9,4 | 87,3 | 12,6 | 30,1 | 2,8 | 6,8 |
| . Charente-Maritime | 4,5 | 1,0 | 8,8 | 86,9 | 13,0 | 33,1 | 2,5 | 6,1 |
| . Corrèze | 4,2 | 1,6 | 6,7 | 91,8 | 12,1 | 29,0 | 3,7 | 9,1 |
| . Creuse | 5,0 | 1,6 | 6,8 | 91,9 | 12,5 | 24,5 | 3,6 | 7,9 |
| . Dordogne | 4,5 | 1,6 | 7,0 | 91,3 | 12,5 | 29,2 | 2,8 | 6,3 |
| . Gironde | 4,7 | 1,4 | 1,4 | 93,0 | 16,7 | 37,4 | 3,4 | 7,5 |
| . Landes | 5,0 | 1,6 | 14,8 | 82,7 | 11,7 | 27,3 | 2,3 | 5,0 |
| . Lot-et-Garonne | 4,4 | 1,4 | 7,2 | 91,6 | 14,4 | 33,2 | 3,4 | 8,0 |
| . Pyrénées-Atlantiques | 4,4 | 1,8 | 6,6 | 89,7 | 12,2 | 30,2 | 2,6 | 5,9 |
| . Deux-Sèvres | 4,3 | 1,3 | 4,5 | 94,2 | 15,1 | 35,9 | 2,4 | 5,8 |
| . Vienne | 4,4 | 1,5 | 5,7 | 89,6 | 15,0 | 35,9 | 2,9 | 7,2 |
| . Haute-Vienne | 4,5 | 1,5 | 3,8 | 91,5 | 13,1 | 29,5 | 4,0 | 9,0 |
| Occitanie | 4,5 | 1,6 | 12,9 | 81,8 | 10,7 | 27,8 | 2,9 | 7,4 |
| . Ariège | 4,8 | 2,0 | 8,0 | 89,0 | 14,3 | 30,7 | 3,1 | 7,5 |
| . Aude | 4,8 | 1,6 | 5,5 | 91,3 | 15,7 | 34,5 | 2,8 | 6,1 |
| . Aveyron | 3,7 | 1,5 | 9,5 | 88,1 | 10,0 | 29,8 | 4,1 | 10,9 |
| . Gard | 4,7 | 1,3 | 16,0 | 77,9 | 10,7 | 27,4 | 2,5 | 6,2 |
| . Haute-Garonne | 4,3 | 2,0 | 17,9 | 73,9 | 6,3 | 19,2 | 2,4 | 6,8 |
| . Gers | 4,4 | 1,5 | 1,3 | 96,3 | 13,4 | 32,4 | 3,8 | 9,2 |
| . Hérault | 4,6 | 1,6 | 18,2 | 72,1 | 10,3 | 29,4 | 2,4 | 6,6 |
| . Lot | 4,1 | 1,7 | 3,5 | 95,4 | 14,5 | 34,7 | 4,1 | 10,6 |
| . Lozère | 3,9 | 1,1 | 14,1 | 77,3 | 5,9 | 16,0 | 2,2 | 6,2 |
| . Hautes-Pyrénées | 4,8 | 1,8 | 26,1 | 72,3 | 8,6 | 22,7 | 3,1 | 8,0 |
| . Pyrénées-Orientales | 4,6 | 1,5 | 6,0 | 91,5 | 9,6 | 22,1 | 2,9 | 6,8 |

Participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Années 2016-2017

| | Taux de tests positifs (%) | Taux de tests non analysables non refaits [§] (%) | Pourcentage de personnes perdues de vue parmi les personnes ayant eu un test positif (%) [†] | Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%) | Taux d'adénomes avancés pour 1 000 personnes dépistées [€] | VPP du programme pour les adénomes avancés (%) [€] | Taux de cancers colorectaux pour 1 000 personnes dépistées | VPP du programme pour les cancers colorectaux (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| . <i>Tarn</i> | 4,3 | 1,4 | 9,0 | 88,4 | 14,5 | 35,6 | 3,5 | 8,5 |
| . <i>Tarn-et-Garonne</i> | 4,5 | 1,6 | 11,0 | 85,2 | 13,4 | 33,1 | 3,2 | 7,4 |
| Pays de la Loire | 4,2 | 1,5 | 5,0 | 93,4 | 14,2 | 34,6 | 2,9 | 6,7 |
| . <i>Loire-Atlantique</i> | 4,0 | 1,9 | 4,2 | 93,9 | 13,8 | 34,9 | 2,3 | 5,4 |
| . <i>Maine-et-Loire</i> | 4,2 | 1,2 | 3,8 | 95,3 | 14,1 | 33,2 | 3,4 | 8,0 |
| . <i>Mayenne</i> | 4,1 | 1,2 | 4,1 | 95,0 | 16,4 | 40,3 | 2,7 | 6,3 |
| . <i>Sarthe</i> | 4,2 | 1,5 | 5,9 | 92,1 | 13,6 | 33,4 | 3,1 | 7,7 |
| . <i>Vendée</i> | 4,3 | 1,4 | 7,3 | 90,8 | 14,3 | 34,2 | 3,2 | 7,1 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,5 | 4,1 | 7,7 | 88,1 | 10,8 | 26,5 | 2,7 | 6,5 |
| . <i>Alpes-de-Haute-Provence</i> | 4,4 | 1,8 | 15,2 | 81,5 | 10,7 | 29,0 | 2,2 | 5,0 |
| . <i>Hauts-Alpes</i> | 3,7 | 1,6 | 11,3 | 85,2 | 8,0 | 25,9 | 2,5 | 7,7 |
| . <i>Alpes-Maritimes</i> | 4,2 | 2,0 | 5,2 | 90,3 | 11,9 | 31,3 | 2,3 | 5,9 |
| . <i>Bouches-du-Rhône</i> | 4,7 | 7,4 | 8,0 | 86,4 | 9,3 | 21,6 | 2,6 | 5,8 |
| . <i>Var</i> | 4,4 | 1,6 | 8,9 | 88,1 | 11,5 | 28,4 | 2,7 | 6,8 |
| . <i>Vaucluse</i> | 4,4 | 2,7 | 4,0 | 94,4 | 13,6 | 32,2 | 4,0 | 9,0 |

* standardisation sur la population française 2009 (Projections de population Insee (scénario central) 2007-2042)

§ Personnes qui n'ont retourné que des tests inadéquats durant la période évaluée.

† Une personne est considérée comme perdue de vue lorsque le CRCDC n'arrive à obtenir aucune information sur cette personne 24 mois après la réalisation d'un test positif.

€ Le côlon-rectum a été entièrement exploré.

€ Adénomes de plus de 10 mm ou présentant une dysplasie de haut grade ou à contingent vilieux.

Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC