

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 386	1 566	1 820	1 000	1 110	566	710
	55-59 ans	3 502	1 577	1 925	350	362	1 227	1 563
	60-64 ans	3 747	1 712	2 035	317	340	1 395	1 695
	65-69 ans	3 902	1 767	2 135	244	255	1 523	1 880
	70-74 ans	3 397	1 543	1 854	177	192	1 366	1 662
	50-74 ans	17 934	8 165	9 769	2 088	2 259	6 077	7 510
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	274	129	145	104	121	25	24
	55-59 ans	277	143	134	57	38	86	96
	60-64 ans	239	120	119	34	32	86	87
	65-69 ans	259	122	137	24	25	98	112
	70-74 ans	244	103	141	16	22	87	119
	50-74 ans	1 293	617	676	235	238	382	438
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	201	95	106	77	89	18	17
	55-59 ans	204	104	100	41	27	63	73
	60-64 ans	190	101	89	29	21	72	68
	65-69 ans	205	98	107	18	15	80	92
	70-74 ans	188	84	104	13	13	71	91
	50-74 ans	988	482	506	178	165	304	341
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	73	34	39	27	32	7	7
	55-59 ans	73	39	34	16	11	23	23
	60-64 ans	49	19	30	5	11	14	19
	65-69 ans	54	24	30	6	10	18	20
	70-74 ans	56	19	37	3	9	16	28
	50-74 ans	305	135	170	57	73	78	97
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 313	1 532	1 781	973	1 078	559	703
	55-59 ans	3 429	1 538	1 891	334	351	1 204	1 540
	60-64 ans	3 698	1 693	2 005	312	329	1 381	1 676
	65-69 ans	3 848	1 743	2 105	238	245	1 505	1 860
	70-74 ans	3 341	1 524	1 817	174	183	1 350	1 634
	50-74 ans	17 629	8 030	9 599	2 031	2 186	5 999	7 413
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	93	49	44	35	32	14	12
	55-59 ans	100	63	37	16	7	47	30
	60-64 ans	145	73	72	13	13	60	59
	65-69 ans	171	94	77	12	16	82	61
	70-74 ans	173	99	74	17	10	82	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	682	378	304	93	78	285	226
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	83	44	39	31	28	13	11
	55-59 ans	92	60	32	15	6	45	26
	60-64 ans	136	68	68	12	12	56	56
	65-69 ans	157	88	69	11	15	77	54
	70-74 ans	160	91	69	15	10	76	59
	50-74 ans	628	351	277	84	71	267	206
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	79	43	36	31	25	12	11
	55-59 ans	89	59	30	15	6	44	24
	60-64 ans	128	63	65	10	12	53	53
	65-69 ans	153	86	67	11	14	75	53
	70-74 ans	155	88	67	15	9	73	58
	50-74 ans	604	339	265	82	66	257	199
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	75	40	35	30	24	10	11
	55-59 ans	87	57	30	15	6	42	24
	60-64 ans	123	61	62	10	12	51	50
	65-69 ans	144	83	61	11	11	72	50
	70-74 ans	147	83	64	14	8	69	56
	50-74 ans	576	324	252	80	61	244	191
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	79	43	36	31	25	12	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88	59	29	15	6	44	23
	60-64 ans	125	61	64	10	12	51	52
	65-69 ans	150	85	65	11	14	74	51
	70-74 ans	153	87	66	15	9	72	57
	50-74 ans	595	335	260	82	66	253	194
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	79	43	36	31	25	12	11
	55-59 ans	89	59	30	15	6	44	24
	60-64 ans	128	63	65	10	12	53	53
	65-69 ans	152	86	66	11	14	75	52
	70-74 ans	154	88	66	15	8	73	58
	50-74 ans	602	339	263	82	65	257	198
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	79	43	36	31	25	12	11
	55-59 ans	89	59	30	15	6	44	24
	60-64 ans	128	63	65	10	12	53	53
	65-69 ans	154	87	67	11	14	76	53
	70-74 ans	157	89	68	15	9	74	59
	50-74 ans	607	341	266	82	66	259	200
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34	17	17	12	12	5	5
	55-59 ans	38	21	17	4	2	17	15
	60-64 ans	40	16	24	2	4	14	20
	65-69 ans	45	21	24	1	7	20	17
	70-74 ans	52	26	26	3	4	23	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	209	101	108	22	29	79	79
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	7	5	6	2	1	3
	55-59 ans	18	15	3	3	1	12	2
	60-64 ans	33	14	19	1	2	13	17
	65-69 ans	30	18	12	3	1	15	11
	70-74 ans	29	19	10	5	1	14	9
	50-74 ans	122	73	49	18	7	55	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	28	15	13	10	10	5	3
	55-59 ans	24	19	5	6	3	13	2
	60-64 ans	44	27	17	6	5	21	12
	65-69 ans	59	39	20	6	4	33	16
	70-74 ans	52	36	16	5	2	31	14
	50-74 ans	207	136	71	33	24	103	47
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	17	7	10	1	1	6	9
	70-74 ans	16	5	11	1	1	4	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	47	20	27	4	3	16	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	40	22	18	16	12	6	6
	55-59 ans	42	34	8	9	4	25	4
	60-64 ans	77	41	36	7	7	34	29
	65-69 ans	89	57	32	9	5	48	27
	70-74 ans	81	55	26	10	3	45	23
	50-74 ans	329	209	120	51	31	158	89
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	28	15	13	10	10	5	3
	55-59 ans	24	19	5	6	3	13	2
	60-64 ans	44	27	17	6	5	21	12
	65-69 ans	59	39	20	6	4	33	16
	70-74 ans	52	36	16	5	2	31	14
	50-74 ans	207	136	71	33	24	103	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	15	13	10	10	5	3
	55-59 ans	22	17	5	6	3	11	2
	60-64 ans	42	25	17	6	5	19	12
	65-69 ans	54	34	20	3	4	31	16
	70-74 ans	51	35	16	5	2	30	14
	50-74 ans	197	126	71	30	24	96	47
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	28	15	13	10	10	5	3
	55-59 ans	25	20	5	6	3	14	2
	60-64 ans	48	29	19	6	5	23	14
	65-69 ans	60	38	22	4	5	34	17
	70-74 ans	61	45	16	9	2	36	14
	50-74 ans	222	147	75	35	25	112	50
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	17	7	10	1	1	6	9
	70-74 ans	17	6	11	2	1	4	10
	50-74 ans	48	21	27	5	3	16	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	14	5	9	1	1	4	8
	70-74 ans	15	5	10	1	1	4	9
	50-74 ans	42	17	25	4	3	13	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	12	4	8	1	1	3	7
	70-74 ans	14	5	9	1	1	4	8
	50-74 ans	35	14	21	4	2	10	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	8	2	6	1	1	1	5
	50-74 ans	23	9	14	2	1	7	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	2	6	0	0	2	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2	2
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3	3
	65-69 ans	13	4	9	1	1	3	8	8
	70-74 ans	15	5	10	1	1	4	9	9
	50-74 ans	39	15	24	4	2	11	22	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	1
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2	2
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1	1
	50-74 ans	21	9	12	2	2	7	10	10

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,2	8,0	10,4	10,9	4,4	3,4
	55-59 ans	7,9	9,1	7,0	16,3	10,5	7,0	6,1
	60-64 ans	6,4	7,0	5,8	10,7	9,4	6,2	5,1
	65-69 ans	6,6	6,9	6,4	9,8	9,8	6,4	6,0
	70-74 ans	7,2	6,7	7,6	9,0	11,5	6,4	7,2
	50-74 ans	7,2	7,6	6,9	11,3	10,5	6,3	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,1	2,7	2,9	1,2	1,0
	55-59 ans	2,1	2,5	1,8	4,6	3,0	1,9	1,5
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,6	3,2	1,0	1,1
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	2,5	3,9	1,2	1,1
	70-74 ans	1,6	1,2	2,0	1,7	4,7	1,2	1,7
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	2,7	3,2	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,4	73,6	73,1	74,0	73,6	72,0	70,8
	55-59 ans	73,6	72,7	74,6	71,9	71,1	73,3	76,0
	60-64 ans	79,5	84,2	74,8	85,3	65,6	83,7	78,2
	65-69 ans	79,2	80,3	78,1	75,0	60,0	81,6	82,1
	70-74 ans	77,0	81,6	73,8	81,3	59,1	81,6	76,5
	50-74 ans	76,4	78,1	74,9	75,7	69,3	79,6	77,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,2	2,5	3,6	3,0	2,5	1,7
	55-59 ans	2,9	4,1	2,0	4,8	2,0	3,9	1,9
	60-64 ans	3,9	4,3	3,6	4,2	4,0	4,3	3,5
	65-69 ans	4,4	5,4	3,7	5,0	6,5	5,4	3,3
	70-74 ans	5,2	6,5	4,1	9,8	5,5	6,1	3,9
	50-74 ans	3,9	4,7	3,2	4,6	3,6	4,8	3,0
50-74 ans **	3,7	4,4	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	89,2	89,8	88,6	88,6	87,5	92,9	91,7
	55-59 ans	92,0	95,2	86,5	93,8	85,7	95,7	86,7
	60-64 ans	93,8	93,2	94,4	92,3	92,3	93,3	94,9
	65-69 ans	91,8	93,6	89,6	91,7	93,8	93,9	88,5
	70-74 ans	92,5	91,9	93,2	88,2	100,0	92,7	92,2
	50-74 ans	92,1	92,9	91,1	90,3	91,0	93,7	91,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	97,7	92,3	100,0	89,3	92,3	100,0
	55-59 ans	96,7	98,3	93,8	100,0	100,0	97,8	92,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,1	92,6	95,6	83,3	100,0	94,6	94,6
	65-69 ans	97,5	97,7	97,1	100,0	93,3	97,4	98,1
	70-74 ans	96,9	96,7	97,1	100,0	90,0	96,1	98,3
	50-74 ans	96,2	96,6	95,7	97,6	93,0	96,3	96,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,9	93,0	97,2	96,8	96,0	83,3	100,0
	55-59 ans	97,8	96,6	100,0	100,0	100,0	95,5	100,0
	60-64 ans	96,1	96,8	95,4	100,0	100,0	96,2	94,3
	65-69 ans	94,1	96,5	91,0	100,0	78,6	96,0	94,3
	70-74 ans	94,8	94,3	95,5	93,3	88,9	94,5	96,6
	50-74 ans	95,4	95,6	95,1	97,6	92,4	94,9	96,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	4	4
	55-59 ans	5	5	4	6	4	5	4
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	5	5	6	4	4
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-3)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	124	141	105	146	95	128	125
	55-59 ans	87	83	95	102	160	77	79
	60-64 ans	100	102	98	140	94	95	99
	65-69 ans	104	105	103	90	181	107	82
	70-74 ans	98	100	94	162	113	88	91
	50-74 ans	102	104	99	133	121	95	91
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84,5 (57-126)	94,5 (67-139)	71,5 (52,5-114)	95 (67-133)	75 (51-106)	83 (68-139,5)	59 (54-124)
	55-59 ans	63 (49-93)	61 (49-96)	68,5 (46-83)	61 (49-90)	70 (49-132)	61,5 (48-96)	67 (45,5-82,5)
	60-64 ans	64 (45,5-103)	62 (44-111)	70 (48-93)	47 (43-116)	87 (55-103,5)	62 (46-110)	66 (48-90)
	65-69 ans	69,5 (49-115)	68,5 (52-121)	72 (43-103)	73 (53-140)	87 (46-131)	68 (50-121)	68,5 (42,5-102)
	70-74 ans	69,5 (48-99)	66 (48-98)	73 (49-104)	98 (82-246)	97 (82-123)	63 (44-88)	68 (48-95)
	50-74 ans	69 (49-104)	68,5 (49-108)	70 (48-102)	89 (54-128)	82,5 (50-122)	64 (49-103)	68 (47-91)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	4,1	2,3	5,7	0,0	0,0	8,3
	55-59 ans	4,0	1,6	8,1	0,0	14,3	2,1	6,7
	60-64 ans	2,8	2,7	2,8	0,0	0,0	3,3	3,4
	65-69 ans	3,5	2,1	5,2	0,0	0,0	2,4	6,6
	70-74 ans	2,3	2,0	2,7	0,0	10,0	2,4	1,6
	50-74 ans	3,1	2,4	3,9	2,2	2,6	2,5	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,1
	70-74 ans	99,4	100,0	98,5	100,0	88,9	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	100,0	99,2	100,0	98,5	100,0	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,0	39,5	47,2	38,7	48,0	41,7	45,5
	55-59 ans	42,7	35,6	56,7	26,7	33,3	38,6	62,5
	60-64 ans	31,3	25,4	36,9	20,0	33,3	26,4	37,7
	65-69 ans	29,2	24,1	35,8	9,1	50,0	26,3	32,1
	70-74 ans	33,1	29,2	38,2	20,0	44,4	31,1	37,3
	50-74 ans	34,4	29,6	40,6	26,8	43,9	30,5	39,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,2	16,3	13,9	19,4	8,0	8,3	27,3
	55-59 ans	20,2	25,4	10,0	20,0	16,7	27,3	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25,8	22,2	29,2	10,0	16,7	24,5	32,1
	65-69 ans	19,5	20,7	17,9	27,3	7,1	19,7	20,8
	70-74 ans	18,5	21,3	14,7	33,3	11,1	18,9	15,3
	50-74 ans	20,1	21,4	18,4	22,0	10,6	21,2	21,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35,4	34,9	36,1	32,3	40,0	41,7	27,3
	55-59 ans	27,0	32,2	16,7	40,0	50,0	29,5	8,3
	60-64 ans	34,4	42,9	26,2	60,0	41,7	39,6	22,6
	65-69 ans	38,3	44,8	29,9	54,5	28,6	43,4	30,2
	70-74 ans	33,1	40,4	23,5	33,3	22,2	41,9	23,7
	50-74 ans	34,1	39,9	26,7	40,2	36,4	39,8	23,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,6	5,1	6,7	6,7	0,0	4,5	8,3
	60-64 ans	7,0	7,9	6,2	10,0	8,3	7,5	5,7
	65-69 ans	11,0	8,0	14,9	9,1	7,1	7,9	17,0
	70-74 ans	10,2	5,6	16,2	6,7	11,1	5,4	16,9
	50-74 ans	7,7	5,9	10,2	4,9	4,5	6,2	12,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	7,0	2,8	6,5	4,0	8,3	0,0
	55-59 ans	4,5	1,7	10,0	6,7	0,0	0,0	12,5
	60-64 ans	1,6	1,6	1,5	0,0	0,0	1,9	1,9
	65-69 ans	1,9	2,3	1,5	0,0	7,1	2,6	0,0
	70-74 ans	3,8	2,2	5,9	0,0	0,0	2,7	6,8
	50-74 ans	3,1	2,6	3,8	3,7	3,0	2,3	4,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	2,3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,3	1,1	1,5	6,7	11,1	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	2,4	1,5	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,1	14,4	10,1	16,4	11,1	10,7	8,5
	55-59 ans	12,2	22,1	4,2	26,9	11,4	20,8	2,6
	60-64 ans	20,8	24,2	18,0	22,4	21,3	24,6	17,3
	65-69 ans	23,1	32,7	15,2	37,8	20,4	31,9	14,5
	70-74 ans	24,2	36,1	14,3	57,5	16,4	33,3	14,1
	50-74 ans	18,7	26,0	12,5	25,1	14,2	26,3	12,0
	50-74 ans **	17,6	24,1	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	9,8	7,3	10,3	9,3	8,9	4,3
	55-59 ans	7,0	12,4	2,6	18,0	8,5	10,8	1,3
	60-64 ans	11,9	15,9	8,5	19,2	15,2	15,2	7,2
	65-69 ans	15,3	22,4	9,5	25,2	16,3	21,9	8,6
	70-74 ans	15,6	23,6	8,8	28,7	10,9	23,0	8,6
	50-74 ans	11,7	16,9	7,4	16,2	11,0	17,2	6,3
	50-74 ans **	11,1	15,5	7,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	9,8	7,3	10,3	9,3	8,9	4,3
	55-59 ans	6,4	11,1	2,6	18,0	8,5	9,1	1,3
	60-64 ans	11,4	14,8	8,5	19,2	15,2	13,8	7,2
	65-69 ans	14,0	19,5	9,5	12,6	16,3	20,6	8,6
	70-74 ans	15,3	23,0	8,8	28,7	10,9	22,2	8,6
	50-74 ans	11,2	15,7	7,4	14,8	11,0	16,0	6,3
	50-74 ans **	10,5	14,4	7,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	9,8	7,3	10,3	9,3	8,9	4,3
	55-59 ans	7,3	13,0	2,6	18,0	8,5	11,6	1,3
	60-64 ans	13,0	17,1	9,5	19,2	15,2	16,7	8,4
	65-69 ans	15,6	21,8	10,5	16,8	20,4	22,6	9,1
	70-74 ans	18,3	29,5	8,8	51,7	10,9	26,7	8,6
	50-74 ans	12,6	18,3	7,8	17,2	11,4	18,7	6,7
	50-74 ans **	11,8	16,6	7,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	2,0	1,1	3,0	0,0	1,7	1,3
	60-64 ans	2,4	3,0	2,0	3,2	3,0	2,9	1,8
	65-69 ans	4,4	4,0	4,8	4,2	4,1	4,0	4,8
	70-74 ans	5,1	3,9	6,1	11,5	5,5	3,0	6,1
	50-74 ans	2,7	2,6	2,8	2,5	1,4	2,7	3,2
	50-74 ans **	2,3	2,2	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0	33,3	0,0
	65-69 ans	14,3	20,0	11,1	0,0	0,0	25,0	12,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	9,5	11,8	8,0	0,0	33,3	15,4	4,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)