

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 26 827 | 12 940 | 13 887 | 7 778 | 8 040 | 5 162 | 5 847 |
| | 55-59 ans | 25 367 | 12 120 | 13 247 | 1 823 | 1 859 | 10 297 | 11 388 |
| | 60-64 ans | 24 186 | 11 182 | 13 004 | 1 052 | 1 060 | 10 130 | 11 944 |
| | 65-69 ans | 22 325 | 10 047 | 12 278 | 731 | 748 | 9 316 | 11 530 |
| | 70-74 ans | 18 945 | 8 567 | 10 378 | 478 | 446 | 8 089 | 9 932 |
| | 50-74 ans | 117 650 | 54 856 | 62 794 | 11 862 | 12 153 | 42 994 | 50 641 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 2 531 | 1 297 | 1 234 | 946 | 832 | 351 | 402 |
| | 55-59 ans | 2 333 | 1 139 | 1 194 | 264 | 265 | 875 | 929 |
| | 60-64 ans | 2 180 | 963 | 1 217 | 123 | 126 | 840 | 1 091 |
| | 65-69 ans | 1 933 | 866 | 1 067 | 100 | 79 | 766 | 988 |
| | 70-74 ans | 1 756 | 771 | 985 | 64 | 67 | 707 | 918 |
| | 50-74 ans | 10 733 | 5 036 | 5 697 | 1 497 | 1 369 | 3 539 | 4 328 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 2 070 | 1 052 | 1 018 | 741 | 667 | 311 | 351 |
| | 55-59 ans | 1 952 | 957 | 995 | 188 | 179 | 769 | 816 |
| | 60-64 ans | 1 871 | 825 | 1 046 | 92 | 97 | 733 | 949 |
| | 65-69 ans | 1 671 | 754 | 917 | 67 | 50 | 687 | 867 |
| | 70-74 ans | 1 431 | 635 | 796 | 39 | 44 | 596 | 752 |
| | 50-74 ans | 8 995 | 4 223 | 4 772 | 1 127 | 1 037 | 3 096 | 3 735 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 461 | 245 | 216 | 205 | 165 | 40 | 51 |
| | 55-59 ans | 381 | 182 | 199 | 76 | 86 | 106 | 113 |
| | 60-64 ans | 309 | 138 | 171 | 31 | 29 | 107 | 142 |
| | 65-69 ans | 262 | 112 | 150 | 33 | 29 | 79 | 121 |
| | 70-74 ans | 325 | 136 | 189 | 25 | 23 | 111 | 166 |
| | 50-74 ans | 1 738 | 813 | 925 | 370 | 332 | 443 | 593 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 26 366 | 12 695 | 13 671 | 7 573 | 7 875 | 5 122 | 5 796 |
| | 55-59 ans | 24 986 | 11 938 | 13 048 | 1 747 | 1 773 | 10 191 | 11 275 |
| | 60-64 ans | 23 877 | 11 044 | 12 833 | 1 021 | 1 031 | 10 023 | 11 802 |
| | 65-69 ans | 22 063 | 9 935 | 12 128 | 698 | 719 | 9 237 | 11 409 |
| | 70-74 ans | 18 620 | 8 431 | 10 189 | 453 | 423 | 7 978 | 9 766 |
| | 50-74 ans | 115 912 | 54 043 | 61 869 | 11 492 | 11 821 | 42 551 | 50 048 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 758 | 441 | 317 | 282 | 210 | 159 | 107 |
| | 55-59 ans | 734 | 403 | 331 | 98 | 58 | 305 | 273 |
| | 60-64 ans | 796 | 452 | 344 | 67 | 38 | 385 | 306 |
| | 65-69 ans | 908 | 524 | 384 | 64 | 25 | 460 | 359 |
| | 70-74 ans | 878 | 481 | 397 | 40 | 30 | 441 | 367 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 4 074 | 2 301 | 1 773 | 551 | 361 | 1 750 | 1 412 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 747 | 432 | 315 | 279 | 209 | 153 | 106 |
| | 55-59 ans | 723 | 399 | 324 | 98 | 57 | 301 | 267 |
| | 60-64 ans | 783 | 444 | 339 | 65 | 38 | 379 | 301 |
| | 65-69 ans | 886 | 512 | 374 | 63 | 25 | 449 | 349 |
| | 70-74 ans | 844 | 463 | 381 | 37 | 29 | 426 | 352 |
| | 50-74 ans | 3 983 | 2 250 | 1 733 | 542 | 358 | 1 708 | 1 375 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 674 | 392 | 282 | 254 | 187 | 138 | 95 |
| | 55-59 ans | 671 | 370 | 301 | 87 | 52 | 283 | 249 |
| | 60-64 ans | 725 | 412 | 313 | 57 | 34 | 355 | 279 |
| | 65-69 ans | 826 | 473 | 353 | 57 | 22 | 416 | 331 |
| | 70-74 ans | 779 | 429 | 350 | 35 | 23 | 394 | 327 |
| | 50-74 ans | 3 675 | 2 076 | 1 599 | 490 | 318 | 1 586 | 1 281 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 627 | 360 | 267 | 232 | 174 | 128 | 93 |
| | 55-59 ans | 622 | 348 | 274 | 78 | 48 | 270 | 226 |
| | 60-64 ans | 672 | 385 | 287 | 53 | 30 | 332 | 257 |
| | 65-69 ans | 764 | 436 | 328 | 51 | 19 | 385 | 309 |
| | 70-74 ans | 717 | 393 | 324 | 31 | 22 | 362 | 302 |
| | 50-74 ans | 3 402 | 1 922 | 1 480 | 445 | 293 | 1 477 | 1 187 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 27 | 17 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 670 | 390 | 280 | 253 | 185 | 137 | 95 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 658 | 364 | 294 | 83 | 51 | 281 | 243 |
| | 60-64 ans | 711 | 405 | 306 | 56 | 33 | 349 | 273 |
| | 65-69 ans | 813 | 467 | 346 | 57 | 22 | 410 | 324 |
| | 70-74 ans | 764 | 421 | 343 | 35 | 23 | 386 | 320 |
| | 50-74 ans | 3 616 | 2 047 | 1 569 | 484 | 314 | 1 563 | 1 255 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| | 60-64 ans | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| | 50-74 ans | 59 | 29 | 30 | 6 | 4 | 23 | 26 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 638 | 368 | 270 | 237 | 177 | 131 | 93 |
| | 55-59 ans | 646 | 361 | 285 | 85 | 48 | 276 | 237 |
| | 60-64 ans | 702 | 400 | 302 | 56 | 32 | 344 | 270 |
| | 65-69 ans | 804 | 462 | 342 | 54 | 21 | 408 | 321 |
| | 70-74 ans | 755 | 417 | 338 | 34 | 23 | 383 | 315 |
| | 50-74 ans | 3 545 | 2 008 | 1 537 | 466 | 301 | 1 542 | 1 236 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 675 | 393 | 282 | 255 | 187 | 138 | 95 |
| | 55-59 ans | 677 | 373 | 304 | 87 | 53 | 286 | 251 |
| | 60-64 ans | 726 | 412 | 314 | 57 | 34 | 355 | 280 |
| | 65-69 ans | 829 | 475 | 354 | 58 | 22 | 417 | 332 |
| | 70-74 ans | 785 | 432 | 353 | 37 | 23 | 395 | 330 |
| | 50-74 ans | 3 692 | 2 085 | 1 607 | 494 | 319 | 1 591 | 1 288 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 261 | 130 | 131 | 74 | 81 | 56 | 50 |
| | 55-59 ans | 231 | 108 | 123 | 18 | 17 | 90 | 106 |
| | 60-64 ans | 233 | 100 | 133 | 14 | 15 | 86 | 118 |
| | 65-69 ans | 239 | 116 | 123 | 9 | 6 | 107 | 117 |
| | 70-74 ans | 224 | 108 | 116 | 5 | 11 | 103 | 105 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 1 188 | 562 | 626 | 120 | 130 | 442 | 496 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 49 | 27 | 22 | 20 | 14 | 7 | 8 |
| | 55-59 ans | 45 | 20 | 25 | 4 | 4 | 16 | 21 |
| | 60-64 ans | 39 | 14 | 25 | 1 | 2 | 13 | 23 |
| | 65-69 ans | 46 | 26 | 20 | 4 | 0 | 22 | 20 |
| | 70-74 ans | 48 | 20 | 28 | 2 | 2 | 18 | 26 |
| | 50-74 ans | 227 | 107 | 120 | 31 | 22 | 76 | 98 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 111 | 73 | 38 | 46 | 27 | 27 | 11 |
| | 55-59 ans | 134 | 73 | 61 | 11 | 7 | 62 | 54 |
| | 60-64 ans | 137 | 88 | 49 | 8 | 6 | 80 | 43 |
| | 65-69 ans | 155 | 92 | 63 | 9 | 2 | 83 | 61 |
| | 70-74 ans | 131 | 60 | 71 | 3 | 3 | 57 | 68 |
| | 50-74 ans | 668 | 386 | 282 | 77 | 45 | 309 | 237 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 166 | 109 | 57 | 73 | 40 | 36 | 17 |
| | 55-59 ans | 179 | 124 | 55 | 40 | 12 | 84 | 43 |
| | 60-64 ans | 232 | 158 | 74 | 23 | 5 | 135 | 69 |
| | 65-69 ans | 266 | 171 | 95 | 26 | 7 | 145 | 88 |
| | 70-74 ans | 254 | 163 | 91 | 16 | 5 | 147 | 86 |
| | 50-74 ans | 1 097 | 725 | 372 | 178 | 69 | 547 | 303 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 28 | 16 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 44 | 27 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| | 60-64 ans | 50 | 32 | 18 | 8 | 4 | 24 | 14 |
| | 65-69 ans | 74 | 45 | 29 | 7 | 2 | 38 | 27 |
| | 70-74 ans | 81 | 53 | 28 | 8 | 2 | 45 | 26 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 277 | 173 | 104 | 46 | 24 | 127 | 80 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 17 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| | 60-64 ans | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 22 | 12 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 |
| | 70-74 ans | 26 | 15 | 11 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| | 50-74 ans | 92 | 56 | 36 | 13 | 9 | 43 | 27 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 36 | 25 | 11 | 19 | 10 | 6 | 1 |
| | 55-59 ans | 27 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| | 60-64 ans | 21 | 10 | 11 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| | 65-69 ans | 23 | 12 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| | 70-74 ans | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| | 50-74 ans | 127 | 71 | 56 | 27 | 16 | 44 | 40 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 278 | 183 | 95 | 120 | 67 | 63 | 28 |
| | 55-59 ans | 314 | 197 | 117 | 51 | 19 | 146 | 98 |
| | 60-64 ans | 373 | 249 | 124 | 32 | 11 | 217 | 113 |
| | 65-69 ans | 421 | 263 | 158 | 35 | 9 | 228 | 149 |
| | 70-74 ans | 386 | 223 | 163 | 19 | 8 | 204 | 155 |
| | 50-74 ans | 1 772 | 1 115 | 657 | 257 | 114 | 858 | 543 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 166 | 109 | 57 | 73 | 40 | 36 | 17 |
| | 55-59 ans | 179 | 124 | 55 | 40 | 12 | 84 | 43 |
| | 60-64 ans | 232 | 158 | 74 | 23 | 5 | 135 | 69 |
| | 65-69 ans | 266 | 171 | 95 | 26 | 7 | 145 | 88 |
| | 70-74 ans | 254 | 163 | 91 | 16 | 5 | 147 | 86 |
| | 50-74 ans | 1 097 | 725 | 372 | 178 | 69 | 547 | 303 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 133 | 89 | 44 | 63 | 32 | 26 | 12 |
| | 55-59 ans | 151 | 107 | 44 | 33 | 10 | 74 | 34 |
| | 60-64 ans | 179 | 120 | 59 | 19 | 4 | 101 | 55 |
| | 65-69 ans | 203 | 133 | 70 | 25 | 6 | 108 | 64 |
| | 70-74 ans | 195 | 127 | 68 | 12 | 4 | 115 | 64 |
| | 50-74 ans | 861 | 576 | 285 | 152 | 56 | 424 | 229 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 164 | 113 | 51 | 77 | 38 | 36 | 13 |
| | 55-59 ans | 174 | 124 | 50 | 37 | 10 | 87 | 40 |
| | 60-64 ans | 230 | 156 | 74 | 21 | 5 | 135 | 69 |
| | 65-69 ans | 258 | 173 | 85 | 27 | 7 | 146 | 78 |
| | 70-74 ans | 247 | 158 | 89 | 14 | 6 | 144 | 83 |
| | 50-74 ans | 1 073 | 724 | 349 | 176 | 66 | 548 | 283 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 29 | 16 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 44 | 27 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| | 60-64 ans | 50 | 32 | 18 | 8 | 4 | 24 | 14 |
| | 65-69 ans | 74 | 45 | 29 | 7 | 2 | 38 | 27 |
| | 70-74 ans | 81 | 53 | 28 | 8 | 2 | 45 | 26 |
| | 50-74 ans | 278 | 173 | 105 | 46 | 25 | 127 | 80 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 29 | 16 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 37 | 24 | 13 | 7 | 3 | 17 | 10 |
| | 60-64 ans | 45 | 29 | 16 | 7 | 4 | 22 | 12 |
| | 65-69 ans | 72 | 44 | 28 | 7 | 2 | 37 | 26 |
| | 70-74 ans | 76 | 49 | 27 | 7 | 2 | 42 | 25 |
| | 50-74 ans | 259 | 162 | 97 | 41 | 21 | 121 | 76 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 25 | 15 | 10 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 32 | 21 | 11 | 7 | 3 | 14 | 8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 43 | 28 | 15 | 6 | 3 | 22 | 12 |
| | 65-69 ans | 65 | 38 | 27 | 6 | 2 | 32 | 25 |
| | 70-74 ans | 72 | 46 | 26 | 6 | 2 | 40 | 24 |
| | 50-74 ans | 237 | 148 | 89 | 38 | 18 | 110 | 71 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 19 | 13 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| | 60-64 ans | 23 | 15 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| | 65-69 ans | 47 | 29 | 18 | 5 | 2 | 24 | 16 |
| | 70-74 ans | 44 | 27 | 17 | 5 | 2 | 22 | 15 |
| | 50-74 ans | 146 | 92 | 54 | 30 | 11 | 62 | 43 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| | 60-64 ans | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| | 65-69 ans | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 28 | 19 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 |
| | 50-74 ans | 91 | 56 | 35 | 8 | 7 | 48 | 28 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 65-69 ans | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| | 70-74 ans | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| | 50-74 ans | 67 | 43 | 24 | 13 | 4 | 30 | 20 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| | 70-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | 12 | 7 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| | 70-74 ans | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| | 50-74 ans | 36 | 21 | 15 | 7 | 3 | 14 | 12 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 26 | 15 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 33 | 21 | 12 | 7 | 3 | 14 | 9 |
| | 60-64 ans | 42 | 27 | 15 | 5 | 3 | 22 | 12 |
| | 65-69 ans | 65 | 38 | 27 | 6 | 2 | 32 | 25 |
| | 70-74 ans | 70 | 46 | 24 | 6 | 2 | 40 | 22 |
| | 50-74 ans | 236 | 147 | 89 | 37 | 19 | 110 | 70 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 33 | 17 | 16 | 8 | 11 | 9 | 5 |
| | 55-59 ans | 26 | 16 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| | 60-64 ans | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| | 65-69 ans | 26 | 15 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| | 70-74 ans | 29 | 22 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 |
| | 50-74 ans | 138 | 84 | 54 | 22 | 14 | 62 | 40 |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 9,4 | 10,0 | 8,9 | 12,2 | 10,3 | 6,8 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 14,5 | 14,3 | 8,5 | 8,2 |
| | 60-64 ans | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 11,7 | 11,9 | 8,3 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 13,7 | 10,6 | 8,2 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 13,4 | 15,0 | 8,7 | 9,2 |
| | 50-74 ans | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 12,6 | 11,3 | 8,2 | 8,5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 0,8 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,2 | 4,6 | 1,0 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 2,7 | 1,1 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 4,5 | 3,9 | 0,8 | 1,0 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 5,2 | 5,2 | 1,4 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 2,7 | 1,0 | 1,2 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 81,8 | 81,1 | 82,5 | 78,3 | 80,2 | 88,6 | 87,3 |
| | 55-59 ans | 83,7 | 84,0 | 83,3 | 71,2 | 67,5 | 87,9 | 87,8 |
| | 60-64 ans | 85,8 | 85,7 | 85,9 | 74,8 | 77,0 | 87,3 | 87,0 |
| | 65-69 ans | 86,4 | 87,1 | 85,9 | 67,0 | 63,3 | 89,7 | 87,8 |
| | 70-74 ans | 81,5 | 82,4 | 80,8 | 60,9 | 65,7 | 84,3 | 81,9 |
| | 50-74 ans | 83,8 | 83,9 | 83,8 | 75,3 | 75,7 | 87,5 | 86,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 5,6 | 3,3 | 3,0 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 3,3 | 4,1 | 2,7 | 6,6 | 3,7 | 3,8 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,3 | 3,2 | 9,2 | 3,5 | 5,0 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 4,7 | 5,7 | 3,9 | 8,8 | 7,1 | 5,5 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 4,8 | 3,1 | 4,1 | 2,8 |
| 50-74 ans ** | 3,5 | 4,1 | 2,8 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,5 | 98,0 | 99,4 | 98,9 | 99,5 | 96,2 | 99,1 |
| | 55-59 ans | 98,5 | 99,0 | 97,9 | 100,0 | 98,3 | 98,7 | 97,8 |
| | 60-64 ans | 98,4 | 98,2 | 98,5 | 97,0 | 100,0 | 98,4 | 98,4 |
| | 65-69 ans | 97,6 | 97,7 | 97,4 | 98,4 | 100,0 | 97,6 | 97,2 |
| | 70-74 ans | 96,1 | 96,3 | 96,0 | 92,5 | 96,7 | 96,6 | 95,9 |
| | 50-74 ans | 97,8 | 97,8 | 97,7 | 98,4 | 99,2 | 97,6 | 97,4 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,2 | 90,7 | 89,5 | 91,0 | 89,5 | 90,2 | 89,6 |
| | 55-59 ans | 92,8 | 92,7 | 92,9 | 88,8 | 91,2 | 94,0 | 93,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 92,6 | 92,8 | 92,3 | 87,7 | 89,5 | 93,7 | 92,7 |
| | 65-69 ans | 93,2 | 92,4 | 94,4 | 90,5 | 88,0 | 92,7 | 94,8 |
| | 70-74 ans | 92,3 | 92,7 | 91,9 | 94,6 | 79,3 | 92,5 | 92,9 |
| | 50-74 ans | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 90,4 | 88,8 | 92,9 | 93,2 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,0 | 91,8 | 94,7 | 91,3 | 93,0 | 92,8 | 97,9 |
| | 55-59 ans | 92,7 | 94,1 | 91,0 | 89,7 | 92,3 | 95,4 | 90,8 |
| | 60-64 ans | 92,7 | 93,4 | 91,7 | 93,0 | 88,2 | 93,5 | 92,1 |
| | 65-69 ans | 92,5 | 92,2 | 92,9 | 89,5 | 86,4 | 92,5 | 93,4 |
| | 70-74 ans | 92,0 | 91,6 | 92,6 | 88,6 | 95,7 | 91,9 | 92,4 |
| | 50-74 ans | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 90,8 | 92,1 | 93,1 | 92,7 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 55-59 ans | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-6) | 2 (2-6) | 2 (2-5) | 2 (2-6) | 2 (2-5) | 2 (2-6) | 2 (2-5) |
| | 55-59 ans | 2 (2-8) | 2 (2-8) | 2 (2-7) | 3 (2-10) | 3 (2-10) | 2 (2-8) | 2 (2-7) |
| | 60-64 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 3 (2-9) | 3 (2-9) | 2 (2-7) | 2 (2-7) |
| | 65-69 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-6) | 3 (2-10) | 3 (2-10) | 2 (2-6) | 2 (2-6) |
| | 70-74 ans | 2 (2-7) | 2 (2-6) | 2 (2-7) | 3 (2-10) | 3 (2-10) | 2 (2-6) | 2 (2-6) |
| | 50-74 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-6) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 107 | 110 | 103 | 109 | 96 | 113 | 116 |
| | 55-59 ans | 105 | 114 | 93 | 122 | 97 | 112 | 92 |
| | 60-64 ans | 98 | 97 | 100 | 95 | 105 | 97 | 99 |
| | 65-69 ans | 104 | 102 | 107 | 99 | 107 | 102 | 107 |
| | 70-74 ans | 94 | 92 | 97 | 98 | 147 | 91 | 93 |
| | 50-74 ans | 102 | 103 | 100 | 108 | 102 | 101 | 100 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 76 (50-115) | 75 (51-113,5) | 79 (49-115) | 75,5 (49-116) | 72 (49-113) | 72,5 (54-113) | 84 (48-126) |
| | 55-59 ans | 73 (50-112) | 75,5 (52-119) | 69 (48-104) | 79 (54-119) | 77 (50-105) | 75 (50-119) | 69 (48-104) |
| | 60-64 ans | 72 (49-111) | 72 (50-110) | 72 (48-111) | 75 (55-114) | 67 (46-165) | 71 (49-110) | 74 (48-111) |
| | 65-69 ans | 73 (48-111) | 74 (48-110) | 71 (48-113) | 77,5 (54-118) | 61 (44-110) | 73 (46,5-109) | 71 (48-114) |
| | 70-74 ans | 73 (51-111) | 74 (50-109) | 73 (53-113) | 78 (48-105) | 120 (91-137) | 73,5 (50-109) | 70 (51-106) |
| | 50-74 ans | 73 (50-112) | 74 (50-113) | 72 (49-112) | 76 (52-117) | 72,5 (50-115) | 73 (50-111) | 72 (49-110) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 4,4 | 3,9 | 5,0 | 2,8 | 5,2 | 5,7 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 7,1 | 1,7 | 3,0 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 6,0 | 0,0 | 2,6 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 8,0 | 3,0 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 4,6 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 2,8 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 94,7 | 93,9 | 95,7 | 93,3 | 94,7 | 94,9 | 97,9 |
| | 55-59 ans | 96,3 | 97,6 | 94,7 | 97,7 | 92,3 | 97,5 | 95,2 |
| | 60-64 ans | 96,8 | 97,1 | 96,5 | 98,2 | 94,1 | 96,9 | 96,8 |
| | 65-69 ans | 97,3 | 97,7 | 96,9 | 94,7 | 95,5 | 98,1 | 97,0 |
| | 70-74 ans | 96,9 | 97,2 | 96,6 | 97,1 | 100,0 | 97,2 | 96,3 |
| | 50-74 ans | 96,5 | 96,7 | 96,1 | 95,1 | 94,7 | 97,2 | 96,5 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 38,7 | 33,1 | 46,5 | 29,0 | 43,3 | 40,6 | 52,6 |
| | 55-59 ans | 34,1 | 29,0 | 40,5 | 20,7 | 32,1 | 31,5 | 42,2 |
| | 60-64 ans | 32,1 | 24,3 | 42,4 | 24,6 | 44,1 | 24,2 | 42,1 |
| | 65-69 ans | 28,8 | 24,4 | 34,7 | 15,5 | 27,3 | 25,7 | 35,2 |
| | 70-74 ans | 28,5 | 25,0 | 32,9 | 13,5 | 47,8 | 26,1 | 31,8 |
| | 50-74 ans | 32,2 | 27,0 | 39,0 | 24,3 | 40,8 | 27,8 | 38,5 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,3 | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 5,1 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 6,6 | 5,4 | 8,2 | 4,6 | 7,5 | 5,6 | 8,4 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 3,4 | 8,0 | 1,8 | 5,9 | 3,7 | 8,2 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,9 | 0,0 | 5,3 | 6,0 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 4,6 | 7,9 | 5,4 | 8,7 | 4,6 | 7,9 |
| | 50-74 ans | 6,1 | 5,1 | 7,5 | 6,3 | 6,9 | 4,8 | 7,6 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,4 |
| | 60-64 ans | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 16,4 | 18,6 | 13,5 | 18,0 | 14,4 | 19,6 | 11,6 |
| | 55-59 ans | 19,8 | 19,6 | 20,1 | 12,6 | 13,2 | 21,7 | 21,5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 18,9 | 21,4 | 15,6 | 14,0 | 17,6 | 22,5 | 15,4 |
| | 65-69 ans | 18,7 | 19,4 | 17,8 | 15,5 | 9,1 | 19,9 | 18,4 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 13,9 | 20,1 | 8,1 | 13,0 | 14,4 | 20,6 |
| | 50-74 ans | 18,1 | 18,5 | 17,5 | 15,6 | 14,1 | 19,4 | 18,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 24,6 | 27,7 | 20,2 | 28,6 | 21,4 | 26,1 | 17,9 |
| | 55-59 ans | 26,4 | 33,2 | 18,1 | 46,0 | 22,6 | 29,4 | 17,1 |
| | 60-64 ans | 32,0 | 38,3 | 23,6 | 40,4 | 14,7 | 38,0 | 24,6 |
| | 65-69 ans | 32,1 | 36,0 | 26,8 | 44,8 | 31,8 | 34,8 | 26,5 |
| | 70-74 ans | 32,4 | 37,7 | 25,8 | 43,2 | 21,7 | 37,2 | 26,1 |
| | 50-74 ans | 29,7 | 34,8 | 23,1 | 36,0 | 21,6 | 34,4 | 23,5 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 4,8 | 2,2 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 6,5 | 7,2 | 5,6 | 11,5 | 13,2 | 5,9 | 4,0 |
| | 60-64 ans | 6,9 | 7,8 | 5,7 | 14,0 | 11,8 | 6,8 | 5,0 |
| | 65-69 ans | 8,9 | 9,5 | 8,2 | 12,1 | 9,1 | 9,1 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 10,3 | 12,3 | 7,9 | 21,6 | 8,7 | 11,4 | 7,9 |
| | 50-74 ans | 7,5 | 8,3 | 6,5 | 9,3 | 7,5 | 8,0 | 6,2 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 3,1 | 1,6 | 2,2 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 3,8 | 2,4 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 2,4 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 2,3 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 18,2 | 2,9 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 5,4 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,1 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 5,3 | 6,4 | 3,9 | 7,5 | 5,3 | 4,3 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 4,0 | 3,2 | 4,9 | 3,4 | 5,7 | 3,1 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 3,2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 5,2 | 4,5 | 2,2 | 3,0 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 2,8 | 3,1 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,5 | 14,4 | 6,9 | 15,8 | 8,5 | 12,3 | 4,8 |
| | 55-59 ans | 12,6 | 16,5 | 9,0 | 29,2 | 10,7 | 14,3 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 15,6 | 22,5 | 9,7 | 31,3 | 10,7 | 21,7 | 9,6 |
| | 65-69 ans | 19,1 | 26,5 | 13,0 | 50,1 | 12,5 | 24,7 | 13,1 |
| | 70-74 ans | 20,7 | 26,5 | 16,0 | 41,9 | 18,9 | 25,6 | 15,9 |
| | 50-74 ans | 15,3 | 20,6 | 10,6 | 22,4 | 9,6 | 20,2 | 10,8 |
| | 50-74 ans ** | 15,0 | 20,1 | 10,3 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,3 | 8,6 | 4,2 | 9,6 | 5,1 | 7,0 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 10,4 | 4,2 | 22,9 | 6,8 | 8,2 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 9,7 | 14,3 | 5,8 | 22,5 | 4,8 | 13,5 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 12,1 | 17,2 | 7,8 | 37,2 | 9,7 | 15,7 | 7,7 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 19,3 | 8,9 | 35,3 | 11,8 | 18,4 | 8,8 |
| | 50-74 ans | 9,5 | 13,4 | 6,0 | 15,5 | 5,8 | 12,9 | 6,1 |
| | 50-74 ans ** | 9,2 | 13,0 | 5,8 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,0 | 7,0 | 3,2 | 8,3 | 4,1 | 5,1 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 6,0 | 9,0 | 3,4 | 18,9 | 5,6 | 7,3 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 7,5 | 10,9 | 4,6 | 18,6 | 3,9 | 10,1 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 9,2 | 13,4 | 5,8 | 35,8 | 8,3 | 11,7 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 15,1 | 6,7 | 26,5 | 9,5 | 14,4 | 6,6 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 10,7 | 4,6 | 13,2 | 4,7 | 10,0 | 4,6 |
| | 50-74 ans ** | 7,3 | 10,4 | 4,5 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,2 | 8,9 | 3,7 | 10,2 | 4,8 | 7,0 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 7,0 | 10,4 | 3,8 | 21,2 | 5,6 | 8,5 | 3,5 |
| | 60-64 ans | 9,6 | 14,1 | 5,8 | 20,6 | 4,8 | 13,5 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 11,7 | 17,4 | 7,0 | 38,7 | 9,7 | 15,8 | 6,8 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 18,7 | 8,7 | 30,9 | 14,2 | 18,0 | 8,5 |
| | 50-74 ans | 9,3 | 13,4 | 5,6 | 15,3 | 5,6 | 12,9 | 5,7 |
| | 50-74 ans ** | 9,1 | 13,0 | 5,4 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 5,7 | 3,9 | 1,7 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 7,8 | 3,9 | 2,4 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,5 | 2,4 | 10,0 | 2,8 | 4,1 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 4,4 | 6,3 | 2,7 | 17,7 | 4,7 | 5,6 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 3,2 | 1,7 | 4,0 | 2,1 | 3,0 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,3 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 6,9 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 33,3 |
| | 55-59 ans | 13,5 | 12,5 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 20,0 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 3,4 | 6,3 | 14,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 9,7 | 13,6 | 3,6 | 14,3 | 0,0 | 13,5 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,0 |
| | 50-74 ans | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 4,9 | 9,5 | 8,3 | 6,6 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)