

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 031	486	545	340	362	146	183
	55-59 ans	967	444	523	136	137	308	386
	60-64 ans	1 107	518	589	132	134	386	455
	65-69 ans	1 193	578	615	109	88	469	527
	70-74 ans	930	440	490	73	61	367	429
	50-74 ans	5 228	2 466	2 762	790	782	1 676	1 980
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	81	38	43	29	36	9	7
	55-59 ans	64	28	36	15	13	13	23
	60-64 ans	60	24	36	11	11	13	25
	65-69 ans	63	33	30	9	8	24	22
	70-74 ans	62	30	32	10	5	20	27
	50-74 ans	330	153	177	74	73	79	104
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	29	34	22	28	7	6
	55-59 ans	52	21	31	8	11	13	20
	60-64 ans	47	19	28	9	6	10	22
	65-69 ans	53	30	23	7	5	23	18
	70-74 ans	48	21	27	5	2	16	25
	50-74 ans	263	120	143	51	52	69	91
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	18	9	9	7	8	2	1
	55-59 ans	12	7	5	7	2	0	3
	60-64 ans	13	5	8	2	5	3	3
	65-69 ans	10	3	7	2	3	1	4
	70-74 ans	14	9	5	5	3	4	2
	50-74 ans	67	33	34	23	21	10	13
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 013	477	536	333	354	144	182
	55-59 ans	955	437	518	129	135	308	383
	60-64 ans	1 094	513	581	130	129	383	452
	65-69 ans	1 183	575	608	107	85	468	523
	70-74 ans	916	431	485	68	58	363	427
	50-74 ans	5 161	2 433	2 728	767	761	1 666	1 967
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	22	22	20	13	2	9
	55-59 ans	30	13	17	3	5	10	12
	60-64 ans	45	24	21	9	5	15	16
	65-69 ans	49	30	19	11	3	19	16
	70-74 ans	33	25	8	7	1	18	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	201	114	87	50	27	64	60
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	44	22	22	20	13	2	9
	55-59 ans	30	13	17	3	5	10	12
	60-64 ans	45	24	21	9	5	15	16
	65-69 ans	49	30	19	11	3	19	16
	70-74 ans	33	25	8	7	1	18	7
	50-74 ans	201	114	87	50	27	64	60
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	26	14	12	13	6	1	6
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	26	15	11	4	3	11	8
	65-69 ans	30	16	14	7	1	9	13
	70-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
	50-74 ans	123	68	55	30	15	38	40
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	26	14	12	13	6	1	6
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	25	14	11	3	3	11	8
	65-69 ans	29	15	14	6	1	9	13
	70-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
	50-74 ans	121	66	55	28	15	38	40
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	26	14	12	13	6	1	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	26	15	11	4	3	11	8
	65-69 ans	30	16	14	7	1	9	13
	70-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
	50-74 ans	123	68	55	30	15	38	40
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	26	14	12	13	6	1	6
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	25	14	11	3	3	11	8
	65-69 ans	30	16	14	7	1	9	13
	70-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
	50-74 ans	122	67	55	29	15	38	40
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	26	14	12	13	6	1	6
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	26	15	11	4	3	11	8
	65-69 ans	30	16	14	7	1	9	13
	70-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
	50-74 ans	123	68	55	30	15	38	40
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	20	10	10	9	5	1	5
	55-59 ans	9	2	7	0	4	2	3
	60-64 ans	11	6	5	2	2	4	3
	65-69 ans	13	6	7	2	1	4	6
	70-74 ans	12	8	4	3	0	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	65	32	33	16	12	16	21
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	11	6	5	4	0	2	5
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	34	20	14	9	2	11	12
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	14	6	8	1	1	5	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	13	8	5	4	0	4	5
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	41	27	14	10	2	17	12
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	11	6	5	4	0	2	5
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	34	20	14	9	2	11	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	28	17	11	8	2	9	9
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	28	17	11	8	2	9	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	8	10	7	7	1	3
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	13	7	6	5	2	2	4
	65-69 ans	17	13	4	4	1	9	3
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	63	40	23	20	11	20	12

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	7,8	7,9	8,5	9,9	6,2	3,8
	55-59 ans	6,6	6,3	6,9	11,0	9,5	4,2	6,0
	60-64 ans	5,4	4,6	6,1	8,3	8,2	3,4	5,5
	65-69 ans	5,3	5,7	4,9	8,3	9,1	5,1	4,2
	70-74 ans	6,7	6,8	6,5	13,7	8,2	5,4	6,3
	50-74 ans	6,3	6,2	6,4	9,4	9,3	4,7	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,7	2,1	2,2	1,4	0,5
	55-59 ans	1,2	1,6	1,0	5,1	1,5	0,0	0,8
	60-64 ans	1,2	1,0	1,4	1,5	3,7	0,8	0,7
	65-69 ans	0,8	0,5	1,1	1,8	3,4	0,2	0,8
	70-74 ans	1,5	2,0	1,0	6,8	4,9	1,1	0,5
	50-74 ans	1,3	1,3	1,2	2,9	2,7	0,6	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,8	76,3	79,1	75,9	77,8	77,8	85,7
	55-59 ans	81,3	75,0	86,1	53,3	84,6	100,0	87,0
	60-64 ans	78,3	79,2	77,8	81,8	54,5	76,9	88,0
	65-69 ans	84,1	90,9	76,7	77,8	62,5	95,8	81,8
	70-74 ans	77,4	70,0	84,4	50,0	40,0	80,0	92,6
	50-74 ans	79,7	78,4	80,8	68,9	71,2	87,3	87,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,3	4,6	4,1	6,0	3,7	1,4	4,9
	55-59 ans	3,1	3,0	3,3	2,3	3,7	3,2	3,1
	60-64 ans	4,1	4,7	3,6	6,9	3,9	3,9	3,5
	65-69 ans	4,1	5,2	3,1	10,3	3,5	4,1	3,1
	70-74 ans	3,6	5,8	1,6	10,3	1,7	5,0	1,6
	50-74 ans	3,9	4,7	3,2	6,5	3,5	3,8	3,1
50-74 ans **	3,8	4,5	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	59,1	63,6	54,5	65,0	46,2	50,0	66,7
	55-59 ans	56,7	46,2	64,7	33,3	80,0	50,0	58,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	57,8	62,5	52,4	44,4	60,0	73,3	50,0
	65-69 ans	61,2	53,3	73,7	63,6	33,3	47,4	81,3
	70-74 ans	72,7	68,0	87,5	71,4	100,0	66,7	85,7
	50-74 ans	61,2	59,6	63,2	60,0	55,6	59,4	66,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	96,2	93,3	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	96,7	93,8	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	98,4	97,1	100,0	93,3	100,0	100,0	100,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	4
	60-64 ans	5	5	4	6	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	5	4	7	5	6	4	7
	50-74 ans	5	5	5	5	5	4	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-6,5)	2 (2-4)	2 (2-10)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-11)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2,5 (2-8,5)	2 (2-4)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	74	61	77	67	35	55
	55-59 ans	82	82	82	207	102	57	71
	60-64 ans	79	81	77	96	91	75	71
	65-69 ans	99	109	88	171	44	61	91
	70-74 ans	84	80	94	85	32	79	105
	50-74 ans	83	86	79	107	77	69	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (39-75)	56 (35-83)	60 (46-66)	60 (48-83)	60 (55-67)	35 (35-35)	58,5 (39-65)
	55-59 ans	74 (50-83)	71,5 (42-77)	79 (50-96)	207 (207-207)	82 (51,5-152)	69 (42-74)	79 (50-83)
	60-64 ans	74,5 (48-104)	78 (47-104)	74 (54-109)	83 (52-139)	109 (42-123)	78 (47-97)	73,5 (60,5-75)
	65-69 ans	59,5 (42-90)	60 (39,5-92)	59,5 (48-90)	88 (46-363)	44 (44-44)	42 (39-75)	69 (49-90)
	70-74 ans	57 (46,5-97,5)	60 (53-81)	49 (33-158)	69 (56-81)	32 (32-32)	57,5 (42,5-88,5)	53,5 (45-158)
	50-74 ans	65 (45-89)	63 (42-92,5)	66 (48-87)	69 (49-104)	60 (42-109)	61,5 (39-78)	66,5 (49-82,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	40,9	36,4	45,5	35,0	53,8	50,0	33,3
	55-59 ans	23,3	38,5	11,8	66,7	20,0	30,0	8,3
	60-64 ans	28,9	29,2	28,6	55,6	40,0	13,3	25,0
	65-69 ans	34,7	43,3	21,1	36,4	33,3	47,4	18,8
	70-74 ans	24,2	28,0	12,5	28,6	0,0	27,8	14,3
	50-74 ans	31,3	35,1	26,4	40,0	40,7	31,3	20,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	96,2	93,3	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,2	98,5	100,0	96,7	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	76,9	71,4	83,3	69,2	83,3	100,0	83,3
	55-59 ans	52,9	33,3	63,6	0,0	100,0	40,0	42,9
	60-64 ans	42,3	40,0	45,5	50,0	66,7	36,4	37,5
	65-69 ans	43,3	37,5	50,0	28,6	100,0	44,4	46,2
	70-74 ans	50,0	47,1	57,1	60,0	0,0	41,7	66,7
	50-74 ans	52,8	47,1	60,0	53,3	80,0	42,1	52,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3,8	7,1	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,9	16,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,7	13,3	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0
	65-69 ans	6,7	12,5	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0
	70-74 ans	4,2	5,9	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
	50-74 ans	5,7	10,3	0,0	3,3	0,0	15,8	0,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,2	21,4	16,7	23,1	16,7	0,0	16,7
	55-59 ans	29,4	50,0	18,2	100,0	0,0	40,0	28,6
	60-64 ans	26,9	20,0	36,4	0,0	33,3	27,3	37,5
	65-69 ans	36,7	37,5	35,7	57,1	0,0	22,2	38,5
	70-74 ans	25,0	29,4	14,3	20,0	0,0	33,3	16,7
	50-74 ans	27,6	29,4	25,5	30,0	13,3	28,9	30,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	4,2	5,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	1,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,8	6,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	1,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	11,8	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	28,6
	60-64 ans	15,4	13,3	18,2	0,0	0,0	18,2	25,0
	65-69 ans	13,3	12,5	14,3	14,3	0,0	11,1	15,4
	70-74 ans	16,7	11,8	28,6	0,0	100,0	16,7	16,7
	50-74 ans	11,4	8,8	14,5	3,3	6,7	13,2	17,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,8	6,7	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	1,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,4	3,7	12,0	2,8	0,0	5,5
	55-59 ans	6,3	9,2	3,9	7,8	0,0	9,7	5,2
	60-64 ans	8,2	9,7	6,9	0,0	7,8	13,1	6,6
	65-69 ans	11,0	13,9	8,2	37,4	0,0	8,5	9,6
	70-74 ans	7,6	13,9	2,1	14,7	0,0	13,8	2,3
	50-74 ans	7,9	11,1	5,1	13,0	2,6	10,2	6,1
	50-74 ans **	7,5	10,4	4,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,3	3,7	9,0	2,8	0,0	5,5
	55-59 ans	5,2	6,9	3,9	7,8	0,0	6,5	5,2
	60-64 ans	6,4	5,8	6,9	0,0	7,8	7,8	6,6
	65-69 ans	9,3	10,4	8,2	37,4	0,0	4,3	9,6
	70-74 ans	6,6	11,6	2,1	14,7	0,0	11,0	2,3
	50-74 ans	6,6	8,2	5,1	11,7	2,6	6,6	6,1
	50-74 ans **	6,2	7,7	4,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,2	1,9	6,0	2,8	0,0	0,0
	55-59 ans	5,2	6,9	3,9	7,8	0,0	6,5	5,2
	60-64 ans	4,6	3,9	5,2	0,0	7,8	5,2	4,4
	65-69 ans	8,5	10,4	6,6	37,4	0,0	4,3	7,6
	70-74 ans	5,5	9,3	2,1	14,7	0,0	8,3	2,3
	50-74 ans	5,4	7,0	4,0	10,4	2,6	5,4	4,6
	50-74 ans **	5,0	6,4	3,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,2	1,9	6,0	2,8	0,0	0,0
	55-59 ans	5,2	6,9	3,9	7,8	0,0	6,5	5,2
	60-64 ans	4,6	3,9	5,2	0,0	7,8	5,2	4,4
	65-69 ans	8,5	10,4	6,6	37,4	0,0	4,3	7,6
	70-74 ans	5,5	9,3	2,1	14,7	0,0	8,3	2,3
	50-74 ans	5,4	7,0	4,0	10,4	2,6	5,4	4,6
	50-74 ans **	5,0	6,4	3,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,1	2,3	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans **	0,1	0,3	0,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)