

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 58 - Nièvre

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 353	1 571	1 782	921	956	650	826
	55-59 ans	3 654	1 637	2 017	372	378	1 265	1 639
	60-64 ans	4 500	2 001	2 499	352	397	1 649	2 102
	65-69 ans	5 032	2 194	2 838	312	295	1 882	2 543
	70-74 ans	3 937	1 850	2 087	176	187	1 674	1 900
	50-74 ans	20 476	9 253	11 223	2 133	2 213	7 120	9 010
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	335	161	174	116	116	45	58
	55-59 ans	339	169	170	63	56	106	114
	60-64 ans	386	173	213	43	48	130	165
	65-69 ans	407	180	227	34	27	146	200
	70-74 ans	335	161	174	23	28	138	146
	50-74 ans	1 802	844	958	279	275	565	683
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	236	115	121	80	75	35	46
	55-59 ans	236	111	125	36	36	75	89
	60-64 ans	302	134	168	30	35	104	133
	65-69 ans	329	143	186	27	21	116	165
	70-74 ans	232	118	114	16	16	102	98
	50-74 ans	1 335	621	714	189	183	432	531
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	99	46	53	36	41	10	12
	55-59 ans	103	58	45	27	20	31	25
	60-64 ans	84	39	45	13	13	26	32
	65-69 ans	78	37	41	7	6	30	35
	70-74 ans	103	43	60	7	12	36	48
	50-74 ans	467	223	244	90	92	133	152
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 254	1 525	1 729	885	915	640	814
	55-59 ans	3 551	1 579	1 972	345	358	1 234	1 614
	60-64 ans	4 416	1 962	2 454	339	384	1 623	2 070
	65-69 ans	4 954	2 157	2 797	305	289	1 852	2 508
	70-74 ans	3 834	1 807	2 027	169	175	1 638	1 852
	50-74 ans	20 009	9 030	10 979	2 043	2 121	6 987	8 858
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	94	45	49	27	27	18	22
	55-59 ans	126	69	57	21	18	48	39
	60-64 ans	212	109	103	29	17	80	86
	65-69 ans	226	137	89	26	16	111	73
	70-74 ans	213	123	90	17	13	106	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	871	483	388	120	91	363	297
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	93	44	49	27	27	17	22
	55-59 ans	126	69	57	21	18	48	39
	60-64 ans	210	107	103	29	17	78	86
	65-69 ans	220	132	88	26	15	106	73
	70-74 ans	207	119	88	16	13	103	75
	50-74 ans	856	471	385	119	90	352	295
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	84	41	43	26	22	15	21
	55-59 ans	116	61	55	19	18	42	37
	60-64 ans	195	103	92	25	15	78	77
	65-69 ans	199	116	83	20	13	96	70
	70-74 ans	195	111	84	15	12	96	72
	50-74 ans	789	432	357	105	80	327	277
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	83	41	42	26	22	15	20
	55-59 ans	113	61	52	19	16	42	36
	60-64 ans	192	103	89	25	14	78	75
	65-69 ans	198	116	82	20	13	96	69
	70-74 ans	192	110	82	14	12	96	70
	50-74 ans	778	431	347	104	77	327	270
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	83	41	42	26	22	15	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	115	61	54	19	18	42	36
	60-64 ans	192	103	89	25	14	78	75
	65-69 ans	197	115	82	20	13	95	69
	70-74 ans	193	110	83	14	12	96	71
	50-74 ans	780	430	350	104	79	326	271
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	9	2	7	1	1	1	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	83	41	42	26	21	15	21
	55-59 ans	115	61	54	19	18	42	36
	60-64 ans	195	103	92	25	15	78	77
	65-69 ans	199	116	83	20	13	96	70
	70-74 ans	195	111	84	15	12	96	72
	50-74 ans	787	432	355	105	79	327	276
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	84	41	43	26	22	15	21
	55-59 ans	117	62	55	19	18	43	37
	60-64 ans	198	103	95	25	15	78	80
	65-69 ans	201	118	83	20	13	98	70
	70-74 ans	197	112	85	15	12	97	73
	50-74 ans	797	436	361	105	80	331	281
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	19	21	12	9	7	12
	55-59 ans	41	18	23	7	7	11	16
	60-64 ans	55	15	40	4	6	11	34
	65-69 ans	64	30	34	7	4	23	30
	70-74 ans	61	23	38	6	5	17	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	261	105	156	36	31	69	125
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	0	0	2	2
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	26	14	12	4	0	10	12
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
	50-74 ans	58	36	22	9	0	27	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	6	8	5	6	1	2
	55-59 ans	19	13	6	3	2	10	4
	60-64 ans	37	21	16	6	0	15	16
	65-69 ans	49	32	17	7	5	25	12
	70-74 ans	46	32	14	2	2	30	12
	50-74 ans	165	104	61	23	15	81	46
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	20	12	8	8	4	4	4
	55-59 ans	40	22	18	4	6	18	12
	60-64 ans	54	37	17	8	6	29	11
	65-69 ans	58	34	24	5	3	29	21
	70-74 ans	47	31	16	2	2	29	14
	50-74 ans	219	136	83	27	21	109	62
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	14	7	7	2	2	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	33	20	13	8	5	12	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	7	4	3	0	2	4	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	20	11	9	0	4	11	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	9	6	3	0	1	6	2
	50-74 ans	27	19	8	1	1	18	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	2	8	0	3	2	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	34	18	16	13	10	5	6
	55-59 ans	59	35	24	7	8	28	16
	60-64 ans	91	58	33	14	6	44	27
	65-69 ans	107	66	41	12	8	54	33
	70-74 ans	93	63	30	4	4	59	26
	50-74 ans	384	240	144	50	36	190	108
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	20	12	8	8	4	4	4
	55-59 ans	40	22	18	4	6	18	12
	60-64 ans	54	37	17	8	6	29	11
	65-69 ans	58	34	24	5	3	29	21
	70-74 ans	47	31	16	2	2	29	14
	50-74 ans	219	136	83	27	21	109	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	12	7	8	4	4	3
	55-59 ans	35	20	15	3	4	17	11
	60-64 ans	49	34	15	7	6	27	9
	65-69 ans	54	32	22	5	3	27	19
	70-74 ans	43	28	15	2	2	26	13
	50-74 ans	200	126	74	25	19	101	55
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	12	7	8	4	4	3
	55-59 ans	35	20	15	3	4	17	11
	60-64 ans	56	39	17	9	6	30	11
	65-69 ans	61	38	23	8	4	30	19
	70-74 ans	52	36	16	2	2	34	14
	50-74 ans	223	145	78	30	20	115	58
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	14	7	7	2	2	5	5
	50-74 ans	33	20	13	8	5	12	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	14	7	7	2	2	5	5
	50-74 ans	32	19	13	8	5	11	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	11	6	5	2	3	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
	50-74 ans	21	13	8	6	2	7	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	20	13	7	6	2	7	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	12	6	6	2	1	4	5
	50-74 ans	27	17	10	8	2	9	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	6	3	3	3	1	0	2
	65-69 ans	8	7	1	3	1	4	0
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	31	20	11	8	5	12	6

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,0	10,2	9,8	12,6	12,1	6,9	7,0
	55-59 ans	9,3	10,3	8,4	16,9	14,8	8,4	7,0
	60-64 ans	8,6	8,6	8,5	12,2	12,1	7,9	7,8
	65-69 ans	8,1	8,2	8,0	10,9	9,2	7,8	7,9
	70-74 ans	8,5	8,7	8,3	13,1	15,0	8,2	7,7
	50-74 ans	8,8	9,1	8,5	13,1	12,4	7,9	7,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,0	2,9	3,0	3,9	4,3	1,5	1,5
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	7,3	5,3	2,5	1,5
	60-64 ans	1,9	1,9	1,8	3,7	3,3	1,6	1,5
	65-69 ans	1,6	1,7	1,4	2,2	2,0	1,6	1,4
	70-74 ans	2,6	2,3	2,9	4,0	6,4	2,2	2,5
	50-74 ans	2,3	2,4	2,2	4,2	4,2	1,9	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,4	71,4	69,5	69,0	64,7	77,8	79,3
	55-59 ans	69,6	65,7	73,5	57,1	64,3	70,8	78,1
	60-64 ans	78,2	77,5	78,9	69,8	72,9	80,0	80,6
	65-69 ans	80,8	79,4	81,9	79,4	77,8	79,5	82,5
	70-74 ans	69,3	73,3	65,5	69,6	57,1	73,9	67,1
	50-74 ans	74,1	73,6	74,5	67,7	66,5	76,5	77,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,0	2,8	3,1	3,0	2,8	2,7
	55-59 ans	3,5	4,4	2,9	6,1	5,0	3,9	2,4
	60-64 ans	4,8	5,6	4,2	8,6	4,4	4,9	4,2
	65-69 ans	4,6	6,4	3,2	8,5	5,5	6,0	2,9
	70-74 ans	5,6	6,8	4,4	10,1	7,4	6,5	4,2
	50-74 ans	4,4	5,3	3,5	5,9	4,3	5,2	3,4
50-74 ans **	4,1	4,9	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	97,8	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,1	98,2	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0
	65-69 ans	97,3	96,4	98,9	100,0	93,8	95,5	100,0
	70-74 ans	97,2	96,7	97,8	94,1	100,0	97,2	97,4
	50-74 ans	98,3	97,5	99,2	99,2	98,9	97,0	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,3	93,2	87,8	96,3	81,5	88,2	95,5
	55-59 ans	92,1	88,4	96,5	90,5	100,0	87,5	94,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,9	96,3	89,3	86,2	88,2	100,0	89,5
	65-69 ans	90,5	87,9	94,3	76,9	86,7	90,6	95,9
	70-74 ans	94,2	93,3	95,5	93,8	92,3	93,2	96,0
	50-74 ans	92,2	91,7	92,7	88,2	88,9	92,9	93,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	95,2
	55-59 ans	97,4	100,0	94,5	100,0	88,9	100,0	97,3
	60-64 ans	98,5	100,0	96,7	100,0	93,3	100,0	97,4
	65-69 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6
	70-74 ans	98,5	99,1	97,6	93,3	100,0	100,0	97,2
	50-74 ans	98,6	99,8	97,2	99,0	96,3	100,0	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	6	5	5	5	6	5
	60-64 ans	5	5	6	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	7	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-11)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6,5)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	92	97	97	88	83	107
	55-59 ans	111	99	125	88	122	103	127
	60-64 ans	113	107	119	120	104	103	122
	65-69 ans	104	105	103	138	88	98	106
	70-74 ans	93	93	93	100	87	92	94
	50-74 ans	104	100	108	109	99	98	110
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (55,5-108,5)	65 (56-84)	90 (55-121)	62 (56-75)	89,5 (51-104)	70 (59-104)	95 (60-140)
	55-59 ans	87 (53,5-116,5)	85 (53-104)	89 (54-165)	70 (55-101)	86 (54-173)	89,5 (42-112)	97 (63-164)
	60-64 ans	81 (55-126)	81 (55-110)	81 (55-134,5)	63 (49-105)	63 (35-168)	81,5 (56-110)	83 (59-133)
	65-69 ans	76 (53-119)	73 (52,5-112)	80 (54-132)	108 (58-193,5)	66 (44-95)	70,5 (50-103)	82,5 (58-132)
	70-74 ans	77 (53-113)	77 (54-111)	79,5 (52,5-119,5)	66 (47-92)	71,5 (46-100)	77 (57,5-112)	81,5 (53,5-121)
	50-74 ans	78 (54-118)	75 (54-109)	83 (54-126)	67 (54-105)	75 (43,5-115)	78 (54-109)	83 (57-129)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,3	4,4	6,1	0,0	7,4	11,1	4,5
	55-59 ans	4,0	5,8	1,8	4,8	0,0	6,3	2,6
	60-64 ans	2,8	2,8	2,9	10,3	5,9	0,0	2,3
	65-69 ans	3,5	5,1	1,1	11,5	6,3	3,6	0,0
	70-74 ans	3,3	3,3	3,3	5,9	7,7	2,8	2,6
	50-74 ans	3,6	4,1	2,8	6,7	5,5	3,3	2,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	100,0	97,7	100,0	95,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	97,3
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	98,8	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,6	46,3	48,8	46,2	40,9	46,7	57,1
	55-59 ans	35,0	29,0	41,8	36,8	38,9	25,6	43,2
	60-64 ans	27,8	14,6	42,1	16,0	40,0	14,1	42,5
	65-69 ans	31,8	25,4	41,0	35,0	30,8	23,5	42,9
	70-74 ans	31,0	20,5	44,7	40,0	41,7	17,5	45,2
	50-74 ans	32,7	24,1	43,2	34,3	38,8	20,8	44,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	4,9	4,7	0,0	0,0	13,3	9,5
	55-59 ans	5,1	6,5	3,6	10,5	0,0	4,7	5,4
	60-64 ans	13,1	13,6	12,6	16,0	0,0	12,8	15,0
	65-69 ans	5,5	6,8	3,6	0,0	0,0	8,2	4,3
	70-74 ans	5,6	7,1	3,5	20,0	0,0	5,2	4,1
	50-74 ans	7,3	8,3	6,1	8,6	0,0	8,2	7,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	1,9	1,1	4,0	0,0	1,3	1,3
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	1,0	0,0	0,6	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,7	14,6	18,6	19,2	27,3	6,7	9,5
	55-59 ans	16,2	21,0	10,9	15,8	11,1	23,3	10,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,7	20,4	16,8	24,0	0,0	19,2	20,0
	65-69 ans	24,4	27,1	20,5	35,0	38,5	25,5	17,1
	70-74 ans	23,4	28,6	16,5	13,3	16,7	30,9	16,4
	50-74 ans	20,7	23,9	16,9	21,9	18,8	24,5	16,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,8	29,3	18,6	30,8	18,2	26,7	19,0
	55-59 ans	34,2	35,5	32,7	21,1	33,3	41,9	32,4
	60-64 ans	27,3	35,9	17,9	32,0	40,0	37,2	13,8
	65-69 ans	28,9	28,8	28,9	25,0	23,1	29,6	30,0
	70-74 ans	23,9	27,7	18,8	13,3	16,7	29,9	19,2
	50-74 ans	27,5	31,2	23,0	25,7	26,3	32,9	22,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,9	2,3	3,8	4,5	6,7	0,0
	55-59 ans	2,6	3,2	1,8	10,5	5,6	0,0	0,0
	60-64 ans	3,5	4,9	2,1	8,0	6,7	3,8	1,3
	65-69 ans	3,0	3,4	2,4	5,0	0,0	3,1	2,9
	70-74 ans	7,1	6,3	8,2	13,3	16,7	5,2	6,8
	50-74 ans	4,1	4,6	3,6	7,6	6,3	3,6	2,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	0,0	2,3	0,0	4,5	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	0,0	3,6	0,0	5,6	0,0	2,7
	60-64 ans	3,5	3,9	3,2	0,0	13,3	5,1	1,3
	65-69 ans	1,5	2,5	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	70-74 ans	3,6	3,6	3,5	0,0	0,0	4,1	4,1
	50-74 ans	2,5	2,5	2,5	0,0	5,0	3,3	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,6	4,8	0,0	5,3	0,0	4,7	0,0
	60-64 ans	3,5	3,9	3,2	0,0	0,0	5,1	3,8
	65-69 ans	4,0	5,1	2,4	0,0	0,0	6,1	2,9
	70-74 ans	4,6	5,4	3,5	0,0	8,3	6,2	2,7
	50-74 ans	3,4	4,4	2,2	1,0	1,3	5,4	2,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	0,0	4,7	0,0	4,5	0,0	4,8
	55-59 ans	2,6	0,0	5,5	0,0	5,6	0,0	5,4
	60-64 ans	1,0	1,0	1,1	0,0	0,0	1,3	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,0	0,8	1,2	0,0	7,7	1,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4
	50-74 ans	1,3	0,5	2,2	0,0	3,8	0,6	1,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	11,8	9,3	14,7	10,9	7,8	7,4
	55-59 ans	16,6	22,2	12,2	20,3	22,3	22,7	9,9
	60-64 ans	20,6	29,6	13,4	41,3	15,6	27,1	13,0
	65-69 ans	21,6	30,6	14,7	39,3	27,7	29,2	13,2
	70-74 ans	24,3	34,9	14,8	23,7	22,9	36,0	14,0
	50-74 ans	19,2	26,6	13,1	24,5	17,0	27,2	12,2
	50-74 ans **	18,1	24,1	12,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	7,9	4,6	9,0	4,4	6,3	4,9
	55-59 ans	11,3	13,9	9,1	11,6	16,8	14,6	7,4
	60-64 ans	12,2	18,9	6,9	23,6	15,6	17,9	5,3
	65-69 ans	11,7	15,8	8,6	16,4	10,4	15,7	8,4
	70-74 ans	12,3	17,2	7,9	11,8	11,4	17,7	7,6
	50-74 ans	10,9	15,1	7,6	13,2	9,9	15,6	7,0
	50-74 ans **	10,6	14,2	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,9	4,0	9,0	4,4	6,3	3,7
	55-59 ans	9,9	12,7	7,6	8,7	11,2	13,8	6,8
	60-64 ans	11,1	17,3	6,1	20,6	15,6	16,6	4,3
	65-69 ans	10,9	14,8	7,9	16,4	10,4	14,6	7,6
	70-74 ans	11,2	15,5	7,4	11,8	11,4	15,9	7,0
	50-74 ans	10,0	14,0	6,7	12,2	9,0	14,5	6,2
	50-74 ans **	9,7	13,2	6,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,9	4,0	9,0	4,4	6,3	3,7
	55-59 ans	9,9	12,7	7,6	8,7	11,2	13,8	6,8
	60-64 ans	12,7	19,9	6,9	26,5	15,6	18,5	5,3
	65-69 ans	12,3	17,6	8,2	26,2	13,8	16,2	7,6
	70-74 ans	13,6	19,9	7,9	11,8	11,4	20,8	7,6
	50-74 ans	11,1	16,1	7,1	14,7	9,4	16,5	6,5
	50-74 ans **	10,6	14,7	6,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,1	1,1	1,6	0,0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,5	5,8	2,8	0,0	0,0
	60-64 ans	1,6	2,5	0,8	5,9	2,6	1,8	0,5
	65-69 ans	1,2	1,9	0,7	3,3	0,0	1,6	0,8
	70-74 ans	3,7	3,9	3,5	11,8	11,4	3,1	2,7
	50-74 ans	1,6	2,2	1,2	3,9	2,4	1,7	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,0	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	33,3	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	60-64 ans	28,6	20,0	50,0	0,0	100,0	33,3	0,0
	65-69 ans	33,3	50,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0
	70-74 ans	35,7	28,6	42,9	50,0	50,0	20,0	40,0
	50-74 ans	34,4	31,6	38,5	25,0	60,0	36,4	25,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)