

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 337	4 428	4 909	2 796	3 046	1 632	1 863
	55-59 ans	8 989	4 176	4 813	820	893	3 356	3 920
	60-64 ans	9 519	4 280	5 239	638	643	3 642	4 596
	65-69 ans	9 489	4 326	5 163	512	519	3 814	4 644
	70-74 ans	7 668	3 468	4 200	308	361	3 160	3 839
	50-74 ans	45 002	20 678	24 324	5 074	5 462	15 604	18 862
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	619	316	303	238	218	78	85
	55-59 ans	601	299	302	102	99	197	203
	60-64 ans	579	262	317	62	71	200	246
	65-69 ans	511	229	282	35	42	194	240
	70-74 ans	405	187	218	29	33	158	185
	50-74 ans	2 715	1 293	1 422	466	463	827	959
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	420	216	204	156	143	60	61
	55-59 ans	405	199	206	62	56	137	150
	60-64 ans	426	192	234	38	45	154	189
	65-69 ans	386	171	215	16	27	155	188
	70-74 ans	311	144	167	19	23	125	144
	50-74 ans	1 948	922	1 026	291	294	631	732
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	199	100	99	82	75	18	24
	55-59 ans	196	100	96	40	43	60	53
	60-64 ans	153	70	83	24	26	46	57
	65-69 ans	125	58	67	19	15	39	52
	70-74 ans	94	43	51	10	10	33	41
	50-74 ans	767	371	396	175	169	196	227
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 138	4 328	4 810	2 714	2 971	1 614	1 839
	55-59 ans	8 793	4 076	4 717	780	850	3 296	3 867
	60-64 ans	9 366	4 210	5 156	614	617	3 596	4 539
	65-69 ans	9 364	4 268	5 096	493	504	3 775	4 592
	70-74 ans	7 574	3 425	4 149	298	351	3 127	3 798
	50-74 ans	44 235	20 307	23 928	4 899	5 293	15 408	18 635
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	349	177	172	130	125	47	47
	55-59 ans	359	210	149	68	37	142	112
	60-64 ans	437	238	199	58	25	180	174
	65-69 ans	459	274	185	44	31	230	154
	70-74 ans	406	228	178	31	24	197	154

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 010	1 127	883	331	242	796	641
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	348	176	172	129	125	47	47
	55-59 ans	357	209	148	67	36	142	112
	60-64 ans	432	235	197	58	25	177	172
	65-69 ans	457	273	184	44	31	229	153
	70-74 ans	405	227	178	30	24	197	154
	50-74 ans	1 999	1 120	879	328	241	792	638
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	297	150	147	105	107	45	40
	55-59 ans	295	169	126	47	28	122	98
	60-64 ans	376	208	168	49	19	159	149
	65-69 ans	396	228	168	36	26	192	142
	70-74 ans	351	196	155	24	22	172	133
	50-74 ans	1 715	951	764	261	202	690	562
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	288	147	141	105	103	42	38
	55-59 ans	285	163	122	46	25	117	97
	60-64 ans	361	201	160	46	19	155	141
	65-69 ans	372	217	155	34	23	183	132
	70-74 ans	338	186	152	22	22	164	130
	50-74 ans	1 644	914	730	253	192	661	538
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	295	150	145	105	106	45	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	291	167	124	46	26	121	98
	60-64 ans	372	208	164	49	19	159	145
	65-69 ans	386	224	162	36	24	188	138
	70-74 ans	350	195	155	23	22	172	133
	50-74 ans	1 694	944	750	259	197	685	553
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	10	4	6	0	2	4	4
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	21	7	14	2	5	5	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	1	1	5	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	294	149	145	105	106	44	39
	55-59 ans	291	167	124	46	26	121	98
	60-64 ans	373	208	165	49	19	159	146
	65-69 ans	389	228	161	36	23	192	138
	70-74 ans	350	196	154	24	22	172	132
	50-74 ans	1 697	948	749	260	196	688	553
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	297	150	147	105	107	45	40
	55-59 ans	296	169	127	47	29	122	98
	60-64 ans	379	211	168	49	19	162	149
	65-69 ans	397	229	168	36	26	193	142
	70-74 ans	353	198	155	25	22	173	133
	50-74 ans	1 722	957	765	262	203	695	562
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	135	61	74	43	55	18	19
	55-59 ans	113	54	59	10	17	44	42
	60-64 ans	130	59	71	9	6	50	65
	65-69 ans	115	51	64	4	11	47	53
	70-74 ans	105	49	56	6	7	43	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	598	274	324	72	96	202	228
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	22	8	14	6	11	2	3
	55-59 ans	22	12	10	2	3	10	7
	60-64 ans	25	13	12	4	1	9	11
	65-69 ans	20	15	5	1	0	14	5
	70-74 ans	15	5	10	0	2	5	8
	50-74 ans	104	53	51	13	17	40	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	34	20	14	14	8	6	6
	55-59 ans	48	29	19	8	1	21	18
	60-64 ans	78	46	32	13	5	33	27
	65-69 ans	88	58	30	6	7	52	23
	70-74 ans	72	44	28	3	0	41	28
	50-74 ans	320	197	123	44	21	153	102
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	71	40	31	28	22	12	9
	55-59 ans	74	49	25	18	5	31	20
	60-64 ans	88	58	30	15	5	43	25
	65-69 ans	112	64	48	14	4	50	44
	70-74 ans	109	72	37	10	6	62	31
	50-74 ans	454	283	171	85	42	198	129
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	11	9	7	7	4	2
	55-59 ans	16	9	7	5	1	4	6
	60-64 ans	37	23	14	6	1	17	13
	65-69 ans	39	26	13	9	3	17	10
	70-74 ans	29	15	14	3	6	12	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	141	84	57	30	18	54	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	25	14	11	3	2	11	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	13	8	5	1	2	7	3
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	13	10	3	2	0	8	3
	70-74 ans	16	11	5	3	0	8	5
	50-74 ans	65	44	21	13	5	31	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	105	60	45	42	30	18	15
	55-59 ans	122	78	44	26	6	52	38
	60-64 ans	166	104	62	28	10	76	52
	65-69 ans	200	122	78	20	11	102	67
	70-74 ans	181	116	65	13	6	103	59
	50-74 ans	774	480	294	129	63	351	231
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	71	40	31	28	22	12	9
	55-59 ans	74	49	25	18	5	31	20
	60-64 ans	88	58	30	15	5	43	25
	65-69 ans	112	64	48	14	4	50	44
	70-74 ans	109	72	37	10	6	62	31
	50-74 ans	454	283	171	85	42	198	129

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	58	35	23	24	17	11	6
	55-59 ans	60	40	20	15	4	25	16
	60-64 ans	76	51	25	14	5	37	20
	65-69 ans	83	46	37	8	4	38	33
	70-74 ans	82	55	27	9	3	46	24
	50-74 ans	359	227	132	70	33	157	99
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	68	40	28	28	20	12	8
	55-59 ans	70	46	24	16	4	30	20
	60-64 ans	91	63	28	16	6	47	22
	65-69 ans	108	66	42	13	5	53	37
	70-74 ans	107	73	34	10	5	63	29
	50-74 ans	444	288	156	83	40	205	116
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	11	9	7	7	4	2
	55-59 ans	16	9	7	5	1	4	6
	60-64 ans	37	23	14	6	1	17	13
	65-69 ans	39	26	13	9	3	17	10
	70-74 ans	29	15	14	3	6	12	8
	50-74 ans	141	84	57	30	18	54	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	11	9	7	7	4	2
	55-59 ans	16	9	7	5	1	4	6
	60-64 ans	36	22	14	6	1	16	13
	65-69 ans	38	25	13	8	3	17	10
	70-74 ans	29	15	14	3	6	12	8
	50-74 ans	139	82	57	29	18	53	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
	50-74 ans	23	12	11	4	3	8	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	16	9	7	6	6	3	1
	55-59 ans	14	9	5	5	1	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	30	18	12	6	1	12	11
	65-69 ans	34	22	12	6	3	16	9
	70-74 ans	22	12	10	2	4	10	6
	50-74 ans	116	70	46	25	15	45	31
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	2	6	1	5	1	1
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	21	12	9	5	1	7	8
	65-69 ans	15	10	5	3	2	7	3
	70-74 ans	18	11	7	2	2	9	5
	50-74 ans	69	40	29	14	10	26	19
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	19	12	7	3	1	9	6
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	47	30	17	11	5	19	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	0	5	0	4	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	32	14	18	5	8	9	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	15	12	3	3	0	9	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	14	7	7	3	2	4	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	7	1	3	0	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	10	7	7	6	3	1
	55-59 ans	15	8	7	4	1	4	6
	60-64 ans	33	20	13	6	1	14	12
	65-69 ans	33	21	12	7	3	14	9
	70-74 ans	25	13	12	2	5	11	7
	50-74 ans	123	72	51	26	16	46	35
A40- Perdus de vue	50-54 ans	39	21	18	20	13	1	5
	55-59 ans	47	31	16	16	6	15	10
	60-64 ans	35	16	19	4	3	12	16
	65-69 ans	51	37	14	6	4	31	10
	70-74 ans	34	20	14	4	1	16	13
	50-74 ans	206	125	81	50	27	75	54

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,1	6,2	8,5	7,2	4,8	4,6
	55-59 ans	6,7	7,2	6,3	12,4	11,1	5,9	5,2
	60-64 ans	6,1	6,1	6,1	9,7	11,0	5,5	5,4
	65-69 ans	5,4	5,3	5,5	6,8	8,1	5,1	5,2
	70-74 ans	5,3	5,4	5,2	9,4	9,1	5,0	4,8
	50-74 ans	6,0	6,3	5,8	9,2	8,5	5,3	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	2,0	2,9	2,5	1,1	1,3
	55-59 ans	2,2	2,4	2,0	4,9	4,8	1,8	1,4
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,8	4,0	1,3	1,2
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	3,7	2,9	1,0	1,1
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	3,2	2,8	1,0	1,1
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	3,4	3,1	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,9	68,4	67,3	65,5	65,6	76,9	71,8
	55-59 ans	67,4	66,6	68,2	60,8	56,6	69,5	73,9
	60-64 ans	73,6	73,3	73,8	61,3	63,4	77,0	76,8
	65-69 ans	75,5	74,7	76,2	45,7	64,3	79,9	78,3
	70-74 ans	76,8	77,0	76,6	65,5	69,7	79,1	77,8
	50-74 ans	71,7	71,3	72,2	62,4	63,5	76,3	76,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,1	3,6	4,8	4,2	2,9	2,6
	55-59 ans	4,1	5,2	3,2	8,7	4,4	4,3	2,9
	60-64 ans	4,7	5,7	3,9	9,4	4,1	5,0	3,8
	65-69 ans	4,9	6,4	3,6	8,9	6,2	6,1	3,4
	70-74 ans	5,4	6,7	4,3	10,4	6,8	6,3	4,1
	50-74 ans	4,5	5,5	3,7	6,8	4,6	5,2	3,4
50-74 ans **	4,5	5,4	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,4	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,5	99,3	98,5	97,3	100,0	100,0
	60-64 ans	98,9	98,7	99,0	100,0	100,0	98,3	98,9
	65-69 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	100,0	99,6	99,4
	70-74 ans	99,8	99,6	100,0	96,8	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	99,4	99,5	99,1	99,6	99,5	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,3	85,2	85,5	81,4	85,6	95,7	85,1
	55-59 ans	82,6	80,9	85,1	70,1	77,8	85,9	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,0	88,5	85,3	84,5	76,0	89,8	86,6
	65-69 ans	86,7	83,5	91,3	81,8	83,9	83,8	92,8
	70-74 ans	86,7	86,3	87,1	80,0	91,7	87,3	86,4
	50-74 ans	85,8	84,9	86,9	79,6	83,8	87,1	88,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,0	98,0	95,9	100,0	96,3	93,3	95,0
	55-59 ans	96,6	96,4	96,8	97,9	89,3	95,9	99,0
	60-64 ans	96,0	96,6	95,2	93,9	100,0	97,5	94,6
	65-69 ans	93,9	95,2	92,3	94,4	88,5	95,3	93,0
	70-74 ans	96,3	94,9	98,1	91,7	100,0	95,3	97,7
	50-74 ans	95,9	96,1	95,5	96,9	95,0	95,8	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	4	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	7	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	89	102	90	108	85	87
	55-59 ans	100	98	104	93	112	100	101
	60-64 ans	91	91	90	99	85	89	91
	65-69 ans	94	93	94	96	101	93	92
	70-74 ans	88	87	89	92	95	87	88
	50-74 ans	93	92	95	93	104	91	92
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (53-107)	72,5 (53-103)	77 (52-119)	72 (53-104)	82 (48-130)	74 (53-101)	73,5 (60-99,5)
	55-59 ans	79 (55-110)	79 (55-107)	78,5 (56-111)	77 (51-107)	85 (49,5-122)	79 (56-110)	76,5 (56-109)
	60-64 ans	70 (49-107)	70,5 (51-104,5)	69 (46,5-113,5)	72 (53-98)	70 (38-109)	70 (50-106)	69 (48-115)
	65-69 ans	76 (49,5-110,5)	71,5 (50-109,5)	77,5 (49-113,5)	87 (55,5-116,5)	76,5 (40-139)	68 (49-109)	78,5 (52-110)
	70-74 ans	75 (50-109)	77 (53,5-109)	70 (48-108)	84,5 (48,5-133,5)	90,5 (54-118)	77 (55-104,5)	69 (48-102)
	50-74 ans	75 (51-109)	74 (53-106)	76 (50-112,5)	74 (53-106)	82,5 (48-124)	74 (53-106)	74 (51-109)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,2	11,9	10,5	15,4	10,4	2,1	10,6
	55-59 ans	13,1	14,8	10,7	23,5	16,2	10,6	8,9
	60-64 ans	8,0	6,7	9,5	6,9	12,0	6,7	9,2
	65-69 ans	11,1	13,5	7,6	13,6	12,9	13,5	6,5
	70-74 ans	8,4	8,8	7,9	12,9	4,2	8,1	8,4
	50-74 ans	10,2	11,1	9,2	15,1	11,2	9,4	8,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,0	99,3	98,6	100,0	99,1	97,8	97,5
	55-59 ans	98,6	98,8	98,4	97,9	92,9	99,2	100,0
	60-64 ans	99,2	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	98,0
	65-69 ans	98,2	100,0	95,8	100,0	88,5	100,0	97,2
	70-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,2
	50-74 ans	99,0	99,7	98,0	99,6	97,0	99,7	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,5	40,7	50,3	41,0	51,4	40,0	47,5
	55-59 ans	38,2	32,0	46,5	21,3	58,6	36,1	42,9
	60-64 ans	34,3	28,0	42,3	18,4	31,6	30,9	43,6
	65-69 ans	29,0	22,3	38,1	11,1	42,3	24,4	37,3
	70-74 ans	29,7	24,7	36,1	24,0	31,8	24,9	36,8
	50-74 ans	34,7	28,6	42,4	27,5	47,3	29,1	40,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	5,3	9,5	5,7	10,3	4,4	7,5
	55-59 ans	7,4	7,1	7,9	4,3	10,3	8,2	7,1
	60-64 ans	6,6	6,2	7,1	8,2	5,3	5,6	7,4
	65-69 ans	5,0	6,6	3,0	2,8	0,0	7,3	3,5
	70-74 ans	4,2	2,5	6,5	0,0	9,1	2,9	6,0
	50-74 ans	6,0	5,5	6,7	5,0	8,4	5,8	6,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,8	0,0	2,1	0,0	1,6	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,8	0,5	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,4	13,3	9,5	13,3	7,5	13,3	15,0
	55-59 ans	16,2	17,2	15,0	17,0	3,4	17,2	18,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,6	21,8	19,0	26,5	26,3	20,4	18,1
	65-69 ans	22,2	25,3	17,9	16,7	26,9	26,9	16,2
	70-74 ans	20,4	22,2	18,1	12,0	0,0	23,7	21,1
	50-74 ans	18,6	20,6	16,1	16,8	10,3	22,0	18,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,9	26,7	21,1	26,7	20,6	26,7	22,5
	55-59 ans	25,0	29,0	19,7	38,3	17,2	25,4	20,4
	60-64 ans	23,2	27,5	17,9	30,6	26,3	26,5	16,8
	65-69 ans	28,2	27,9	28,6	38,9	15,4	25,9	31,0
	70-74 ans	30,9	36,4	23,9	40,0	27,3	35,8	23,3
	50-74 ans	26,4	29,6	22,4	32,4	20,7	28,5	23,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	7,3	6,1	6,7	6,5	8,9	5,0
	55-59 ans	5,4	5,3	5,5	10,6	3,4	3,3	6,1
	60-64 ans	9,8	10,9	8,3	12,2	5,3	10,5	8,7
	65-69 ans	9,8	11,4	7,7	25,0	11,5	8,8	7,0
	70-74 ans	8,2	7,6	9,0	12,0	27,3	6,9	6,0
	50-74 ans	8,2	8,8	7,5	11,5	8,9	7,8	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	2,0	0,7	1,0	0,9	4,4	0,0
	55-59 ans	2,4	3,0	1,6	4,3	0,0	2,5	2,0
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	0,0	0,0	1,2	1,3
	65-69 ans	1,5	1,7	1,2	0,0	0,0	2,1	1,4
	70-74 ans	1,1	0,0	2,6	0,0	4,5	0,0	2,3
	50-74 ans	1,5	1,5	1,4	1,1	1,0	1,6	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	3,3	1,4	4,8	1,9	0,0	0,0
	55-59 ans	4,4	4,7	3,9	2,1	6,9	5,7	3,1
	60-64 ans	4,2	4,7	3,6	4,1	5,3	4,9	3,4
	65-69 ans	3,3	4,4	1,8	5,6	0,0	4,1	2,1
	70-74 ans	4,5	5,6	3,2	12,0	0,0	4,6	3,8
	50-74 ans	3,8	4,6	2,7	5,0	2,5	4,5	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	2,2	2,5
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	3,8	0,0	0,7
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	50-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	0,5	0,1	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,5	13,9	9,4	15,5	10,1	11,2	8,2
	55-59 ans	13,9	19,1	9,3	33,3	7,1	15,8	9,8
	60-64 ans	17,7	24,7	12,0	45,6	16,2	21,1	11,5
	65-69 ans	21,4	28,6	15,3	40,6	21,8	27,0	14,6
	70-74 ans	23,9	33,9	15,7	43,6	17,1	32,9	15,5
	50-74 ans	17,5	23,6	12,3	26,3	11,9	22,8	12,4
	50-74 ans **	16,9	22,4	11,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	9,2	6,4	10,3	7,4	7,4	4,9
	55-59 ans	8,4	12,0	5,3	23,1	5,9	9,4	5,2
	60-64 ans	9,4	13,8	5,8	24,4	8,1	12,0	5,5
	65-69 ans	12,0	15,0	9,4	28,4	7,9	13,2	9,6
	70-74 ans	14,4	21,0	8,9	33,6	17,1	19,8	8,2
	50-74 ans	10,3	13,9	7,1	17,4	7,9	12,9	6,9
	50-74 ans **	10,0	13,3	6,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,1	4,8	8,8	5,7	6,8	3,3
	55-59 ans	6,8	9,8	4,2	19,2	4,7	7,6	4,1
	60-64 ans	8,1	12,1	4,8	22,8	8,1	10,3	4,4
	65-69 ans	8,9	10,8	7,3	16,2	7,9	10,1	7,2
	70-74 ans	10,8	16,1	6,5	30,2	8,5	14,7	6,3
	50-74 ans	8,1	11,2	5,5	14,3	6,2	10,2	5,3
	50-74 ans **	8,0	10,9	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	9,2	5,8	10,3	6,7	7,4	4,4
	55-59 ans	8,0	11,3	5,1	20,5	4,7	9,1	5,2
	60-64 ans	9,7	15,0	5,4	26,1	9,7	13,1	4,8
	65-69 ans	11,5	15,5	8,2	26,4	9,9	14,0	8,1
	70-74 ans	14,1	21,3	8,2	33,6	14,2	20,1	7,6
	50-74 ans	10,0	14,2	6,5	16,9	7,6	13,3	6,2
	50-74 ans **	9,8	13,5	6,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,5	1,9	2,6	2,4	2,5	1,1
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	6,4	1,2	1,2	1,6
	60-64 ans	4,0	5,5	2,7	9,8	1,6	4,7	2,9
	65-69 ans	4,2	6,1	2,6	18,3	6,0	4,5	2,2
	70-74 ans	3,8	4,4	3,4	10,1	17,1	3,8	2,1
	50-74 ans	3,2	4,1	2,4	6,1	3,4	3,5	2,1
	50-74 ans **	3,0	3,9	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20,0	18,2	22,2	14,3	14,3	25,0	50,0
	55-59 ans	12,5	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	33,3
	60-64 ans	16,7	18,2	14,3	0,0	0,0	25,0	15,4
	65-69 ans	10,5	12,0	7,7	25,0	0,0	5,9	10,0
	70-74 ans	24,1	20,0	28,6	33,3	33,3	16,7	25,0
	50-74 ans	16,5	14,6	19,3	13,8	16,7	15,1	20,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)