Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	initial §	Dépistages Sul	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 075	3 313	3 762	1 977	2 114	1 336	1 648
	55-59 ans	6 282	2 909	3 373	579	607	2 330	2 766
	60-64 ans	7 202	3 235	3 967	537	562	2 698	3 405
	65-69 ans	7 709	3 400	4 309	456	504	2 944	3 805
	70-74 ans	6 220	2 815	3 405	315	261	2 500	3 144
	50-74 ans	34 488	15 672	18 816	3 864	4 048	11 808	14 768
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA)	50-54 ans	529	279	250	185	165	94	85
	55-59 ans	421	197	224	52	62	145	162
	60-64 ans	464	232	232	57	43	175	189
	65-69 ans	441	202	239	42	48	160	191
	70-74 ans	403	211	192	29	21	182	171
	50-74 ans	2 258	1 121	1 137	365	339	756	798
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à								
un test NA	50-54 ans	390	210	180	137	119	73	61
	55-59 ans	310	146	164	37	42	109	122
	60-64 ans	373	181	192	35	27	146	165
	65-69 ans	360	162	198	31	38	131	160
	70-74 ans	324	165	159	16	15	149	144
	50-74 ans	1 757	864	893	256	241	608	652
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	139	69	70	48	46	21	24
	55-59 ans	111	51	60	15	20	36	40
	60-64 ans	91	51	40	22	16	29	24
	65-69 ans	81	40	41	11	10	29	31
	70-74 ans	79	46	33	13	6	33	27
	50-74 ans	501	257	244	109	98	148	146
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 936	3 244	3 692	1 929	2 068	1 315	1 624
	55-59 ans	6 171	2 858	3 313	564	587	2 294	2 726
	60-64 ans	7 111	3 184	3 927	515	546	2 669	3 381
	65-69 ans	7 628	3 360	4 268	445	494	2 915	3 774
	70-74 ans	6 141	2 769	3 372	302	255	2 467	3 117
	50-74 ans	33 987	15 415	18 572	3 755	3 950	11 660	14 622
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	219	123	96	83	59	40	37
Add- Normbro de personnes ayant un test positii	55-59 ans	161	93	68	25	22	68	46
	60-64 ans	257	141	116	47	30	94	86
	65-69 ans	333	179			27	146	127
				154	33	27 14		
	70-74 ans	327	204	123	43	14	161	109

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 297	740	557	231	152	509	405
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	218	123	95	83	58	40	37
	55-59 ans	161	93	68	25	22	68	46
	60-64 ans	255	140	115	47	29	93	86
	65-69 ans	330	177	153	33	27	144	126
	70-74 ans	322	203	119	43	14	160	105
	50-74 ans	1 286	736	550	231	150	505	400
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	179	98	81	65	47	33	34
	55-59 ans	143	82	61	19	19	63	42
	60-64 ans	223	125	98	37	23	88	75
	65-69 ans	292	156	136	27	22	129	114
	70-74 ans	285	178	107	37	12	141	95
	50-74 ans	1 122	639	483	185	123	454	360
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	173	95	78	64	47	31	31
	55-59 ans	141	82	59	19	19	63	40
	60-64 ans	218	121	97	36	23	85	74
	65-69 ans	287	153	134	26	21	127	113
	70-74 ans	274	171	103	36	12	135	91
	50-74 ans	1 093	622	471	181	122	441	349
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	178	97	81	64	47	33	34

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	141	82	59	19	18	63	41
	60-64 ans	220	122	98	36	23	86	75
	65-69 ans	290	154	136	27	22	127	114
	70-74 ans	277	177	100	37	12	140	88
	50-74 ans	1 106	632	474	183	122	449	352
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	8	1	7	0	0	1	7
	50-74 ans	16	7	9	2	1	5	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique	50.54	0	_	_	•	•	4	0
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	1	5	1	3	0	2
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	33	11	22	2	8	9	14
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	173	97	76	65	44	32	32
A 10- Nombre de personnes ayant un resultat de coloscopie connu	55-59 ans	143	82	61	19	19	63	42
	60-64 ans	222	124	98	37	23	87	75
	65-69 ans	292	156	136	27	22	129	114
	70-74 ans	284	178	106	37	12	141	94
	50-74 ans	1 114	637	477	185	120	452	357
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	30-74 alls	1114	037	411	103	120	402	337
ou autre)	50-54 ans	185	99	86	65	50	34	36
·	55-59 ans	145	83	62	19	20	64	42
	60-64 ans	229	126	103	38	26	88	77
	65-69 ans	300	159	141	27	23	132	118
	70-74 ans	296	183	113	38	12	145	101
	50-74 ans	1 155	650	505	187	131	463	374
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	85	39	46	23	25	16	21
	55-59 ans	48	21	27	4	7	17	20
	60-64 ans	77	26	51	4	16	22	35
	65-69 ans	102	38	64	6	4	32	60
	70-74 ans	120	57	63	11	6	46	57

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	432	181	251	48	58	133	193
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins	50.54	_	4	4	4	0	0	0
de 10 mm	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	3	0	5	4
	65-69 ans	13	10	3	1	0	9	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A20 Nombre de marconnes avent réalisé un avenem (calcacanie	50-74 ans	43	28	15	7	2	21	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	31	18	13	13	9	5	4
ou dutio) dydni dotote dd moins di ddenome non dydno	55-59 ans	32	21	11	7	4	14	7
	60-64 ans	35	23	12	5	3	18	9
	65-69 ans	49	29	20	4	5	25	15
	70-74 ans	46	31	15	2	2	29	13
	50-74 ans	193	122	71	31	23	91	48
	00-7 4 ans	133	122	, ,	V 1	20	J 1	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	29	10	22	6	7	4
	55-59 ans	41	27	14	5	6	22	8
	60-64 ans	80	55	25	23	6	32	19
	65-69 ans	93	55	38	10	11	45	27
	70-74 ans	84	62	22	15	3	47	19
	50-74 ans	337	228	109	75	32	153	77
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
, ,	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	14	10	4	2	- 1	8	3
	65-69 ans	31	20	11	5	3	15	8
	70-74 ans	21	15	6	6	1	9	5
	. 0 7 1 4113	21	10	0	· ·		9	•

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	83	55	28	16	10	39	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non	50-54 ans	0	4	4	0	0	1	4
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans 55-59 ans	2 2	1	1	0	0	•	0
	60-64 ans	2	2	2	0	0	2	
	65-69 ans	Δ			0	0	0	2
	70-74 ans	-	2	2	ı	0	1	2
	70-74 ans 50-74 ans	6 16	11	0 5	3 4	0	3 7	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-74 ans	10	11	5	4	U	,	Ð
ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	8	3	5	1	0	2	5
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
	50-74 ans	39	22	17	6	3	16	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	1	5	0	3	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	70	47	23	35	15	12	8
727 Rombio de percentico ayant da memo an adenetto decesto	55-59 ans	73	48	25	12	10	36	15
	60-64 ans	115	78	37	28	9	50	28
	65-69 ans	142	84	58	14	16	70	42
	70-74 ans	130	93	37	17	5	76	32
	50-74 ans	530	350	180	106	55	244	125
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	39	29	10	22	6	7	4
	55-59 ans	41	27	14	5	6	22	8
	60-64 ans	80	55	25	23	6	32	19
	65-69 ans	93	55	38	10	11	45	27
	70-74 ans	84	62	22	15	3	47	19
	50-74 ans	337	228	109	75	32	153	77

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
· ·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé	-							
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	24	6	19	4	5	2
	55-59 ans	32	20	12	5	6	15	6
	60-64 ans	64	45	19	17	4	28	15
	65-69 ans	80	48	32	9	10	39	22
	70-74 ans	63	46	17	14	3	32	14
	50-74 ans	269	183	86	64	27	119	59
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OL								
taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	26	7	21	5	5	2
	55-59 ans	37	24	13	7	6	17	7
	60-64 ans	74	54	20	22	4	32	16
	65-69 ans	89	53	36	10	11	43	25
	70-74 ans	77	57	20	15	3	42	17
	50-74 ans	310	214	96	75	29	139	67
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	14	10	4	2	1	8	3
	65-69 ans	31	20	11	5	3	15	8
	70-74 ans	21	15	6	6	1	9	5
	50-74 ans	83	55	28	16	10	39	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers								
du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
au roctam areo radiotionapio pro operatoro)	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	14	10	4	2	1	8	3
	65-69 ans	29	20	9	5	2	15	7
	70-74 ans	20	14	6	6	1	8	5
	50-74 ans	80	54	26	16	9	38	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	10	8	2	0	0	8	2
	70-74 ans	9	7	2	4	0	3	2
	50-74 ans	28	23	5	7	0	16	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu	50.54	•	_			•		_
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	1	3	4	1
	55-59 ans	5	3	2	0	2	3	0

Effectifs sur la période 2018-2019	Total				Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	19	12	7	5	2	7	5
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
	50-74 ans	52	31	21	9	9	22	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM	50.54	•	•		,		•	
connu	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	13	8	5	2	2	6	3
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	36	22	14	6	6	16	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	4	2	3	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	16	9	7	3	3	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50-54 ans	2	1	0	4	0	0	0
		3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1 -	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50-74 ans	15	10	5	3	2	7	3
2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
2	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	00-7-4 0113	•	•	J	•	•	_	_
3	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	10	7	3	2	1	5	2

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	2	3	4	1
	55-59 ans	5	3	2	0	2	3	0
	60-64 ans	13	9	4	2	1	7	3
	65-69 ans	26	19	7	5	2	14	5
	70-74 ans	17	11	6	4	1	7	5
	50-74 ans	71	48	23	13	9	35	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	16	6	12	6	4	0
	55-59 ans	13	9	4	6	1	3	3
	60-64 ans	20	9	11	6	3	3	8
	65-69 ans	22	13	9	4	3	9	6
	70-74 ans	21	16	5	4	2	12	3
	50-74 ans	98	63	35	32	15	31	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage	initial §	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,4	6,6	9,4	7,8	7,0	5,2
	55-59 ans	6,7	6,8	6,6	9,0	10,2	6,2	5,9
	60-64 ans	6,4	7,2	5,8	10,6	7,7	6,5	5,6
	65-69 ans	5,7	5,9	5,5	9,2	9,5	5,4	5,0
	70-74 ans	6,5	7,5	5,6	9,2	8,0	7,3	5,4
	50-74 ans	6,5	7,2	6,0	9,4	8,4	6,4	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi								
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	1,9	2,4	2,2	1,6	1,5
	55-59 ans	1,8	1,8	1,8	2,6	3,3	1,5	1,4
	60-64 ans	1,3	1,6	1,0	4,1	2,8	1,1	0,7
	65-69 ans	1,1	1,2	1,0	2,4	2,0	1,0	0,8
	70-74 ans	1,3	1,6	1,0	4,1	2,3	1,3	0,9
	50-74 ans	1,5	1,6	1,3	2,8	2,4	1,3	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,7	75,3	72,0	74,1	72,1	77,7	71,8
	55-59 ans	73,6	74,1	73,2	71,2	67,7	75,2	75,3
	60-64 ans	80,4	78,0	82,8	61,4	62,8	83,4	87,3
	65-69 ans	81,6	80,2	82,8	73,8	79,2	81,9	83,8
	70-74 ans	80,4	78,2	82,8	55,2	71,4	81,9	84,2
	50-74 ans	77,8	77,1	78,5	70,1	71,1	80,4	81,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes								
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,6	4,3	2,9	3,0	2,3
	55-59 ans	2,6	3,3	2,1	4,4	3,7	3,0	1,7
	60-64 ans	3,6	4,4	3,0	9,1	5,5	3,5	2,5
	65-69 ans	4,4	5,3	3,6	7,4	5,5	5,0	3,4
	70-74 ans	5,3	7,4	3,6	14,2	5,5	6,5	3,5
	50-74 ans	3,8	4,8	3,0	6,2	3,8	4,4	2,8
	50-74 ans **	3,6	4,5	2,9	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant								
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	98,3	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	100,0	96,7	98,9	100,0
	65-69 ans	99,1	98,9	99,4	100,0	100,0	98,6	99,2
	70-74 ans	98,5	99,5	96,7	100,0	100,0	99,4	96,3
	50-74 ans	99,2	99,5	98,7	100,0	98,7	99,2	98,8
POG Deursentere de nerremos avent au una selección con la companya de la companya								
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,1	79,7	85,3	78,3	81,0	82,5	91,9
test positii (partiii les personnes eligibles à la coloscopie)	50-54 ans 55-59 ans	,	,			,	,	
	ออ-อ _ั ย ans	88,8	88,2	89,7	76,0	86,4	92,6	91,3

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,5	89,3	85,2	78,7	79,3	94,6	87,2
	65-69 ans	88,5	88,1	88,9	81,8	81,5	89,6	90,5
	70-74 ans	88,5	87,7	89,9	86,0	85,7	88,1	90,5
	50-74 ans	87,2	86,8	87,8	80,1	82,0	89,9	90,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	96,9	96,3	98,5	100,0	93,9	91,2
	55-59 ans	98,6	100,0	96,7	100,0	100,0	100,0	95,2
	60-64 ans	97,8	96,8	99,0	97,3	100,0	96,6	98,7
	65-69 ans	98,3	98,1	98,5	96,3	95,5	98,4	99,1
	70-74 ans	96,1	96,1	96,3	97,3	100,0	95,7	95,8
	50-74 ans	97,4	97,3	97,5	97,8	99,2	97,1	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en						_	_	
jours)	50-54 ans	4	4	4	4	5	5	4
	55-59 ans	4	4	4	6	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	6	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	6	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au	50 54	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)
patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50.54	404	400	440	404	400	404	447
jours)	50-54 ans	121	122	119	121	120	124	117
	55-59 ans	122	115	132	119	139	114	129
	60-64 ans	113	121	102	151	108	109	100
	65-69 ans	111	115	107	130	107	112	107
	70-74 ans	102	101	105	88	95	105	106
	50-74 ans	112	113	111	122	116	110	109
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	E0 E4 ans	06 (66 144)	06 (67 445)	00 (62 424)	06 (67 145)	440 (EC 404)	06 (70, 440)	07 5 (67 400)
coloscopie (en jours)	50-54 ans	96 (66-141)	96 (67-145)	99 (63-131)	96 (67-145)	110 (56-131)	96 (70-143)	97,5 (67-138)
	55-59 ans	94 (71-141)	85 (61-127)	114 (82-151)	80 (60-179)	119 (77-193)	85 (62-114)	109,5 (82-142)
	60-64 ans	96 (68-127)	97 (74-131)	94,5 (63-123)	96 (71-178)	103 (63-130)	97,5 (74-124,5)	94 (63-122)
	65-69 ans	95 (68-132)	96 (69,5-124,5)	91 (64-135)	104 (70-146)	96 (76-133)	95 (69-122)	90,5 (63-137)
	70-74 ans	95 (68-120)	91 (67-118)	98 (72-124)	78 (61-112)	104 (55,5-123,5)	94 (73-120)	98 (75-124)
	50-74 ans	95,5 (68-131)	94 (68-127)	98 (68-132)	95 (67-145)	104 (68-134)	93,5 (70-122)	97 (68-131)

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage		Dépistages Su		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,0	13,0	6,3	14,5	10,2	10,0	0,0
	55-59 ans	8,1	9,7	5,9	24,0	4,5	4,4	6,5
	60-64 ans	7,8	6,4	9,5	12,8	10,0	3,2	9,3
	65-69 ans	6,6	7,3	5,8	12,1	11,1	6,2	4,7
	70-74 ans	6,4	7,8	4,1	9,3	14,3	7,5	2,8
	50-74 ans	7,6	8,5	6,3	13,9	9,9	6,1	4,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	96,6	99,0	93,8	100,0	93,6	97,0	94,1
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9
	50-74 ans	99,3	99,7	98,8	100,0	97,6	99,6	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,9	39,4	53,5	35,4	50,0	47,1	58,3
	55-59 ans	33,1	25,3	43,5	21,1	35,0	26,6	47,6
	60-64 ans	33,6	20,6	49,5	10,5	61,5	25,0	45,5
	65-69 ans	34,0	23,9	45,4	22,2	17,4	24,2	50,8
	70-74 ans	40,5	31,1	55,8	28,9	50,0	31,7	56,4
	50-74 ans	37,4	27,8	49,7	25,7	44,3	28,7	51,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostiquε								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype	50.54		4.0			4.0		
hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	1,0	4,7	1,5	4,0	0,0	5,6
	55-59 ans	5,5	7,2	3,2	10,5	0,0	6,3	4,8
	60-64 ans	5,2	6,3	3,9	7,9	0,0	5,7	5,2
	65-69 ans	4,3	6,3	2,1	3,7	0,0	6,8	2,5
	70-74 ans	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	2,1	2,0
D04 D	50-74 ans	3,7	4,3	3,0	3,7	1,5	4,5	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	4,8
	60-64 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non		-1.	-,•	-,•	-,•	-,•	-,•	3,0
avancé	50-54 ans	16,8	18,2	15,1	20,0	18,0	14,7	11,1
	55-59 ans	22,1	25,3	17,7	36,8	20,0	21,9	16,7
		,-	-,-	,-	,-	-,-	,-	- 1-

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage i	nitial [§]	Dépistages Sub	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,3	18,3	11,7	13,2	11,5	20,5	11,7
	65-69 ans	16,3	18,2	14,2	14,8	21,7	18,9	12,7
	70-74 ans	15,5	16,9	13,3	5,3	16,7	20,0	12,9
	50-74 ans	16,7	18,8	14,1	16,6	17,6	19,7	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	29,3	11,6	33,8	12,0	20,6	11,1
· , , ,	55-59 ans	28,3	32,5	22,6	26,3	30,0	34,4	19,0
	60-64 ans	34,9	43,7	24,3	60,5	23,1	36,4	24,7
	65-69 ans	31,0	34,6	27,0	37,0	47,8	34,1	22,9
	70-74 ans	28,4	33,9	19,5	39,5	25,0	32,4	18,8
	50-74 ans	29,2	35,1	21,6	40,1	24,4	33,0	20,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	7,1	4,7	4,6	6,0	11,8	2,8
	55-59 ans	4,1	3,6	4,8	0,0	10,0	4,7	2,4
	60-64 ans	6,1	7,9	3,9	5,3	3,8	9,1	3,9
	65-69 ans	10,3	12,6	7,8	18,5	13,0	11,4	6,8
	70-74 ans	7,1	8,2	5,3	15,8	8,3	6,2	5,0
D00 B	50-74 ans	7,2	8,5	5,5	8,6	7,6	8,4	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non								
adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,0	1,2	0,0	0,0	2,9	2,8
	55-59 ans	1,4	2,4	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	60-64 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,6
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	3,7	0,0	0,8	1,7
	70-74 ans	2,0	3,3	0,0	7,9	0,0	2,1	0,0
	50-74 ans	1,4	1,7	1,0	2,1	0,0	1,5	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à								
la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	3,0	3,5	4,6	4,0	0,0	2,8
	55-59 ans	4,1	3,6	4,8	5,3	5,0	3,1	4,8
	60-64 ans	3,5	2,4	4,9	2,6	0,0	2,3	6,5
	65-69 ans	2,0	3,1	0,7	0,0	0,0	3,8	0,8
	70-74 ans	4,4	4,4	4,4	2,6	0,0	4,8	5,0
	50-74 ans	3,4	3,4	3,4	3,2	2,3	3,5	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50.54	2.2	4.0		0.0	0.0	0.0	
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,2	1,0	5,8	0,0	6,0	2,9	5,6
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Indicateurs sur la période 2018-2019	019		Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,2	1,0	0,0	2,3	0,2	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	14,5	6,2	18,1	7,3	9,1	4,9
DTT- Taux d'adenomes detectes pour 1000 personnes depistees	55-59 ans	11,8	16,8	7,5	21,3	17,0	15,7	5,5
	60-64 ans	16,2	24,5	7,3 9,4	54,4	16,5	18,7	8,3
	65-69 ans	18,6	24,3 25,0	13,6	31,5	32,4	24,0	11,1
	70-74 ans	21,2	23,0 33,6	11,0	56,3	32,4 19,6	30,8	10,3
	50-74 ans	15,6	22,7	9,7	28,2	13,9	20,9	8,5
	50-74 ans **	14,9	21,3	9,1	20,2	13,9	20,9	0,5
	50-74 alls	14,5	21,3	3,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,9	2,7	11,4	2,9	5,3	2,5
	55-59 ans	6,6	9,4	4,2	8,9	10,2	9,6	2,9
	60-64 ans	11,3	17,3	6,4	44,7	11,0	12,0	5,6
	65-69 ans	12,2	16,4	8,9	22,5	22,3	15,4	7,2
	70-74 ans	13,7	22,4	6,5	49,7	11,8	19,1	6,1
	50-74 ans	9,9	14,8	5,9	20,0	8,1	13,1	5,3
	50-74 ans **	9,4	13,8	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	7,4	1,6	9,8	1,9	3,8	1,2
	55-59 ans	5,2	7,0	3,6	8,9	10,2	6,5	2,2
	60-64 ans	9,0	14,1	4,8	33,0	7,3	10,5	4,4
	65-69 ans	10,5	14,3	7,5	20,2	20,2	13,4	5,8
	70-74 ans	10,3	16,6	5,0	46,4	11,8	13,0	4,5
	50-74 ans	7,9	11,9	4,6	17,0	6,8	10,2	4,0
13717 Louis diadenament automate detecto (detinition 77 Nembra	50-74 ans **	7,5	11,0	4,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adenomes avances detectes (definition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	4,8	8,0	1,9	10,9	2,4	3,8	1,2
	55-59 ans	6,0	8,4	3,9	12,4	10,2	7,4	2,6
	60-64 ans	10,4	17,0	5,1	42,7	7,3	12,0	4,7
	65-69 ans	11,7	15,8	8,4	22,5	22,3	14,8	6,6
	70-74 ans	12,5	20,6	5,9	49,7	11,8	17,0	5,5
	50-74 ans	9,1	13,9	5,2	20,0	7,3	11,9	4,6
	50-74 ans **	8,6	12,9	4,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,2	1,1	1,6	1,5	3,0	0,6
	55-59 ans	1,0	1,0	0,9	0,0	3,4	1,3	0,4
	60-64 ans	2,0	3,1	1,0	3,9	1,8	3,0	0,9
	65-69 ans	4,1	6,0	2,6	11,2	6,1	5,1	2,1
	70-74 ans	3,4	5,4	1,8	19,9	3,9	3,6	1,6
	50-74 ans	2,4	3,6	1,5	4,3	2,5	3,3	1,2
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4	· -	· <u>-</u>	· <u>-</u>	· _
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	18,2	28,6	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	16,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0
	60-64 ans	42,9	60,0	0,0	50,0	0,0	62,5	0,0
	65-69 ans	34,5	40,0	22,2	0,0	0,0	53,3	28,6
	70-74 ans	45,0	50,0	33,3	66,7	0,0	37,5	40,0
	50-74 ans	35.0	42,6	19.2	43.8	0.0	42.1	29,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)