

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2020
27/06/2022 - Santé publique France

1/5

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2020, pour 99 départements

Effectifs sur la période 2020	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [§]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)*	50-54 ans	603 070	289 736	313 334	176 423	183 242	113 313	130 092
	55-59 ans	585 195	271 506	313 689	47 770	51 747	223 736	261 942
	60-64 ans	596 046	267 484	328 562	36 125	39 558	231 359	289 004
	65-69 ans	601 695	267 224	334 471	29 185	30 074	238 039	304 397
	70-74 ans	571 331	256 821	314 510	20 829	21 320	235 992	293 190
	50-74 ans	2 957 337	1 352 771	1 604 566	310 332	325 941	1 042 439	1 278 625
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	51 625	26 213	25 412	18 435	17 223	7 778	8 189
	55-59 ans	49 681	24 388	25 293	6 745	6 662	17 643	18 631
	60-64 ans	44 849	20 830	24 019	4 515	4 506	16 315	19 513
	65-69 ans	42 288	19 471	22 817	3 513	3 441	15 958	19 376
	70-74 ans	41 865	19 429	22 436	2 757	2 718	16 672	19 718
	50-74 ans	230 308	110 331	119 977	35 965	34 550	74 366	85 427
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	27 153	13 860	13 293	9 340	8 514	4 520	4 779
	55-59 ans	27 051	13 431	13 620	2 798	2 712	10 633	10 908
	60-64 ans	25 861	12 014	13 847	1 852	1 874	10 162	11 973
	65-69 ans	25 335	11 705	13 630	1 416	1 355	10 289	12 275
	70-74 ans	24 871	11 640	13 231	1 036	955	10 604	12 276
	50-74 ans	130 271	62 650	67 621	16 442	15 410	46 208	52 211
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	24 472	12 353	12 119	9 095	8 709	3 258	3 410
	55-59 ans	22 630	10 957	11 673	3 947	3 950	7 010	7 723
	60-64 ans	18 988	8 816	10 172	2 663	2 632	6 153	7 540
	65-69 ans	16 953	7 766	9 187	2 097	2 086	5 669	7 101
	70-74 ans	16 994	7 789	9 205	1 721	1 763	6 068	7 442
	50-74 ans	100 037	47 681	52 356	19 523	19 140	28 158	33 216
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	578 598	277 383	301 215	167 328	174 533	110 055	126 682
	55-59 ans	562 564	260 549	302 015	43 823	47 797	216 726	254 218
	60-64 ans	577 058	258 668	318 390	33 462	36 926	225 206	281 464
	65-69 ans	584 741	259 457	325 284	27 087	27 988	232 370	297 296
	70-74 ans	554 335	249 032	305 303	19 108	19 557	229 924	285 746

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2020
27/06/2022 - Santé publique France

2/5

Effectifs sur la période 2020	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^f		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 857 296	1 305 089	1 552 207	290 808	306 801	1 014 281	1 245 406
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	18 425	10 133	8 292	6 840	5 266	3 293	3 026
	55-59 ans	17 443	9 568	7 875	2 464	1 766	7 104	6 109
	60-64 ans	20 069	10 911	9 158	2 163	1 530	8 748	7 628
	65-69 ans	23 092	12 628	10 464	2 073	1 306	10 555	9 158
	70-74 ans	25 092	13 844	11 248	1 705	1 136	12 139	10 112
	50-74 ans	104 121	57 084	47 037	15 245	11 004	41 839	36 033
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	18 292	10 067	8 225	6 800	5 231	3 267	2 994
	55-59 ans	17 315	9 497	7 818	2 451	1 761	7 046	6 057
	60-64 ans	19 883	10 812	9 071	2 151	1 517	8 661	7 554
	65-69 ans	22 844	12 486	10 358	2 056	1 291	10 430	9 067
	70-74 ans	24 759	13 640	11 119	1 675	1 120	11 965	9 999
	50-74 ans	103 093	56 502	46 591	15 133	10 920	41 369	35 671
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	13 643	7 433	6 210	4 900	3 879	2 533	2 331
	55-59 ans	13 077	7 092	5 985	1 670	1 220	5 422	4 765
	60-64 ans	15 382	8 277	7 105	1 493	1 081	6 784	6 024
	65-69 ans	17 686	9 609	8 077	1 425	906	8 184	7 171
	70-74 ans	19 120	10 524	8 596	1 162	785	9 362	7 811
	50-74 ans	78 908	42 935	35 973	10 650	7 871	32 285	28 102
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	12 514	6 802	5 712	4 484	3 568	2 318	2 144
	55-59 ans	11 945	6 479	5 466	1 486	1 083	4 993	4 383
	60-64 ans	14 042	7 576	6 466	1 333	974	6 243	5 492
	65-69 ans	16 176	8 817	7 359	1 280	805	7 537	6 554
	70-74 ans	17 427	9 631	7 796	1 034	703	8 597	7 093
	50-74 ans	72 104	39 305	32 799	9 617	7 133	29 688	25 666
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	26	13	13	11	8	2	5
	55-59 ans	19	14	5	4	2	10	3
	60-64 ans	26	15	11	4	5	11	6
	65-69 ans	37	22	15	6	3	16	12
	70-74 ans	40	26	14	4	4	22	10
	50-74 ans	148	90	58	29	22	61	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2020

3/5

27/06/2022 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2020	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	3	1	2	1	1		1
	55-59 ans	5	4	1	1		3	1
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	11	7	4	1		6	4
	70-74 ans	11	7	4	1		6	4
	50-74 ans	39	24	15	6	2	18	13
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	13 563	7 397	6 166	4 882	3 851	2 515	2 315
	55-59 ans	12 983	7 049	5 934	1 656	1 207	5 393	4 727
	60-64 ans	15 243	8 222	7 021	1 483	1 067	6 739	5 954
	65-69 ans	17 494	9 533	7 961	1 416	886	8 117	7 075
	70-74 ans	18 886	10 412	8 474	1 145	774	9 267	7 700
	50-74 ans	78 169	42 613	35 556	10 582	7 785	32 031	27 771
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	80	36	44	18	28	18	16
	55-59 ans	94	43	51	14	13	29	38
	60-64 ans	139	55	84	10	14	45	70
	65-69 ans	192	76	116	9	20	67	96
	70-74 ans	234	112	122	17	11	95	111
	50-74 ans	739	322	417	68	86	254	331
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	35	18	17	10	9	8	8
	55-59 ans	57	33	24	8	4	25	20
	60-64 ans	89	41	48	6	8	35	40
	65-69 ans	103	51	52	9	7	42	45
	70-74 ans	181	111	70	12	7	99	63
	50-74 ans	465	254	211	45	35	209	176

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* Inclus les personnes ayant réalisé un test de dépistage dont le résultat a été reporté inconnu (n=0)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2020
27/06/2022 - Santé publique France

4/5

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2020, pour 99 départements

Indicateurs sur la période 2020	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [§]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	9,0	8,1	10,4	9,4	6,9	6,3
	55-59 ans	8,5	9,0	8,1	14,1	12,9	7,9	7,1
	60-64 ans	7,5	7,8	7,3	12,5	11,4	7,1	6,8
	65-69 ans	7,0	7,3	6,8	12,0	11,4	6,7	6,4
	70-74 ans	7,3	7,6	7,1	13,2	12,7	7,1	6,7
	50-74 ans	7,8	8,2	7,5	11,6	10,6	7,1	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,3	3,9	5,2	4,8	2,9	2,6
	55-59 ans	3,9	4,0	3,7	8,3	7,6	3,1	2,9
	60-64 ans	3,2	3,3	3,1	7,4	6,7	2,7	2,6
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	7,2	6,9	2,4	2,3
	70-74 ans	3,0	3,0	2,9	8,3	8,3	2,6	2,5
	50-74 ans	3,4	3,5	3,3	6,3	5,9	2,7	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,6	52,9	52,3	50,7	49,4	58,1	58,4
	55-59 ans	54,4	55,1	53,8	41,5	40,7	60,3	58,5
	60-64 ans	57,7	57,7	57,7	41,0	41,6	62,3	61,4
	65-69 ans	59,9	60,1	59,7	40,3	39,4	64,5	63,4
	70-74 ans	59,4	59,9	59,0	37,6	35,1	63,6	62,3
	50-74 ans	56,6	56,8	56,4	45,7	44,6	62,1	61,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,8	4,1	3,0	3,0	2,4
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	5,6	3,7	3,3	2,4
	60-64 ans	3,5	4,2	2,9	6,5	4,1	3,9	2,7
	65-69 ans	3,9	4,9	3,2	7,7	4,7	4,5	3,1
	70-74 ans	4,5	5,6	3,7	8,9	5,8	5,3	3,5
	50-74 ans	3,6	4,4	3,0	5,2	3,6	4,1	2,9
50-74 ans **	3,6	4,2	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,3	99,2	99,4	99,3	99,2	98,9
	55-59 ans	99,3	99,3	99,3	99,5	99,7	99,2	99,1
	60-64 ans	99,1	99,1	99,1	99,4	99,2	99,0	99,0
	65-69 ans	98,9	98,9	99,0	99,2	98,9	98,8	99,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2020

5/5

27/06/2022 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2020	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98,7	98,5	98,9	98,2	98,6	98,6	98,9
	50-74 ans	99,0	99,0	99,1	99,3	99,2	98,9	99,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	74,6	73,8	75,5	72,1	74,2	77,5	77,9
	55-59 ans	75,5	74,7	76,6	68,1	69,3	77,0	78,7
	60-64 ans	77,4	76,6	78,3	69,4	71,3	78,3	79,7
	65-69 ans	77,4	77,0	78,0	69,3	70,2	78,5	79,1
	70-74 ans	77,2	77,2	77,3	69,4	70,1	78,2	78,1
	50-74 ans	76,5	76,0	77,2	70,4	72,1	78,0	78,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,7	91,5	92,0	91,5	92,0	91,5	92,0
	55-59 ans	91,3	91,4	91,3	89,0	88,8	92,1	92,0
	60-64 ans	91,3	91,5	91,0	89,3	90,1	92,0	91,2
	65-69 ans	91,5	91,8	91,1	89,8	88,9	92,1	91,4
	70-74 ans	91,1	91,5	90,7	89,0	89,6	91,8	90,8
	50-74 ans	91,4	91,5	91,2	90,3	90,6	92,0	91,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)