27/06/2022 - Santé publique France

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019, pour 42 départements ‡

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	e initia [§]	Dépistages Subséquents [‡]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	619	338	281	273	206	65	75
	55-59 ans	726	414	312	149	100	265	212
	60-64 ans	1 106	660	446	234	129	426	317
	65-69 ans	1 318	828	490	233	109	595	381
	70-74 ans	1 398	864	534	187	93	677	441
	50-74 ans	5 167	3 104	2 063	1 076	637	2 028	1 426
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de								
stade inconnu	50-54 ans	81	40	41	30	26	10	15
	55-59 ans	96	55	41	18	12	37	29
	60-64 ans	129	75	54	30	14	45	40
	65-69 ans	152	103	49	34	11	69	38
	70-74 ans	141	90	51	27	12	63	39
	50-74 ans	599	363	236	139	75	224	161
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stad	50.54	500	000	040	040	400		00
TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	538	298	240	243	180	55	60
	55-59 ans	630	359	271	131	88	228	183
	60-64 ans	977	585	392	204	115	381	277
	65-69 ans	1 166	725	441	199	98	526	343
	70-74 ans	1 257	774	483	160	81	614	402
A22 Nambra de marcanas mrécontent un adémacaraineme	50-74 ans	4 568	2 741	1 827	937	562	1 804	1 265
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	341	181	160	149	122	32	38
livasii	55-59 ans	435	244	191	89	68	155	123
	60-64 ans	657	393	264	149	79	244	185
	65-69 ans	856	536	320	158	79 79	378	241
	70-74 ans	933	555	378	128	68	427	310
	50-74 ans	3 222	1 909	1 313	673	416	1 236	897
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-74 ans	197	117	80	94	58	23	22
A34- Nombre de personnes presentant un carcinome in situ	55-59 ans	195	115	80	42	20	73	60
	60-64 ans		192				137	92
	65-69 ans	320 310		128 121	55 41	36 19	148	102
	70-74 ans	324	189 219	105	32	13	148	92
	50-74 ans	1 346	832	514	264	146	568	368

2/4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019 27/06/2022 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de								
stade (TNM) 1	50-54 ans	151	77	74	64	58	13	16
	55-59 ans	187	108	79	33	28	75	51
	60-64 ans	282	185	97	60	29	125	68
	65-69 ans	384	237	147	53	29	184	118
	70-74 ans	410	268	142	57	23	211	119
	50-74 ans	1 414	875	539	267	167	608	372
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de							_	
stade (TNM) 2	50-54 ans	69	33	36	25	28	8	8
	55-59 ans	98	51	47	17	11	34	36
	60-64 ans	135	70	65	30	27	40	38
	65-69 ans	192	117	75	50	23	67	52
	70-74 ans	241	132	109	31	26	101	83
	50-74 ans	735	403	332	153	115	250	217
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de	50.54	00	4.4	00	00	00	0	40
stade (TNM) 3	50-54 ans	80	44	36	36	26	8	10
	55-59 ans	106	60	46	24	17	36	29
	60-64 ans	171	103	68	41	15	62	53
	65-69 ans	190	128	62	36	17	92	45
	70-74 ans	202	105	97	25	11	80	86
	50-74 ans	749	440	309	162	86	278	223
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de	50.54	4.4	07	4.4	0.4	40	0	4
stade (TNM) 4	50-54 ans	41	27	14	24	10	3	4
	55-59 ans	44	25	19	15	12	10	7
	60-64 ans	69	35	34	18	8	17	26
	65-69 ans	90	54	36	19	10	35	26
	70-74 ans	80	50	30	15	8	35	22
	50-74 ans	324	191	133	91	48	100	85

[‡] Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé † Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

27/06/2022 - Santé publique France

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019, pour 42 départements ‡

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome	F0 F4 and	40.4	11.0	14.6	11.0	10.6	45.4	20.0
du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	13,1	11,8	14,6	11,0	12,6	15,4	20,0
	55-59 ans	13,2	13,3	13,1	12,1	12,0	14,0	13,7
	60-64 ans	11,7	11,4	12,1	12,8	10,9	10,6	12,6
	65-69 ans	11,5	12,4	10,0	14,6	10,1	11,6	10,0
	70-74 ans	10,1	10,4	9,6	14,4	12,9	9,3	8,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ	50-74 ans	11,6	11,7	11,4	12,9	11,8	11,0	11,3
du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade								
TNM connu*	50-54 ans	36,6	39,3	33,3	38,7	32,2	41,8	36,7
	55-59 ans	31,0	32,0	29,5	32,1	22,7	32,0	32,8
	60-64 ans	32,8	32,8	32,7	27,0	31,3	36,0	33,2
	65-69 ans	26,6	26,1	27,4	20,6	19,4	28,1	29,7
	70-74 ans	25,8	28,3	21,7	20,0	16,0	30,5	22,9
	50-74 ans	29,5	30,4	28,1	28,2	26,0	31,5	29,1
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du		,,	,-	,.	,_	,-	- 1,-	,.
côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade								
TNM connu*	50-54 ans	63,4	60,7	66,7	61,3	67,8	58,2	63,3
	55-59 ans	69,0	68,0	70,5	67,9	77,3	68,0	67,2
	60-64 ans	67,2	67,2	67,3	73,0	68,7	64,0	66,8
	65-69 ans	73,4	73,9	72,6	79,4	80,6	71,9	70,3
	70-74 ans	74,2	71,7	78,3	80,0	84,0	69,5	77,1
	50-74 ans	70,5	69,6	71,9	71,8	74,0	68,5	70,9
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlor								
de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	44,3	42,5	46,3	43,0	47,5	40,6	12.1
COIOTI	55-59 ans						•	42,1
	60-64 ans	43,0	44,3	41,4	37,1	41,2	48,4	41,5
	65-69 ans	42,9	47,1	36,7	40,3	36,7	51,2	36,8
	70-74 ans	44,9	44,2	45,9	33,5	36,7	48,7	49,0
		43,9	48,3	37,6	44,5	33,8	49,4	38,4
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlor	50-74 ans	43,9	45,8	41,1	39,7	40,1	49,2	41,5
de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du								
côlon*	50-54 ans	20,2	18,2	22,5	16,8	23,0	25,0	21,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

27/06/2022 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	e initia [§]	Dépistages su	ıbséquents [‡]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22,5	20,9	24,6	19,1	16,2	21,9	29,3
	60-64 ans	20,5	17,8	24,6	20,1	34,2	16,4	20,5
	65-69 ans	22,4	21,8	23,4	31,6	29,1	17,7	21,6
	70-74 ans	25,8	23,8	28,8	24,2	38,2	23,7	26,8
	50-74 ans	22,8	21,1	25,3	22,7	27,6	20,2	24,2
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlor de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du								
côlon*	50-54 ans	23,5	24,3	22,5	24,2	21,3	25,0	26,3
	55-59 ans	24,4	24,6	24,1	27,0	25,0	23,2	23,6
	60-64 ans	26,0	26,2	25,8	27,5	19,0	25,4	28,6
	65-69 ans	22,2	23,9	19,4	22,8	21,5	24,3	18,7
	70-74 ans	21,7	18,9	25,7	19,5	16,2	18,7	27,7
	50-74 ans	23,2	23,0	23,5	24,1	20,7	22,5	24,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlor		•	•	•	·	•	·	•
de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du								
côlon*	50-54 ans	12,0	14,9	8,8	16,1	8,2	9,4	10,5
	55-59 ans	10,1	10,2	9,9	16,9	17,6	6,5	5,7
	60-64 ans	10,5	8,9	12,9	12,1	10,1	7,0	14,1
	65-69 ans	10,5	10,1	11,3	12,0	12,7	9,3	10,8
	70-74 ans	8,6	9,0	7,9	11,7	11,8	8,2	7,1
	50-74 ans	10,1	10,0	10,1	13,5	11,5	8,1	9,5

[‡] Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{*} A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire