

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome | 50-54 ans | 135 | 73 | 62 | 62 | 44 | 11 | 18 |
| | 55-59 ans | 153 | 96 | 57 | 30 | 19 | 66 | 38 |
| | 60-64 ans | 231 | 138 | 93 | 52 | 24 | 86 | 69 |
| | 65-69 ans | 286 | 177 | 109 | 40 | 25 | 137 | 84 |
| | 70-74 ans | 276 | 173 | 103 | 29 | 11 | 144 | 92 |
| | 50-74 ans | 1 081 | 657 | 424 | 213 | 123 | 444 | 301 |
| A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu | 50-54 ans | 29 | 13 | 16 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 31 | 23 | 8 | 9 | 4 | 14 | 4 |
| | 60-64 ans | 53 | 27 | 26 | 12 | 6 | 15 | 20 |
| | 65-69 ans | 58 | 34 | 24 | 8 | 8 | 26 | 16 |
| | 70-74 ans | 57 | 40 | 17 | 9 | 3 | 31 | 14 |
| | 50-74 ans | 228 | 137 | 91 | 49 | 34 | 88 | 57 |
| A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus) | 50-54 ans | 106 | 60 | 46 | 51 | 31 | 9 | 15 |
| | 55-59 ans | 122 | 73 | 49 | 21 | 15 | 52 | 34 |
| | 60-64 ans | 178 | 111 | 67 | 40 | 18 | 71 | 49 |
| | 65-69 ans | 228 | 143 | 85 | 32 | 17 | 111 | 68 |
| | 70-74 ans | 219 | 133 | 86 | 20 | 8 | 113 | 78 |
| | 50-74 ans | 853 | 520 | 333 | 164 | 89 | 356 | 244 |
| A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif | 50-54 ans | 65 | 36 | 29 | 30 | 18 | 6 | 11 |
| | 55-59 ans | 87 | 45 | 42 | 14 | 14 | 31 | 28 |
| | 60-64 ans | 122 | 74 | 48 | 26 | 16 | 48 | 32 |
| | 65-69 ans | 166 | 109 | 57 | 28 | 11 | 81 | 46 |
| | 70-74 ans | 169 | 100 | 69 | 16 | 5 | 84 | 64 |
| | 50-74 ans | 609 | 364 | 245 | 114 | 64 | 250 | 181 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 41 | 24 | 17 | 21 | 13 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 35 | 28 | 7 | 7 | 1 | 21 | 6 |
| | 60-64 ans | 56 | 37 | 19 | 14 | 2 | 23 | 17 |
| | 65-69 ans | 62 | 34 | 28 | 4 | 6 | 30 | 22 |
| | 70-74 ans | 50 | 33 | 17 | 4 | 3 | 29 | 14 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 244 | 156 | 88 | 50 | 25 | 106 | 63 |
| A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 29 | 14 | 15 | 12 | 9 | 2 | 6 |
| | 55-59 ans | 41 | 23 | 18 | 4 | 7 | 19 | 11 |
| | 60-64 ans | 57 | 35 | 22 | 7 | 8 | 28 | 14 |
| | 65-69 ans | 69 | 49 | 20 | 11 | 3 | 38 | 17 |
| | 70-74 ans | 78 | 49 | 29 | 6 | 2 | 43 | 27 |
| | 50-74 ans | 274 | 170 | 104 | 40 | 29 | 130 | 75 |
| A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 25 | 14 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| | 65-69 ans | 38 | 27 | 11 | 11 | 3 | 16 | 8 |
| | 70-74 ans | 40 | 24 | 16 | 5 | 0 | 19 | 16 |
| | 50-74 ans | 134 | 81 | 53 | 30 | 11 | 51 | 42 |
| A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 15 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| | 60-64 ans | 27 | 17 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 |
| | 65-69 ans | 43 | 27 | 16 | 4 | 3 | 23 | 13 |
| | 70-74 ans | 28 | 12 | 16 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| | 50-74 ans | 133 | 73 | 60 | 23 | 16 | 50 | 44 |
| A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| | 70-74 ans | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 |
| | 50-74 ans | 68 | 40 | 28 | 21 | 8 | 19 | 20 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 21,5 | 17,8 | 25,8 | 17,7 | 29,5 | 18,2 | 16,7 |
| | 55-59 ans | 20,3 | 24,0 | 14,0 | 30,0 | 21,1 | 21,2 | 10,5 |
| | 60-64 ans | 22,9 | 19,6 | 28,0 | 23,1 | 25,0 | 17,4 | 29,0 |
| | 65-69 ans | 20,3 | 19,2 | 22,0 | 20,0 | 32,0 | 19,0 | 19,0 |
| | 70-74 ans | 20,7 | 23,1 | 16,5 | 31,0 | 27,3 | 21,5 | 15,2 |
| | 50-74 ans | 21,1 | 20,9 | 21,5 | 23,0 | 27,6 | 19,8 | 18,9 |
| E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 38,7 | 40,0 | 37,0 | 41,2 | 41,9 | 33,3 | 26,7 |
| | 55-59 ans | 28,7 | 38,4 | 14,3 | 33,3 | 6,7 | 40,4 | 17,6 |
| | 60-64 ans | 31,5 | 33,3 | 28,4 | 35,0 | 11,1 | 32,4 | 34,7 |
| | 65-69 ans | 27,2 | 23,8 | 32,9 | 12,5 | 35,3 | 27,0 | 32,4 |
| | 70-74 ans | 22,8 | 24,8 | 19,8 | 20,0 | 37,5 | 25,7 | 17,9 |
| | 50-74 ans | 28,6 | 30,0 | 26,4 | 30,5 | 28,1 | 29,8 | 25,8 |
| E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 61,3 | 60,0 | 63,0 | 58,8 | 58,1 | 66,7 | 73,3 |
| | 55-59 ans | 71,3 | 61,6 | 85,7 | 66,7 | 93,3 | 59,6 | 82,4 |
| | 60-64 ans | 68,5 | 66,7 | 71,6 | 65,0 | 88,9 | 67,6 | 65,3 |
| | 65-69 ans | 72,8 | 76,2 | 67,1 | 87,5 | 64,7 | 73,0 | 67,6 |
| | 70-74 ans | 77,2 | 75,2 | 80,2 | 80,0 | 62,5 | 74,3 | 82,1 |
| | 50-74 ans | 71,4 | 70,0 | 73,6 | 69,5 | 71,9 | 70,2 | 74,2 |
| E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 44,6 | 38,9 | 51,7 | 40,0 | 50,0 | 33,3 | 54,5 |
| | 55-59 ans | 47,1 | 51,1 | 42,9 | 28,6 | 50,0 | 61,3 | 39,3 |
| | 60-64 ans | 46,7 | 47,3 | 45,8 | 26,9 | 50,0 | 58,3 | 43,8 |
| | 65-69 ans | 41,6 | 45,0 | 35,1 | 39,3 | 27,3 | 46,9 | 37,0 |
| | 70-74 ans | 46,2 | 49,0 | 42,0 | 37,5 | 40,0 | 51,2 | 42,2 |
| | 50-74 ans | 45,0 | 46,7 | 42,4 | 35,1 | 45,3 | 52,0 | 41,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 16,9 | 16,7 | 17,2 | 13,3 | 16,7 | 33,3 | 18,2 |
| | 55-59 ans | 23,0 | 22,2 | 23,8 | 28,6 | 14,3 | 19,4 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 20,5 | 18,9 | 22,9 | 23,1 | 18,8 | 16,7 | 25,0 |
| | 65-69 ans | 22,9 | 24,8 | 19,3 | 39,3 | 27,3 | 19,8 | 17,4 |
| | 70-74 ans | 23,7 | 24,0 | 23,2 | 31,3 | 0,0 | 22,6 | 25,0 |
| | 50-74 ans | 22,0 | 22,3 | 21,6 | 26,3 | 17,2 | 20,4 | 23,2 |
| E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 23,1 | 25,0 | 20,7 | 23,3 | 22,2 | 33,3 | 18,2 |
| | 55-59 ans | 23,0 | 17,8 | 28,6 | 28,6 | 21,4 | 12,9 | 32,1 |
| | 60-64 ans | 22,1 | 23,0 | 20,8 | 30,8 | 18,8 | 18,8 | 21,9 |
| | 65-69 ans | 25,9 | 24,8 | 28,1 | 14,3 | 27,3 | 28,4 | 28,3 |
| | 70-74 ans | 16,6 | 12,0 | 23,2 | 0,0 | 60,0 | 14,3 | 20,3 |
| | 50-74 ans | 21,8 | 20,1 | 24,5 | 20,2 | 25,0 | 20,0 | 24,3 |
| E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 15,4 | 19,4 | 10,3 | 23,3 | 11,1 | 0,0 | 9,1 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 8,9 | 4,8 | 14,3 | 14,3 | 6,5 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 19,2 | 12,5 | 6,3 | 9,4 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 5,5 | 17,5 | 7,1 | 18,2 | 4,9 | 17,4 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 15,0 | 11,6 | 31,3 | 0,0 | 11,9 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 11,0 | 11,4 | 18,4 | 12,5 | 7,6 | 11,0 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire