

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	11	4	7	2	5	2	2
	55-59 ans	19	11	8	6	2	5	6
	60-64 ans	27	14	13	7	5	7	8
	65-69 ans	27	11	16	2	4	9	12
	70-74 ans	24	15	9	5	0	10	9
	50-74 ans	108	55	53	22	16	33	37
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	21	8	13	4	5	4	8
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	17	10	7	5	1	5	6
	60-64 ans	21	11	10	6	5	5	5
	65-69 ans	20	9	11	2	2	7	9
	70-74 ans	21	13	8	3	0	10	8
	50-74 ans	87	47	40	18	11	29	29
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	13	6	7	4	3	2	4
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	53	26	27	9	6	17	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	8	5	3	2	2	3	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : LA REUNION (Code région : 4)

2/4

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34	21	13	9	5	12	8
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	21	13	8	4	3	9	5
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	3	7	2	1	1	6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,3	0,0	42,9	0,0	40,0	0,0	50,0
	55-59 ans	10,5	9,1	12,5	16,7	50,0	0,0	0,0
	60-64 ans	22,2	21,4	23,1	14,3	0,0	28,6	37,5
	65-69 ans	25,9	18,2	31,3	0,0	50,0	22,2	25,0
	70-74 ans	12,5	13,3	11,1	40,0	0,0	0,0	11,1
	50-74 ans	19,4	14,5	24,5	18,2	31,3	12,1	21,6
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	62,5	50,0	75,0	0,0	66,7	100,0	100,0
	55-59 ans	58,8	70,0	42,9	80,0	0,0	60,0	50,0
	60-64 ans	38,1	45,5	30,0	33,3	40,0	60,0	20,0
	65-69 ans	20,0	22,2	18,2	50,0	50,0	14,3	11,1
	70-74 ans	33,3	38,5	25,0	66,7	0,0	30,0	25,0
	50-74 ans	39,1	44,7	32,5	50,0	45,5	41,4	27,6
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	37,5	50,0	25,0	100,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	41,2	30,0	57,1	20,0	100,0	40,0	50,0
	60-64 ans	61,9	54,5	70,0	66,7	60,0	40,0	80,0
	65-69 ans	80,0	77,8	81,8	50,0	50,0	85,7	88,9
	70-74 ans	66,7	61,5	75,0	33,3	0,0	70,0	75,0
	50-74 ans	60,9	55,3	67,5	50,0	54,5	58,6	72,4
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	57,1	66,7	50,0	0,0	100,0	100,0	33,3
	60-64 ans	30,8	66,7	0,0	75,0	0,0	50,0	0,0
	65-69 ans	50,0	57,1	44,4	0,0	100,0	66,7	37,5
	70-74 ans	28,6	37,5	16,7	100,0	0,0	28,6	16,7
	50-74 ans	39,6	50,0	29,6	44,4	50,0	52,9	23,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	28,6	33,3	25,0	100,0	0,0	0,0	33,3
	60-64 ans	15,4	0,0	28,6	0,0	33,3	0,0	25,0
	65-69 ans	18,8	14,3	22,2	0,0	0,0	16,7	25,0
	70-74 ans	35,7	37,5	33,3	0,0	0,0	42,9	33,3
	50-74 ans	22,6	19,2	25,9	11,1	16,7	23,5	28,6
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	33,3
	60-64 ans	23,1	33,3	14,3	25,0	33,3	50,0	0,0
	65-69 ans	6,3	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	12,5
	70-74 ans	28,6	25,0	33,3	0,0	0,0	28,6	33,3
	50-74 ans	18,9	19,2	18,5	22,2	16,7	17,6	19,0
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	30,8	0,0	57,1	0,0	33,3	0,0	75,0
	65-69 ans	25,0	28,6	22,2	100,0	0,0	16,7	25,0
	70-74 ans	7,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	16,7
	50-74 ans	18,9	11,5	25,9	22,2	16,7	5,9	28,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire