


Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 1A – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 1B – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Génotype 1B - Données 2001
N=399 (32,1%)



Génotype 1B - Données 2007
N=368 (30,8%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 1 ni A/ni B – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Génotype 1 ni A ni B - Données 2001 - N=122 (9,8%)



Répartition des facteurs de risque - Génotype 1 ni A ni B
Données 2007 - N=158 (13,2%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 2 – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Répartition des facteurs de risque - Génotype 2
Données 2001 - N=119 (9,6%)



Répartition des facteurs de risque - Génotype 2
Données 2007 - N=103 (8,6%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 3 – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Répartition des facteurs de risque - Génotype 3
Données 2001 - N=267 (21,5%)



Répartition des facteurs de risque - Génotype 3
Données 2007 - N=213 (17,8%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 4 – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Répartition des facteurs de risque - Génotype 4
Données 2001 - N=95 (7,6%)



Répartition des facteurs de risque - Génotype 4
Données 2007 - N=108 (9,0%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient


- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence


Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risque pour le Génotype 5/6 – Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 (1 seul facteur de risque isolé et l'ensemble des variables sur les facteurs de risque renseignés)

Répartition des facteurs de risque - Génotype 5/6
Données 2001 - N=32 (2,6%)



Répartition des facteurs de risque - Génotype 5/6
Données 2007 - N=29 (2,4%)



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Possibilité de choix de plusieurs facteurs de risque par patient

- (a) Transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) Utilisation de drogues IV ou drogues par voie nasale - consommation actuelle ou passée
- (c) Exposition nosocomiale ou exposition professionnelle
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing