

Synthèse :

En semaine 14 (du 1^{er} au 7 avril 2019), l'**activité totale SOS Médecins** est en légère hausse chez les **adultes de 15-74 ans** (+4,5% soit +1 872 actes) et stable dans les autres classes d'âges.

Au cours de la semaine écoulée, on observe :

- chez les **enfants de moins de 2 ans**, une légère hausse des actes pour fièvre isolée (+11% soit +23 actes) ;
- chez les adultes, notamment de 15-74 ans, une hausse des actes pour :
 - o **allergie** (+8,4% soit +88 actes) et **asthme** (+26,6% soit +123 actes) dans des niveaux identiques ou proches de ceux observés ces deux dernières années.
 - o **méningite virale** (14 actes en S14 contre 9 en S13), ces diagnostics sont répartis de manière homogène sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

On note dans **toutes les classes d'âges**, une légère hausse des actes pour **bronchite** (+6% chez les enfants et +8% chez les adultes) ainsi que pour **gastro-entérite** (+5% chez les enfants et +11% chez les adultes). Chez les **adultes de 15-74 ans**, les actes pour **douleurs abdominales** et **problèmes digestifs divers** sont en hausse dans les mêmes proportions. Enfin, on retient également chez les **adultes tous âges**, l'augmentation des actes pour **pathologies des voies respiratoires hautes** (+7%) et **infection urinaire** (+7%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	∧
	Plus de 15 ans	≈	∧
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation	7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	8
Activité SOS Médecins liée à un malaise	9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme	10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes	11
Activité SOS Médecins liée à une allergie	12
Activité SOS Médecins liée à une méningite.....	13
Activité SOS Médecins liée à une varicelle.....	14

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Déshydratation ;
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Piqûre d'insectes ;
 - Allergie ;
 - Méningite virale ;
 - Varicelle.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Légende


- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	20 668	19 967	3,51%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 663	6 144	8,45%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 298	3 079	7,11%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 567	2 539	1,10%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 294	2 408	-4,73%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 196	2 152	2,04%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	2 041	1 950	4,67%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 010	1 881	6,86%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 847	1 818	1,60%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 369	1 281	6,87%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 835	2 808	0,96%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	771	725	6,34%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	269	263	2,28%
BRONCHITE (Diag SOS)	245	224	9,38%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	231	208	11,06%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	192	203	-5,42%
VARICELLE (Diag SOS)	143	147	-2,72%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	137	141	-2,84%
ALLERGIE (Diag SOS)	127	148	-14,19%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	125	121	3,31%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 302	8 274	0,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 097	2 002	4,75%
BRONCHITE (Diag SOS)	864	820	5,37%
VARICELLE (Diag SOS)	511	504	1,39%
ALLERGIE (Diag SOS)	509	553	-7,96%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	455	464	-1,94%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	433	460	-5,87%
TRAUMATISME (Diag SOS)	428	513	-16,57%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	424	436	-2,75%
ASTHME (Diag SOS)	409	395	3,54%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	9 201	8 569	7,38%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 564	3 212	10,96%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 308	2 279	1,27%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 850	1 826	1,31%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 783	1 638	8,85%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 600	1 498	6,81%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 437	1 457	-1,37%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 340	1 251	7,11%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 138	1 050	8,38%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 007	940	7,13%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	400	389	2,83%
TRAUMATISME (Diag SOS)	378	376	0,53%
DECES (Diag SOS)	307	296	3,72%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	259	284	-8,80%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	258	271	-4,80%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	247	241	2,49%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	237	243	-2,47%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	220	185	18,92%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	211	217	-2,76%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	207	191	8,38%

Activité liée à une déshydratation (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour piqûre d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **méningite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour méningite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

