

# Surveillance des gastro-entérites

| MARTINIQUE |

Le point épidémiologique — N° 02 / Semaine 2012-49


## Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis trois semaines, le nombre de consultations pour gastro-entérite en médecine de ville augmente de façon régulière pour atteindre, à la fin du mois de novembre, environ 480 cas

évocateurs estimés (Fig.1). En semaine 2012-49, ce nombre est supérieur à la valeur maximale attendue pour la saison.

### | Figure 1 |

Nombre estimé\* hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites, Martinique, avril 2009 à décembre 2012



\*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population martiniquaise du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.


## Surveillance des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites par SOS médecins et la MFME

Le nombre de visites à domicile pour gastro-entérites réalisées par SOS-médecins suit la même tendance avec une augmentation brutale observée à partir de la dernière semaine de novembre (S2012-47) (Fig.2).

Le nombre de consultations pour diarrhées au service d'accueil des urgences pédiatriques de la MFME a également augmenté, à partir de la semaine 2012-47.

### | Figure 2 |

Nombre de visites hebdomadaire réalisées par SOS médecins pour gastro-entérite, Martinique, avril 2009 à décembre 2012



## Analyse de la situation

Les indicateurs épidémiologiques montrent une augmentation globale des cas de gastro-entérites en Martinique depuis plusieurs semaines. Actuellement, le phénomène reste modéré mais demande une vigilance particulière.

**RAPPEL :** Pour limiter la transmission des virus à l'origine de cette épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le **lavage régulier des mains avec du savon**. Il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, au réseau de médecins généralistes sentinelles, aux services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), aux LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.