CIRE ANTILLES GUYANE







Surveillance de la gastro-entérite

Janvier 2012 à Février 2013

| SAINT-BARTHELEMY |

Le point épidémiologique — N° 02/2013

Surveillance des syndromes de gastro-entérite

Le nombre hebdomadaire estimé* de consultations pour gastro-entérite en médecine générale a brutalement augmenté à Saint-Barthélemy à partir de la première semaine de janvier 2013, et atteint le pic épidémique la


semaine suivante avec 67 consultations. Depuis la troisième semaine de janvier, on observe une diminution régulière de ce nombre, qui est inférieur aux valeurs maximales attendues depuis la semaine 2013-07 (Fig 1).

Définition de cas : épisode brutal de diarrhée avec ou sans fièvre, avec au moins 3 selles liquides dans les dernières 24 heures, avec ou sans déshydratation, avec ou sans vomissement.

Ce nombre est une estimation, pour l'ensemble de la population de Saint-Barthélemy, du nombre de personnes avant consulté un médecin généraliste pour une gastro-entérite. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies auprès du réseau des médecins

Figure 1

Nombre hebdomadaire estimé de syndromes de gastro-entérite vus par les médecins généralistes, Saint-Barthélemy, février 2010 à février 2013 (semaine 2013-08) / Estimated weekly number of gastroentitis ilnesses diagnosed in GP clinics, Saint-Barthelemy, Feb 2010 - Feb 2013 (epi-week 2013-08).




Surveillance des passages aux urgences

Les données disponibles des semaines 2013-03 à 06 du service des urgences sont cohérentes avec celles des médecins sentinelles. On observe une diminution du nombre de

passages ainsi que du nombre des hospitalisations consécutives à ces passages qui reviennent à leurs niveaux habituels (Fig 2).

Figure 2 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour gastro-entérite, janvier 2011 à février 2013 / Weekly number of gastro-entitis illnesses in the emergency unit, Jan. 2011 - Feb. 2013.



Analyse de la situation

Les indicateurs épidémiologiques montrent une diminution du nombre de cas de gastro-entérites qui marque la fin de l'épidémie saisonnière à Saint-Barthélemy. Une tendance à la décroissance épidémique est également observée en Guadeloupe.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoire, services d'hospitalisation), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.





N° 02| 2013 | Page 1