

Surveillance des syndromes de gastro-entérite

Le nombre hebdomadaire estimé* de consultations pour gastro-entérite en médecine générale a brutalement augmenté à Saint-Barthélemy à partir de la première semaine de janvier 2013.


Cette augmentation s'est poursuivie la semaine suivante pour atteindre le nombre de 67 consultations, mais a marqué le pas au cours des semaines 2013-03 et 04 (Fig 1)

Définition de cas : épisode brutal de diarrhée avec ou sans fièvre, avec au moins 3 selles liquides dans les dernières 24 heures, avec ou sans déshydratation, avec ou sans vomissement.

*Le nombre de syndromes grippaux est une estimation, pour l'ensemble de la population de Saint-Barthélemy, du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome grippal évocateur de dengue. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies auprès du réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire estimé de syndromes de gastro-entérite vus par les médecins généralistes, Saint-Barthélemy, février 2010 à janvier 2013 (semaine 2013-04) / Estimated weekly number of gastroenteritis illnesses diagnosed in GP clinics, Saint-Barthelemy, Feb 2010 - Jan 2013 (epi-week 2013-04).




Surveillance des passages aux urgences

Un problème technique a empêché l'extraction des données des deux premières semaines de janvier, mais les données des semaines 2013-03 et 04 du service des urgences sont cohérentes avec celles des médecins sentinelles. On observe une augmentation du nombre de passages ainsi que des hospitalisations consécutives à ces passages, par rapport au niveau habituel (Fig 2).

| Figure 2 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour gastro-entérite, janvier 2011 à janvier 2013 / Weekly number of gastroenteritis illnesses in the emergency unit, Jan. 2011 - Jan. 2013.



Analyse de la situation

Les indicateurs épidémiologiques montrent une augmentation du nombre de cas de gastro-entérites qui marque le début de l'épidémie saisonnière à Saint-Barthélemy, phénomène habituel également observé en Guadeloupe et Martinique. Rappel : les règles d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains, est indispensable pour limiter l'ampleur de l'épidémie. En cas de diarrhées et vomissements, les nourrissons doivent être conduits chez un médecin pour éviter tout phénomène de déshydratation.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoire, services d'hospitalisation), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

