

## Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis la dernière semaine de novembre 2012 (semaine 2012-48), on observe une augmentation régulière et lente du nombre de cas de gastro-entérites en Guadeloupe.


Le nombre de cas de gastro-entérites vus en consultation de médecin de ville a été estimé, au cours de ces deux dernières semaines, à respectivement 590 et 700 (Figure 1).

Néanmoins, au cours des deux dernières semaines (semaines 2012-52 et 2013-01), cette augmentation est plus importante et s'accompagne d'un dépassement des valeurs maximales attendues pour la période.

\*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

### | Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à janvier 2013 (semaine 2013-01)




## Surveillance des passages aux urgences

### | Figure 2 |

Au cours du mois de décembre et de la première semaine de janvier, le nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHU et du CHBT est resté faible et relativement stable.

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHU et CHBT et des hospitalisations consécutives, Guadeloupe, sept 2012 – janvier 2013 (semaine 2013-01)

Le nombre des hospitalisations consécutives à ces passages au cours de cette période est également resté faible et stable.



## Analyse de la situation

Les indicateurs épidémiologiques montrent une augmentation globale de l'activité de la gastro-entérite en Guadeloupe depuis plusieurs semaines. Le dépassement des valeurs maximales attendues pour la saison sur deux semaines consécutives en médecine de ville marquent le début de l'épidémie saisonnière de gastro-entérite sur le territoire, phénomène habituel en cette période de début d'année et également observé sur l'hexagone et en Martinique.

**RAPPEL :** Afin de limiter la transmission des virus à l'origine de ce début d'épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon. Il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.