

## Surveillance des cas cliniquement évocateurs

En Guadeloupe, l'épidémie de gastro-entérite a débuté à la fin du mois de décembre (S2012-52) et s'est poursuivie pendant 7 semaines.


A la mi-février (S2013-07), le nombre de cas évocateurs de gastro-entérite vus en médecine de ville est passé en deçà des valeurs maximales attendues pour la saison.

On observe néanmoins au cours de la dernière semaine de février et de la 1<sup>ère</sup> semaine de mars (S2013-09 et 10), une légère recrudescence de ce nombre de cas, autour des valeurs maximales attendues pour la saison (Fig. 1).

\*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

### | Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à mars 2013 (semaine 2013-10)



## Surveillance des passages et hospitalisations aux urgences du CHU et du CHBT


On n'observe pas de tendance particulière du nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite au CHU entre la semaine 2012-52 et la semaine 2013-07. Sur cette période ce chiffre varie entre 0 et 7 cas par semaine. Une discrète recrudescence est

observée au cours des semaines 2013-09 et 2013-10.

Au CHBT, un problème technique a empêché la transmission des données pendant la période épidémique (Fig. 2).

### | Figure 2 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHU et du CHBT pour gastro-entérite et des hospitalisations suite à ces passages, Guadeloupe, janvier 2012 – mars 2013 (semaine 2013-10)



## Analyse de la situation

Les indicateurs de surveillance épidémiologique, notamment le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites vus en consultation de médecine de ville, témoignent de la décroissance épidémique. Néanmoins, la discrète recrudescence observée au cours des 3 dernières semaines ne permet pas encore de déclarer la fin de l'épidémie.

**RAPPEL :** Afin de limiter la transmission des virus à l'origine de ce début d'épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon. Il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.