

## Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis la dernière semaine de novembre (semaine 2012-48), on observe une augmentation régulière et lente du nombre de cas de gastro-entérites en Guadeloupe.


Le nombre de cas de gastro-entérites vus en consultation de médecine de ville a été estimé, au cours de ces deux semaines, à respectivement environ 1200 et 900 (Figure 1).

Depuis la dernière semaine de décembre l'augmentation est plus rapide et les valeurs maximales attendues pour la période sont largement dépassées. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'à la 2<sup>ème</sup> semaine de janvier (2013-02).

\*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

### | Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à janvier 2013 (semaine 2013-03)




## Surveillance des passages aux urgences

### | Figure 2 |

Au cours du mois de décembre et des trois premières semaines de janvier, le nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour gastro-entérites au CHU et au CHBT reste faible et relativement stable.

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHU et CHBT et des hospitalisations consécutives, Guadeloupe, sept 2012 – janvier 2013 (semaine 2013-03)

Le nombre des hospitalisations consécutives à ces passages au cours de cette période est également faible et stable.



## Analyse de la situation

Les indicateurs de surveillance épidémiologique, notamment le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites vus en consultation de médecine de ville, montrent que l'épidémie de gastro-entérite se poursuit en Guadeloupe.

Le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérites reste cependant stable à des niveaux faibles.

**RAPPEL :** Afin de limiter la transmission des virus à l'origine de ce début d'épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon. Il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.