CIRE ANTILLES GUYANE

Le point épidémio

Surveillance de la gastro-entérite

| MARTINIQUE | Le point épidémiologique — N° 04 / Semaine 2013-08

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis la première semaine de décembre (S2012-49), le nombre de cas évocateurs de gastro-entérite vus en médecine de ville est au dessus du niveau maximal attendu pour la saison. Ce nombre est resté relativement stable tout au long du mois de janvier puis est revenu à la baisse au début du mois de février. Au cours de la troisième semaine de février (2013-08), seuls 750 cas ont été estimés (Figure 1).

| Figure 1 |

Nombre estimé* hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Martinique, janvier 2010 à février 2013 / *Weekly number of gastroenteritidis diagnosed in GP clinics, Martinique, January 2010 - February 2013*



*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population martiniquaise du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

Surveillance des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite par SOS médecins et la MFME

Depuis la troisième semaine du mois de janvier (S2013-03), le nombre de visites pour gastro-entérite réalisées par SOS médecins diminue. Cependant, au cours de la troisième semaine de février (S2013-08), ce nombre a augmenté pour atteindre 59 visites pour gastro-entérites (Figure 2).

Au niveau des urgences pédiatriques de la MFME, 34 passages aux urgences pédiatriques pour diarrhées ont été enregistrés durant la troisième semaine de février, soit 7,4 % de l'ensemble des passages aux urgences.

| Figure 2 |

Nombre de visites hebdomadaire réalisées par SOS médecins pour gastro-entérite, Martinique, janvier 2010 à février 2013 / *Estimated weekly number of gastroenteritidis diagnosed by SOS Médecins, Martinique, January 2010 - February 2013*



Analyse de la situation

L'épidémie de gastro-entérite sévit depuis 12 semaines en Martinique, mais la tendance est à la baisse depuis le début du mois de février. Depuis le début de l'épidémie, 13600 cas de gastro-entérites ont été estimés.

RAPPEL : Pour limiter la transmission des virus à l'origine de cette épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon. Il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastroentérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciements à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, au réseau de médecins généralistes sentinelles, aux services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), aux LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

Directeur de la publication :
Dr Françoise Weber, directrice générale de l'InVS

Rédacteur en chef :
Martine Ledrans, responsable scientifique de la Cire AG