

Point de situation au 18/03/2019

La rougeole est une **maladie virale extrêmement contagieuse** se transmettant par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales. Elle touche toutes les classes d'âge de la population et peut entraîner de graves complications parfois mortelles.

Depuis l'année 2017, une **augmentation du nombre de cas de rougeole** déclarés chaque semaine est observée en Ile-de-France (Figure 1).

Cette augmentation, également observée dans d'autres régions françaises, est principalement liée à une **vaccination insuffisante de la population**. En 2016, on estimait à 85 % la population de la région ayant reçu les deux doses recommandées (79 % France entière) alors que seule une couverture vaccinale à 95 % pourrait permettre d'éliminer la maladie.




Figure 1 : Nombre de cas déclarés chaque mois en Ile-de-France entre le 1^{er} janvier 2013 et le 17 mars 2019 (Source : Base de données des maladies à déclaration obligatoire de Santé publique France)

Professionnels de santé :

La rougeole fait partie des **maladies à déclaration obligatoire**.

Tout cas de rougeole, suspecté ou confirmé, doit être **signalé immédiatement** au moyen de la fiche de notification ([téléchargeable ici](#)) ou par tout moyen approprié (téléphone, mail, télécopie) à la plateforme de veille et d'urgence sanitaire de l'ARS Ile-de-France **sans attendre les résultats biologiques**.

Téléphone : 01.44.02.06.79 ou 0.800.811.411 / Télécopie : 01.44.02.06.76

Email : ars75-alerte@ars.sante.fr

L'instruction DGS du 28 septembre 2018 précise la conduite à tenir autour d'un ou plusieurs cas de rougeole et en situation épidémique (fiches techniques du guide en annexe à l'instruction, [disponible ici](#)).

POINTS CLÉS (Période du 01/01/2019 au 17/03/2019)

- **52 cas déclarés dans la région depuis le 1^{er} janvier 2019**
- **26 cas hospitalisés (50 %) dont 2 en réanimation**
- **10 formes compliquées, dont 7 pneumopathies**
- **89 % des cas survenus chez des cas non ou mal vaccinés**
- **0 foyer actif identifié dans la région**

Les données présentées ci-après synthétisent les signalements de cas de rougeole ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire (DO) en Ile-de-France depuis le 1^{er} janvier 2019, à la date d'analyse (18/03/2019). Les cas de rougeole post-vaccination ainsi que les cas ne répondant pas aux définitions de cas de la rougeole ont été exclus de cette analyse.

Depuis le 1 ^{er} janvier 2019 :	Effectifs	%
Nombre de cas	52	-
Dont cas hospitalisés	26	50 %
Dont formes compliquées	10	19 %
Dont admis en réanimation	2	4 %
Données démographiques		
Sex-ratio	0.9	-
Cas de moins de 5 ans	21	40 %
Cas de 5 à 15 ans	3	6 %
Cas de plus de 15 ans	28	54 %
Age médian	20,5	-
Statut vaccinal (cas de plus de 18 mois nés après 1980)		
Non vaccinés	14	78 %
Vaccinés 1 dose	2	11 %
Vaccinés 2 doses	2	11 %
Vaccinés nombre de doses inconnu	0	0 %




Figure 2 : Nombre de cas de rougeole déclarés chaque semaine en Ile-de-France depuis le 1^{er} janvier 2018 (Source : base de données MDO)

Depuis le 1^{er} janvier 2019, 52 cas de rougeole ont été déclarés en Ile-de-France : 5 à Paris (10 %), 3 dans la Seine-et-Marne (6 %), 6 dans les Yvelines (12 %), 4 dans l'Essonne (8 %), 9 dans les Hauts-de-Seine (17 %), 17 en Seine-Saint-Denis (33 %), 5 dans le Val-de-Marne (10 %) et 3 dans le Val d'Oise (6 %).

Entre 2 et 9 cas ont été déclarés chaque semaine depuis le 1^{er} janvier 2019, majoritairement chez des personnes de 15 ans et plus.

L'Ile-de-France ne recense pas de foyer actif depuis le début de l'année. Cependant, la présence de foyers actifs dans d'autres régions françaises représente une situation à risque par la possible introduction de nouveaux cas dans la région.

PRÉCONISATIONS

En cas de suspicion de rougeole

Rappeler les **mesures d'hygiène barrière** à mettre en place pour limiter la contagiosité : port d'un masque, confinement à domicile (évitement du cas de toute collectivité pendant toute la période de contagiosité, c'est-à-dire jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption), repérer les sujets contact à risque de faire une rougeole grave (femmes enceintes, enfants de moins de un an, personnes atteintes de maladies entraînant une diminution des défenses immunitaires).

Autour d'un cas de rougeole

Vacciner les sujets contacts réceptifs (non vaccinés 2 doses) âgés de plus de 6 mois dans les 72 heures suivant le contag. Mettre en place une **prophylaxie par immunoglobulines polyvalentes** par voie veineuse dans les 6 jours suivant le contag, principalement chez les nourrissons âgés de moins de 6 mois nés de mères non immunes, chez les nourrissons âgés de 6 à 11 mois n'ayant pu être vaccinés dans les 72h ainsi que chez les personnes à risque.

CRITÈRES DE SIGNALEMENT DE LA ROUGEOLE

Critères cliniques : Fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ET éruption maculo-papuleuse ET conjonctivite OU coryza OU toux OU signe de Köplik.

Critères biologiques : Détection (en l'absence de vaccination dans les deux mois précédant le prélèvement) d'IgM spécifiques de la rougeole OU séroconversion OU élévation de 4x au moins du titre des IgG sériques entre la phase aiguë et la phase de convalescence OU détection du virus par PCR OU culture positive.

POUR ALLER PLUS LOIN

Situation de l'épidémie au niveau national : [Santé publique France](#)

Page thématique de l'ARS Ile-de-France : www.iledefrance.ars.sante.fr

Informations sur le vaccin et la vaccination : [Base de données publiques des médicaments](#), www.vaccination-info-service.fr

Remerciements : ARS, réseaux de médecine ambulatoire, services d'urgences du réseau Oscour®, associations SOS Médecins, laboratoires, CNR des virus de la rougeole, rubéole et oreillons, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la rougeole.

Retrouvez nous sur : www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention

Responsable de la Cire Ile-de-France :
Agnès Lepoutre

Diffusion
Cire Ile-de-France
Tél. 01.44.02.08.16
cire-idf@santepubliquefrance.fr

