


Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ pré ou post épidémie ■ épidémie

**GRIPPE
ET SYNDROME GRIPPAL**



Evolution régionale :



*Phase épidémique, pic atteint en semaine 05
Activité en baisse en
médecine de ville et à l'hôpital*

Page 2

Autres surveillances régionales

Gastro-entérites et diarrhées aiguës

Page 3

Activité élevée et en hausse à SOS Médecins et aux urgences hospitalières

Mortalité toutes causes (Insee)

Page 4

Augmentation significative du nombre de décès

Actualités - Faits marquants

Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale. [Ici](#)

Grippe : recommandations de l'ARS Ile-de-France. [Ici](#)

BEH n° 7/2019. [Ici](#)

- Santé au travail : vers une prévention fondée sur des preuves
- Prévalence des symptômes et maladies respiratoires dans une cohorte de travailleurs du monde agricole dans cinq départements français en 2010
- Prévalence de la symptomatologie dépressive et exposition aux facteurs professionnels psychosociaux chez les actifs affiliés à la Mutualité sociale agricole de cinq départements en 2010 : résultats de la phase pilote de la cohorte Coset-MSA
- Expositions professionnelles aux solvants oxygénés, pétroliers et chlorés des femmes en âge de procréer en France en 2013. Résultats du programme Matgéné

Santé publique France lance Géodes, un observatoire cartographique dynamique permettant d'accéder aux principaux indicateurs de santé. [Ici](#) et [La plateforme Géodes](#)

CIRE
Ile-de-France

Le point épidémiologique

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Médecine de ville : taux d'incidence régional de consultations pour syndrome grippal (Réseau Sentinelles) et proportion des diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®). **Données hospitalières :** proportion des diagnostics de grippe (codes Cim10 : J09, J10 et J11) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour®).

Sources : comme tous les ans, la surveillance de la grippe a été activée depuis la semaine 40 (du 1^{er} au 07/10/2018)

- **SOS Médecins (figure 1) :** en semaine 08, **la part d'actes médicaux à SOS Médecins pour grippe et syndromes grippaux était de 13 %** (n = 2 056), **en forte baisse** par rapport à la semaine précédente (20 % de l'activité, n = 3 423). Cette baisse est observée dans toutes les tranches d'âges.
- **Réseau Sentinelles (figure 3) :** en semaine 08, **le taux d'incidence régionale de consultations pour syndromes grippaux a été estimé à 157 cas pour 100 000 habitants** [intervalle de confiance à 95 % : 110-204], **en forte baisse** par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (247 cas pour 100 000 habitants [intervalle de confiance à 95 % : 199-295]).
- **Oscour® (figure 2) :** en semaine 08, **la part des passages aux urgences hospitalières pour grippe et syndrome grippal était de 2,3 %** (n = 1 295), **en forte baisse** par rapport à la semaine précédente (3,5 % de l'activité, n = 2 111). Cette baisse était observée dans toutes les tranches d'âges. Le nombre d'**hospitalisations** pour grippe/syndrome grippal baisse. Ces hospitalisations concernaient les personnes de 65 ans et plus (62 %) et les personnes d'âge compris entre 15 et 64 ans (22 %). **La part des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal** parmi les hospitalisations tous âges et toutes causes était en baisse à 1,7 % (vs 2,6 % en S07).
- **Surveillance des IRA en EHPAD :** 97 foyers (vs 79 dans le précédent bulletin) d'infection respiratoire aiguë (IRA) ont été signalés dans la région et enregistrés dans l'application VoozEhpad depuis le 1^{er} octobre 2018.
- **Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation :** Depuis le lundi 5 novembre 2018, 251 cas graves de grippe (vs 232 dans le précédent bulletin) ont été signalés par les services de réanimation vigies de la région et enregistrés dans la base de données. Parmi ces cas, 51 % (n = 127) étaient âgés de 65 ans et plus et 33 étaient âgés de moins de 15 ans.

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la grippe: [cliquez ici](#)




Figure 1 - Evolution hebdomadaire du nombre d'actes médicaux SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, SurSaUD®, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.




Figure 3 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, Oscour®, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.




Figure 2 - Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 hab.) des syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

La vaccination, ainsi que les mesures barrières sont les meilleurs moyens de se protéger contre la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).

Les mesures barrières

- Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
- Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
- Limiter les contacts avec les personnes malades
- Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGUES

Médecine de ville : taux d'incidence régional de consultations pour diarrhées aiguës (Réseau Sentinelles) et proportion des diagnostics de gastro-entérites parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (SOS Médecins France / Santé publique France - SurSaUD®). **Données hospitalières :** proportion des diagnostics de gastro-entérites (codes Cim10 : A08, A09) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour®).

Sources : la surveillance de la gastro-entérite a été activée en Ile-de-France depuis la semaine 45 (du 05/11/2018 au 11/11/2018)

- **SOS Médecins (figure 4) :** en semaine 08, le **nombre d'actes médicaux pour gastro-entérite** (n = 1 807) **était encore en hausse** par rapport à la semaine précédente (n = 1 533 en semaine 07) et représentait 11,5 % des actes médicaux → **Niveau d'activité élevée** (figure 6). **L'activité était également en hausse pour les enfants de moins de 5 ans** (n = 336 contre 263 en semaine 07) et la gastro-entérite représentait 10,3 % de l'activité dans cette tranche d'âge.
- **Oscour® (figure 5) :** en semaine 08, le **nombre de passages aux urgences hospitalières pour gastro-entérite** (n = 1 996) **était en hausse** par rapport à la semaine précédente (n = 1 848 en S07) et représentait 3,5 % des passages codés → **Niveau d'activité élevé** (figure 7). **Le nombre de passages pour gastro-entérite était également en hausse chez les enfants de moins de 5 ans** (n = 1 327) par rapport à la semaine précédente (n = 1 152 en S07), représentant 14 % de l'activité dans cette tranche d'âge. Le taux d'hospitalisation était de 13 % (17 % chez les moins de 5 ans), **stable** par rapport à la semaine précédente et la gastro-entérite représentait 3 % du nombre total des hospitalisations (21 % chez les moins de 5 ans).
- **Réseau Sentinelles :** en semaine 08, le **taux d'incidence régional de consultations pour diarrhée aiguë était estimé à 68 cas pour 100 000 habitants**, intervalle de confiance à 95 % : [29-107], **en baisse** par rapport au taux d'incidence consolidé de la semaine 07 (104 cas pour 100 000 habitants, intervalle de confiance à 95 % : [71-137]).

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la gastro-entérite aiguë : [cliquez ici](#)



Figure 4 - Evolution hebdomadaire du nombre d'actes médicaux SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë tous âges, SurSaUD®, Ile-de-France, 2016-2019.



Figure 5 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë tous âges, Oscour®, Ile-de-France, 2016-2019.




Figure 6 - Niveau d'activité des actes médicaux SOS Médecins en S08 pour gastro-entérite aiguë, tous âges, SurSaUD®, France




Figure 7 - Niveau d'activité des passages aux urgences hospitalières en S08 pour gastro-entérite aiguë, tous âges, SurSaUD®, France

Prévention de la gastro-entérite

Prévention - comment diminuer le risque de gastro entérite aiguë ? Se laver fréquemment les mains (eau et savon, ou produit hydro-alcoolique) est une des meilleures façons de limiter la transmission des virus entériques.

Certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement, **nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces** à risque élevé de transmission (dans les services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées). La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation précoce à l'aide des solutés de **réhydratation orale** (SRO), en particulier chez le nourrisson.

MORTALITE TOUTES CAUSES

Source : Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, Insee).

Les données des dernières semaines sont incomplètes en raison des délais de transmission

La mortalité toutes causes et tous âges confondus a augmenté significativement en **Ile-de-France** depuis le début de l'année. Tous âges confondus, l'excès de mortalité a été estimé à 14 % sur les 6 premières semaines (du 31 décembre 2018 au 10 février 2019) (**figure 8**). Cet excès concernait principalement les personnes âgées de 85 ans et plus.

Santé publique France a développé un modèle permettant d'estimer le nombre de décès attribuables à la grippe. **Au niveau national**, depuis le début de la surveillance de la grippe (semaine 40, du 1^{er} au 7 octobre 2018) et jusqu'en semaine 06 (du 04 au 10 février 2019), il est estimé qu'environ 4 100 décès tous âges confondus sont attribuables à la grippe, dont 86 % chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)




Figure 8 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes tous âges, 65 ans et plus

QUALITE DES DONNEES – DISPOSITIF SURSAUD®

En semaine 08, la surveillance sanitaire des urgences et des décès en Ile-de-France repose sur la transmission des informations de :

- **96 services d'urgences** (sur 102 actuellement connectés), le taux de codage du diagnostic étant proche de **72 %**

	Services des urgences hospitalières								
	SEMAINE 08 - 2019								
	Dept 75	Dept 77	Dept 78	Dept 91	Dept 92	Dept 93	Dept 94	Dept 95	Région
Etablissements inclus dans l'analyse des tendances	14	10	13	11	16	13	14	11	102
<i>Dont ayant transmis des données</i>	14	7	13	11	16	13	12	10	96
<i>Dont ayant codés les diagnostics</i>	10	5	12	7	15	11	12	10	82
Taux de codage du diagnostic	66,0%	60,5%	80,0%	66,2%	66,2%	74,6%	78,7%	85,5%	72,2%

- **6 associations SOS Médecins** (sur 6), le taux de codage du diagnostic étant de 98 % pour toutes les associations (min = 48 % ; max = 100 %)
- **511 services d'état civil** de communes transmettant à l'Insee le volet administratif des certificats de décès

➔ Plus d'informations sur la Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)

METHODES

Les regroupements syndromiques suivis dans les services d'urgence sont composés :

- Pour la grippe ou syndrome grippal : codes J09, J10, J11 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Pour la bronchiolite : codes J210, J218 et J219, chez les enfants de moins de 2 ans ;
- Pour la gastro-entérite aiguë : codes A08, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A091, A099.

Le codage d'un acte médical à SOS Médecins (consultation en centre médical ou visite à domicile) utilise un référentiel spécifique aux associations.

Pour les regroupements syndromiques « grippe ou syndrome grippal » et « bronchiolite », la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de méthodes statistiques appliquées à deux ou trois sources de données (SOS Médecins, Oscour®, et Sentinelles selon la pathologie). Un maximum de trois méthodes statistiques sont appliquées selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique (serfling), sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées (ii) un modèle de régression périodique robuste avec pondération des journées selon leur valeur et (iii) un modèle de Markov caché. Pour chaque pathologie, un algorithme définit le niveau épidémique selon les alarmes statistiques observées. Celui-ci est validé par l'épidémiologiste.

Pour le regroupement syndromique « gastro-entérite aiguë », les actes médicaux SOS Médecins et les passages aux urgences hospitalières sont qualifiés, non plus par période épidémique, mais par niveau d'activité : faible, modéré, élevé. Ces niveaux sont basés sur des valeurs calculées (percentiles 55 et 85) à partir des données régionales et historiques des 5 dernières années. Le tableau suivant indique les valeurs repères pour qualifier le niveau d'activité selon la source et les classes d'âge d'intérêt :

Activité représentée par les codes « gastro-entérite aiguë »	Activité faible	Activité modérée	Activité élevée
SOS Médecins, tous âges	< 8,7 %	[8,7 % - 11,4 %]	> 11,4 %
Passage aux urgences, tous âges	< 2,2 %	[2,2 % - 3,1 %]	> 3,1 %

Pour la surveillance de la bronchiolite, le Réseau bronchiolite Île-de-France met à disposition de la cire IDF les données agrégées concernant les appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche (réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org>).

Les fluctuations de la mortalité toutes causes sont suivies à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans les communes informatisées de la région (qui représentent près de 90 % des décès de la région). L'analyse de la mortalité nécessite un délai minimum de 2 semaines en raison des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état-civil (24h, hors week-end et jour férié) et du délai de transmission des informations à Santé publique France. L'indicateur présenté dans les graphiques correspond aux effectifs bruts de décès de la région. Le modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés (comparé à un nombre attendu de décès estimé). Ce modèle prend en compte les données historiques sur 6 années, la tendance générale et les fluctuations saisonnières. Il exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies).

Le point épidémiolo

Agnès Lepoutre (responsable)

Remerciements à nos partenaires :

- Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, dont les délégations départementales
- Associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- Centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- GCS SESAN, Service numérique de santé
- Réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- Services d'états civils des communes informatisées

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr
Twitter : @sante-prevention



Clément Bassi
Pascal Beaudeau
Sylvain Berthet
Clémentine Calba
Anne Etchevers
Céline François
Florence Kermarec
Ibrahim Mouchetrou Njoya
Annie-Claude Paty
Yassoungo Silue
Nicolas Vincent

Diffusion
Cire Ile-de-France
Tél. 01.44.02.08.16
cire-idf@santepubliquefrance.fr