

Bronchiolite à Mayotte

Recrudescence saisonnière

Point épidémiologique - N°14 au 04/03/2019

CIRE
OCÉAN INDIEN

Le point épidémiologique


Depuis la troisième semaine de janvier, l'activité de prise en charge pour bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans augmente aux urgences du CHM, témoignant de la recrudescence saisonnière de cette pathologie.

| Situation épidémiologique |

Historiquement à Mayotte, les épidémies de bronchiolite commencent en saison chaude et humide (été austral). Le démarrage de l'épidémie se situe entre janvier et février selon les années (Figure 1).

| Figure 1 |

Taux de passages mensuel pour bronchiolite parmi les passages aux urgences chez les enfants âgés de moins de 2 ans (Mayotte, centre hospitalier, 01/01/2012 - 24/02/2019)




Surveillance des bronchiolites: réseau sentinelle des médecins

A nombre constant de médecins (n = 10), on observe une augmentation de l'activité de prise en charge pour bronchiolite au sein du réseau à partir de la semaine 5-2019 (Figure. 2).

| Figure 2 |

Evolution, par semaine, du taux* de consultations pour bronchiolite entre les semaines S01et S08 (réseau sentinelle des médecins généralistes; Mayotte, janvier-février 2019)



*nombre de consultations pour bronchiolite / nombre total de consultations

Surveillance hospitalière: réseau OSCOUR®

Le nombre de passages pour bronchiolite aux urgences du CHM chez les enfants âgés moins de 2 ans a augmenté de +43% (+19 passages) entre S07 et S08/2019. Le taux de passages (nombre de passages pour bronchiolite sur nombre total de passages) passe de 20% à 21% entre S07 et S08 (Fig. 3). En S08, 18 hospitalisations pour bronchiolite ont été recensées, soit un taux d'hospitalisation de 28,5%.

| Figure 3 |

Nombre et taux de passages pour bronchiolite aux urgences du centre hospitalier de Mayotte (CHM) chez les enfants de moins de 2 ans (S30/2018- S08/2019)



| Synthèse |

Depuis la semaine 03/2019, une augmentation de l'activité de prise en charge pour bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans a été observée au niveau des deux réseaux de surveillance (oscour® et réseau sentinelle de médecins).

Le seuil épidémique a été dépassé en S08/2019.

Dans ce contexte, il est important de rappeler les mesures de prévention à mettre en œuvre.

| Préconisations |

Comment diminuer le risque de bronchiolite?



En se lavant les mains pendant 30 secondes, avec de l'eau et du savon avant et après un change et avant tétée, câlins, biberons, repas, etc ou en utilisant une solution hydroalcoolique si il n'est pas possible de se laver les mains.



En évitant, quand cela est possible d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés (transports en commun, centres commerciaux) où il risquerait d'être en contact avec des personnes enrhumées.



En ne partageant pas les biberons, sucettes ou couverts non lavés.



En lavant régulièrement jouets et « doudous ».



En ouvrant les fenêtres de la pièce où il dort au moins 10 minutes par jour pour aérer.



En ne fumant pas à côté des bébés et des enfants.

Et en plus, lorsque l'on est soi-même enrhumé :



Se couvrir la bouche, quand on tousse ou éternue, avec le coude ou la manche.



Porter un masque (en vente en pharmacie) quand on s'occupe de son bébé.



Eviter d'embrasser le bébé sur le visage et sur les mains.

Le point épidémiolo Bronchiolite à Mayotte

Points clés Seuil épidémiolo atteint en S08

Liens utiles

Votre enfant et la bronchiolite

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf>

Santé publique France

<http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite>

Remerciements

Nous remercions les partenaires de la surveillance épidémiolo à Mayotte

- L'ensemble des médecins sentinelles de Mayotte
- Les urgentistes et biologistes du CHM

Liste de diffusion

Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion des points épidémiolo, envoyez un mail à

oceanindien

@santepubliquefrance.fr

Directeur de la publication :

François Bourdillon,
Directeur Général
Santé publique France

Responsable de la Cire OI :

Luce Menuhier

Préfiguratrice de la CIRE Mayotte:

Christine Larsen

Comité de rédaction :

Elsa Balleydiere
Samy Boutouaba
Jamel Daoudi
Aurélien Etienne
Marion Fleury
Youssef Hassani
Marc Ruello
Jean-Louis Solet
Marion Subiros
Florian Verrier
Muriel Vincent
Pascal Vilain

Diffusion

Cire océan Indien
2 bis, av. G. Brassens CS 61002
97743 Saint Denis Cedex 09
Tel : +262 (0)2 62 93 94 24