

Surveillance épidémiologique dans les Pays de la Loire

Numéro 2013/27 - Semaine du 1^{er} au 7 juillet 2013

Point de situation régionale au 9 juillet 2013

Au cours de la semaine dernière dans la région :

- Poursuite de l'augmentation des méningites à entérovirus au CHU de Nantes
- Augmentation du nombre de diagnostics de coup de chaleur posés par les médecins de SOS Médecins lors du week-end du 6-7 juillet, liée à la hausse des températures
- Augmentation du nombre de diagnostics de piqûres d'insecte posés par les médecins de SOS Médecins Nantes

Méningites virales

Isolements au laboratoire du CHU de Nantes : 12 isolements positifs à entérovirus dans les syndromes méningés parmi 32 recherches effectuées en semaine 27.

Diagnostics aux urgences du CHU de Nantes : forte augmentation du nombre de diagnostics de méningite à entérovirus en semaine 27.

Diagnostics SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire : aucune suspicion de méningite en semaine 27.

Piqûres d'insecte

Diagnostics SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire : le nombre de diagnostics de piqûres d'insecte posés par les médecins a augmenté à Nantes en semaine 27.

Données météorologiques

Indicateurs biométéorologiques (IBM) de Météo-France : les températures ont augmenté depuis la fin de la semaine dernière. Les IBM min et max sont toujours en-dessous des seuils d'alerte pour l'ensemble des départements de la région.

Pathologies liées à la chaleur

Diagnostics SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire : forte augmentation du nombre de diagnostics de coup de chaleur les 6 et 7 juillet (pendant le week-end).

Diagnostics aux urgences des établissements participant au réseau Oscour® de l'InVS : proportion d'hyperthermie ou de coup de chaleur parmi les diagnostics codés très faible en semaine 27.

Enfants de moins de 1 an

Passages aux urgences des enfants de moins de 1 an : nombre de passages dans les CH sentinelles de la région toujours en-dessous du seuil d'alerte en semaine 27.

Personnes âgées

Passages aux urgences des personnes âgées de plus de 75 ans : nombre de passages dans les CH sentinelles de la région toujours en-dessous du seuil d'alerte en semaine 27.

Mortalité chez les personnes âgées : nombre de décès chez les personnes âgées de 85 ans ou plus toujours en-dessous du seuil d'alerte en semaine 26.

Point d'information sur le nouveau Coronavirus (MERS-CoV) en page 2

Point d'information sur les déclarations obligatoires de l'hépatite A, de la légionellose et de la rougeole dans la région en page 3

| Point sur le nouveau coronavirus (MERS-CoV) |

Nouvelle définition de cas depuis le 19 juin 2013 :

Grippe A(H5N1) / Grippe A(H7N9)	Coronavirus (NCoV)
<p>Cas possible :</p> <p>a) Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les pays ou zones à risque (cf. liste ci-dessous), qui, au cours des 10 jours après son retour, a présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> – des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë grave basse (nécessitant une hospitalisation), – sans autres étiologie identifiée pouvant expliquer la symptomatologie. <p>b) Les personnes co-exposées symptomatiques, définies comme celles ayant séjourné dans les zones exposées avec le cas possible/confirmé qui présente une infection respiratoire aiguë quelle que soit la gravité, dans les 10 jours suivant l'exposition.</p> <p>c) Tout contact étroit d'un cas possible/confirmé, qui présente une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa gravité dans les 10 jours suivant le dernier contact avec le cas possible/confirmé pendant que ce dernier était malade (i.e. symptomatique).</p>	<p>Cas possible :</p> <p>a) Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les pays listés ci-dessous, qui, <u>au cours des 14 jours</u> après son retour, a présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> – des signes cliniques et/ou radiologiques de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ou d'infection du parenchyme pulmonaire, avec une fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ et de la toux, sans autre étiologie identifiée pouvant expliquer la pathologie. – Pour les personnes immunodéprimées ou présentant une pathologie chronique, considérer également la survenue d'un syndrome fébrile avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère. <p>b) Tout contact (ex : famille, soignants) d'un cas possible ou confirmé, ayant présenté une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa gravité, <u>dans les 14 jours</u> suivant le dernier contact avec le cas possible/confirmé pendant que ce dernier était malade (i.e. symptomatique). Pour les contacts immunodéprimés ou présentant une pathologie chronique, considérer également la survenue d'un syndrome fébrile, avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère.</p>
<p>Cas confirmé :</p> <p>Cas avec un prélèvement respiratoire indiquant la présence du virus aviaire A(H7N9) ou A(H5N1).</p>	<p>Cas confirmé :</p> <p>Cas possible avec prélèvements indiquant la présence du nouveau coronavirus.</p>

Situation internationale au 02/07/2013 : 77 cas (dont 40 décès) depuis avril 2012 répartis dans 7 pays :

- Allemagne : 2 cas (1 décès)
- Arabie Saoudite : 62 cas (34 décès)
- France : 2 cas (1 décès)
- Italie : 3 cas
- Jordanie : 2 cas (2 décès)
- Royaume Uni : 4 cas (2 décès).
- Tunisie : 2 cas (plus un cas probable décédé)

Situation en France : 215 signalements, 57 cas classés possibles et prélevés, 2 cas confirmés dont 1 décès.

Recommandations du HCSP

- **Nouveau !** Gestion et prévention des infections à MERS-CoV, coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) - 28 juin 2013: <http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=358>
- Règles d'hygiène pour la prise en charge des patients suspects d'infections dues au nouveau coronavirus: <http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=347>
- Prise en charge des patients suspects d'infections dues au nouveau coronavirus: <http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=314>

Pour plus d'information (situation épidémiologique, définition de cas,...)

Site de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV/>


Site du Ministère de la Santé: <http://www.sante.gouv.fr/nouveau-coronavirus>

| Surveillance des maladies à déclaration obligatoire - Situation régionale |

| Déclaration obligatoire d'hépatite A |

Distribution du nombre de cas d'hépatite A domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département
Janvier 2009-juin 2013


Données InVS-Cire provisoires



| Déclaration obligatoire de la légionellose |

Distribution du nombre de cas de légionellose domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de début des signes
Janvier 2009-juin 2013


Données InVS-Cire provisoires



| Déclaration obligatoire de la rougeole |

Distribution du nombre de cas de rougeole domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de début des signes
Janvier 2007-juin 2013


Données InVS-Cire provisoires



| Surveillance des méningites virales |


| CHU de Nantes |

Proportion de LCR positifs à entérovirus parmi les LCR testés, Laboratoire de virologie
Semaines 01/2012 à 27/2013



Source: Laboratoire de virologie du CHU de Nantes


Proportion de diagnostics de méningite à entérovirus posés par les médecins urgentistes parmi les diagnostics codés, Semaines 01/2011 à 27/2013



Source: RPU - Sursaud@InVS


| Associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire |

Nombre de suspicions de méningite posés par les SOS Médecins
Semaines 01/2011 à 27/2013



Source: SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - Sursaud@InVS

Nombre de diagnostics de piqûres d'insecte posés par les SOS Médecins Semaines 01/2010 à 27/2013








Source: SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - Sursaud@InVS

■ Nantes ■ Saint-Nazaire

| Données météorologiques par station météo |

Source: Météo-France —Toulouse

Evolution quotidienne des températures et des IBM depuis le 1er juin 2013




Légende : — Température minimale (Tmin) — IBM minimal (IBM min) Seuil IBM minimal
— Température maximale (Tmax) — IBM maximal (IBM max) Seuil IBM maximal
◇ Week-end

L'indice biométéorologique (IBM) est le couple (IBM min, IBM max), où l'IBM min est la moyenne glissante sur trois jours des températures minimales (Tmin) et l'IBM max la moyenne glissante sur trois jours des températures maximales (Tmax). A chaque IBM (minimal et maximal), correspond un seuil d'alerte différent pour chaque département.

| Surveillance des pathologies estivales liées à la chaleur |

| Associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire |


Nombre de diagnostics de coup de chaleur posés par les SOS Médecins
Semaines 01/2011 à 27/2013



Source: SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - Sursaud®/InVS

| Services des urgences participant au réseau Oscour® |

Proportion de diagnostics d'hyperthermie ou de coup de chaleur posés par les
médecins urgentistes
Semaines 01/2011 à 27/2013





Source: RPU - Sursaud®/InVS

| Activité de passages aux urgences dans les 7 CH sentinelles de la région |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Semaines 01/2010 à 27/2013










| Activité de passages aux urgences par centre hospitalier |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Nombre hebdomadaire de passages de personnes âgées de 75 ans ou plus.

Semaines 01/2010 à 27/2013






| Activité de passages aux urgences par centre hospitalier |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Nombre hebdomadaire de passages d'enfants de moins d'un an.

Semaines 01/2010 à 27/2013






| Décès toutes causes enregistrés dans 21 communes sentinelles |

Source : INSEE / InVS

Les décès sont intégrés jusqu'à la semaine N-2 du fait des délais d'enregistrement. En effet, les données de la semaine dernière ne sont pas totalement exhaustives le jour de la diffusion du bulletin.

Semaines 01/2007 à 26/2013




| Au niveau régional, national et international |

Dans la région :

Bulletin REPHY (Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines), secteur Loire-Atlantique/Nord Vendée, **4 juillet 2013** : Identification de *Dinophysis* en Baie de Vilaine (Ile Dumet), à Pen Bé (Pont Mahé), aux Traicts du Croisic (Le Croisic), en Loire Large (Pornichet et Pointe de Saint Gildas large) et en Vendée Nord (Ile d'Yeu Est surface). Présence de toxines lipophiles supérieures au seuil de sécurité sanitaire pour les moules de la Pointe Pen Bé (Traict de Pen Bé) et de l'Ile Dumet (Baie de Vilaine côte).

Interdiction de pêche aux coquillages sur le littoral atlantique:

www.loire-atlantique.gouv.fr/Interdiction-peche-coquillage



- Newsletter « Alerte pollens » (Nantes et sa région) de l'Association des pollinarius sentinelles de France (APSF), d'Air Pays de la Loire et de l'ARS :

http://www.airpl.org/pollens/pollinarium_sentinelle_et_alerte_pollens

- Le Point Epidémiologie - Surveillance épidémiologique dans les Pays de la Loire :

<http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/Pays-de-la-Loire>

<http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/La-Cire-Pays-de-la-Loire.102179.0.html>

En France :

- Point de l'InVS sur les infections à entérovirus, **12 juin 2012**:

<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Poliomyelite/Points-enterovirus/Point-sur-les-infections-a-enterovirus-au-12-juin-2013>

- Bulletin national d'information du système de veille sanitaire SOS Médecins — Bulletin de l'InVS :

<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-SOS-Medecins>

- La surveillance des urgences par le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences), plaquette de l'InVS de Juin 2013 :

[http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/\(id\)/PMB_9507](http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/(id)/PMB_9507)

Dans le monde :

- Bulletin hebdomadaire international (BHI) de l'InVS :

<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>

- Surveillance, définitions de cas et conduite à tenir pour la grippe aviaire à virus A(H5N1) et A(H7N9), site de l'InVS: <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9>

- Surveillance des infections liées au nouveau coronavirus (MERS-CoV) - Point de l'InVS au **2 juillet 2013** :

<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV/Surveillance-des-infections-liees-au-nouveau-coronavirus-MERS-CoV.-Point-au-2-juillet-2013>

| Indicateurs de surveillance |

- Les indicateurs biométéorologiques (IBM) min et max de Météo-France pour chaque département de la région: l'indice biométéorologique (IBM) est le couple (IBM min et IBM max), où l'IBM min est la moyenne glissante sur 3 jours des températures minimales (Tmin) et l'IBM max est la moyenne glissante sur 3 jours des températures maximales (T max). A chaque IBM (min et max), correspond un seuil d'alerte différent pour chaque département ;
- Les diagnostics d'hyperthermies ou de coup de chaleur posés par les médecins urgentistes des CHU de Nantes et d'Angers, des CH de Saint-Nazaire, Le Mans, Sarthe-et-Loir et de la Roche-sur-Yon/Luçon/Montaigu ;
- Les diagnostics de piqûres d'insecte, de suspicion de méningite, de crises d'asthme et de coup de chaleur posés par les associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire ;
- Les diagnostics de méningite à entérovirus et de crises d'asthme posés par les médecins urgentistes du CHU de Nantes ;
- Les isollements de virus entérovirus dans les syndromes méningés au laboratoire du CHU de Nantes ;
- Les passages aux urgences dans 7 centres hospitaliers "sentinelles" pour les personnes âgées de 75 ans ou plus et les enfants de moins d'un an, à partir du serveur régional de veille et d'alerte (Ardah) ;
- La mortalité "toutes causes" à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans 21 communes sentinelles.

| Méthode d'analyse des données |

Pour les indicateurs d'activité des services d'urgence et la mortalité, un seuil d'alerte hebdomadaire a été déterminé par l'intervalle de confiance unilatéral à 95% d'un modèle de régression périodique. Le dépassement du seuil pendant deux semaines consécutives est considéré comme un signal statistique.

Les bilans de surveillance hivernale sont disponibles sur les liens suivants :

- Hiver 2011-12 :

<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-13-Janvier-2013>

- Hiver 2009-10 :

<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-4-novembre-2010>

- Hiver 2008-09 :

<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-2-novembre-2009>

| Partenaires de la surveillance |

Nous tenons à remercier les partenaires de la surveillance :

- le laboratoire de virologie du CHU de Nantes (Dr M. Coste-Burel, Dr A. Moreau-Klein)
- le laboratoire de virologie du CHU d'Angers (Dr A. Ducancelle, Dr H. Le Guillou-Guillemette, Dr A. Paquin)
- les services d'urgences des établissements hospitaliers sentinelles de la région et des établissements hospitaliers transmettant leurs résumés de passages aux urgences (RPU) à l'InVS
- les services de réanimation de la région
- les deux associations SOS Médecins de la région (Nantes et Saint-Nazaire)
- les établissements d'hébergement de personnes âgées dans la région
- les mairies sentinelles de la région
- l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- le réseau Sentinelles
- le réseau Grog
- le réseau Rephy (Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines)
- Météo-France



Le point épidémiolo

Etablissements hospitaliers sentinelles :

CHU de Nantes
CH de Saint-Nazaire
CHU d'Angers
CH de Cholet
CHD de La Roche-sur-Yon
CH du Mans
CH de Laval

Mairies sentinelles :

Nantes
Saint-Nazaire
Châteaubriant
Saint-Herblain
Guérande
Ancenis
Angers
Cholet
Saumur
Saint-Barthélemy-d'Anjou
Laval
Mayenne
Château-Gontier
Le Mans
Château-du-Loir
La Roche-sur-Yon
Montaigu
Les Sables-d'Olonne
Challans
Luçon
Fontenay-le-Comte

Directrice de la publication :

Dr Françoise Weber,
directrice générale de l'InVS

Comité de rédaction :

Dr Bruno Hubert
Noémie Fortin
Nicole Robreau
Dr Ronan Ollivier
Delphine Barataud
Pascaline Loury
Anne-Hélène Liebert

Diffusion

Cire des Pays de la Loire
17, boulevard Gaston Doumergue
CS 56 233
44262 NANTES CEDEX 2
Tél : 02.49.10.43.62
Fax : 02.49.10.43.92
Email : ARS-PDL-CIRE@ars.sante.fr
<http://www.invs.sante.fr>
<http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/La-Cire-Pays-de-la-Loire.102179.0.html>