

VEILLE HEBDO

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR — CORSE

Point n°2012 – 46 publié le 16 novembre 2012

| Surveillance Chikungunya, Dengue |

Chikungunya, Dengue

Depuis le début de la surveillance, dans les 7 départements des régions Paca et Corse colonisés par *Aedes albopictus*, **586 cas suspects ont été signalés** :

- 461 cas suspects autochtones ;
- 118 cas suspects importés ;
- 7 cas suspects en cours d'investigation.

26 cas de dengue et 4 cas de chikungunya ont été confirmés, tous sont importés.

Les services de lutte anti-vectorielle ont effectué 57 prospections entomologiques autour des cas importés de Paca et 17 traitements focaux anti-moustiques adultes.

Plus d'informations (dispositif, résultats par département, origine des cas importés, situation internationale) en [page 2](#).

| Epidémies hivernales |

Bronchiolite

La proportion de passages aux urgences pour bronchiolite est de 8,9 % cette semaine (vs 8 % en semaine 45).

Le nombre de nouveaux patients enregistré par l'ARBAM Paca lors du week-end du 10 et 11 novembre 2012 est de 76 (82 lors du précédent week-end de garde).

Plus de résultats en [page 3](#).


Grippe

La surveillance des cas graves de grippe a démarré le 1^{er} novembre.

Elle s'appuie sur l'ensemble des services de réanimation hospitaliers des régions Paca et Corse. La surveillance est basée sur le **signalement de tous les cas probables ou confirmés de grippe** hospitalisés dans les services de réanimation ou les unités de soins intensifs. Le signalement se fait par l'intermédiaire d'une fiche à adresser à la Cire Sud par fax (04 13 55 83 47) le jour de l'admission du cas, si possible.

Pour plus d'information vous pouvez contacter : [Nicolas Roux](#) / [Philippe Malfait](#) / [Jean-Luc Lasalle](#)

Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, 24 dernières semaines, Paca
Analyse basée sur 29 services d'urgences de Paca (liste page 3)



| Légionellose |

Depuis le début de l'année, 115 cas de légionellose ont été notifiés : 113 en Paca et 2 en Corse.
Plus de résultats en [page 4](#).



| Surveillance non spécifique (SNS) |

Indicateurs de morbidité

Données du 09/11/2012 au 15/11/2012

Les résultats détaillés par département sont synthétisés [en page 5](#).

Part des non résidents - Page 5.

| Signalements enregistrés dans ORAGES |

Un point hebdomadaire des signalements enregistrés sur le système d'informations

régional partagé, dénommé Orages, est présenté en [page 6](#).

| Surveillance CHIKUNGUNYA, DENGUE |

En France métropolitaine, la déclaration obligatoire des cas confirmés de chikungunya et de dengue (importés et autochtones) a été instaurée en avril 2006. Dans les départements d'implantation du vecteur, du 1^{er} mai au 30 novembre (saison d'activité du moustique tigre), s'ajoute un dispositif local de signalement et de confirmation biologique accéléré des cas suspects, associé à une surveillance entomologique renforcée et à des actions de lutte anti-vectorielle (LAV) péri-focales.

Merci aux cliniciens et laboratoires, de signaler le jour même par fax à l'ARS chaque cas suspect en utilisant la [Fiche de signalement de cas suspects](#), et transmettre rapidement un prélèvement biologique au CNR des arbovirus (IRBA Marseille) avec cette fiche et les [Etiquettes laboratoires](#) pour confirmation du diagnostic.

Plus d'infos :

ARS Paca : [surveillance du chikungunya et de la dengue](#)

InVS : [chikungunya / dengue](#)

DGS : [Instruction N° DGS/RI1-3/2012/168 du 23 avril 2012](#)

INPES - Chikungunya - [Point sur les connaissances et la conduite à tenir pour les médecins](#)

INPES - [Dépliant chikungunya dengue voyageurs grand public](#) - [Plaquette protection voyageur 2009](#)

SMV [Plaquette protection voyageur 2011 : bien se protéger](#)

Bilan du 01/05/2012 au 15/11/2012

département	cas suspects	cas importés confirmés		cas autochtones confirmés		en attente d'investigation	en attente de résultats biologiques	investigations entomologiques		
		dengue	Chik	dengue	Chik			information	prospection	traitement LAV
Alpes-de-Haute-Provence	16	1	0	0	0	0	0	2	2	0
Alpes Maritimes	141	6	1	0	0	2	15	23	21	11
Bouches-du-Rhône	159	13	3	0	0	3	24	31	19	1
Var	210	4	0	0	0	2	2	16	13	4
Vaucluse	29	1	0	0	0	0	0	2	1	0
Corse du Sud	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haute-Corse	16	1	0	0	0	0	0	1	1	1
Total	586	26	4	0	0	7	41	75	57	17

Origine des 26 cas de dengue importés

continent	pays
Amérique	- Brésil, 3 cas - Guyane, 3 cas - Mexique, 1 cas
Afrique	Djibouti, 2 cas
Asie	- Arabie saoudite, 1 cas - Bengladesh, 1 cas - Inde, 1 cas - Indonésie, 6 cas - Thaïlande, 6 cas - Thaïlande - Indonésie, 1 cas - Vietnam, 1 cas

Origine des 4 cas de chikungunya importés

- Cambodge, 2 cas
- Philippines, 1 cas
- République Démocratique du Congo - Kinshasa, 1 cas

Dengue : situation internationale

Dans le dernier [CDTR de l'ECDC \(semaine 45\)](#), il est rapporté :

- Sur le **continent asiatique**, une tendance à la baisse, à l'exception de l'Inde (près de 1 300 cas recensés dans la région de Delhi)
- En **Amérique Centrale**, une activité toujours intense, plus particulièrement au Mexique avec 24 000 cas et une proportion de 50 % de dengue hémorragique.
- Dans les **Caraïbes**, une activité toujours intense à Puerto-Rico (6 500 cas suspects et 25 cas de dengue hémorragique, sérotypes prédominants DENV-1 et 4) et en République Dominicaine (avec 6 000 cas suspects).

La Cire Antilles Guyane signale des foyers épidémiques de dengue en Guyane.

Données des urgences (RPU) Paca

Analyse basée sur 29 services des urgences : APHM (2 services), Arles, Avignon, Briançon, Brignoles, Cannes, Carpentras, Digne-les-Bains, Draguignan, Embrun, Fréjus-St Raphaël, Gap, Grasse, Hyères, Manosque, Marseille Beaugard, Martigues, Nice (Lenvai), Orange, Pertuis, Saint-Laurent du Var (Institut Arnault Tzanck), Saint-Tropez, Salon, la Seyne/Mer, Sisteron, Toulon (Sainte-Musse, HIA), Valréas.

Passages pour bronchiolite : diagnostics principaux J21 pour les moins de 2 ans*

indicateurs services des urgences Paca	2012-42	2012-43	2012-44	2012-45	2012-46
nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	1 588	1 620	1 742	1 665	1 492
passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	62	101	131	134	133
% par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	3,9 %	6,2 %	7,5 %	8,0 %	8,9 %
hospitalisations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	21	35	50	49	49
% par rapport au nombre de bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	34 %	35 %	38 %	37 %	37 %

Données de l'ARBAM Paca

Analyse basée sur les week-ends de gardes de l'association

indicateurs ARBAM Paca	13-14 oct.	20-21 oct.	27-28 oct.	3-4 nov.	10-11 nov.
nombre de jours de garde	2	2	2	2	2
nombre de nouveaux patients vus	44	45	52	82	76
nombre moyen de nouveaux patients par jour de garde	22	22	26	41	38
nombre de séances	75	71	85	127	133

Figure 1 - Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, 24 dernières semaines, Paca





Figure 2 - Evolution du nombre de patients traités par l'ARBAM Paca par week-end de garde, 13/10/2012 – 11/11/2012



Retour sur la saison 2011-2012 en Paca

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 51 et 52 avec 18 % de passages d'enfants pour bronchiolite (par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans).

ARBAM Paca - Pic épidémique enregistré en semaine 51 avec 324 nouveaux enfants suivis pendant le week-end de garde.

Attention : les données des épidémies de 2011-12 et 2012-13 sont à comparer avec prudence :

- Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus important cette saison (5 nouveaux établissements).
- Pour l'ARBAM : le nombre de secteurs de garde est différent entre les 2 saisons (plus de secteurs en 2012-13).

Introduction

Ce point épidémiologique dresse un bilan provisoire des cas de légionellose notifiés dans les régions Paca et Corse qui ont débuté leur maladie durant les 10 premiers mois de l'année 2012.

Méthodologie

Les cas de légionellose retenus pour l'analyse sont les cas notifiés en régions Paca et Corse en 2012 et validés par l'InVS.

Les taux d'incidence ont été calculés à partir des données du recensement Insee de 2008. Ces taux sont calculés dans les départements où ont été notifiés les cas (cas ne résidant pas forcément dans le département).

Résultats

Paca

Le nombre de cas de légionellose notifiés dans la région sur les dix premiers mois de l'année était de 113. Les données du mois d'octobre ne sont pas encore consolidées. Le nombre mensuel de cas le plus élevé a été relevé au mois de juin (tableau 1).

Les taux d'incidence les plus élevés ont été relevés dans les Alpes-Maritimes et le Var, respectivement 3,1 et 3,0 pour 100 000 habitants (tableau 2).

Le sex-ratio H/F était de 2,9 (84/29). La moyenne d'âge était de 62,1 ans (étendue : 22 – 97) et 41 % des cas avaient plus de 65 ans (figure 1).

La létalité était de 6 % (7 décès) mais ce pourcentage pourrait être revu à la hausse en raison d'une mise à jour quelques fois tardive de cette information.

Près de 70 % des cas avaient au moins un facteur favorisant. Quarante-neuf cas (43 % des cas) ont rapporté au moins une exposition à risque.

Une culture a été réalisée dans 18 % des cas.

Corse

Deux cas de légionellose ont été signalés en Corse sur la période d'étude : 1 en Corse du Sud et 1 en Haute-Corse. Il s'agit d'un homme et d'une femme de respectivement 83 et 84 ans.

Discussion

Les nombres de cas notifiés en Paca et en Corse depuis le début de l'année sont comparables à ceux de l'année 2011 à la même période (Paca : 113 versus 117 ; Corse : 2 versus 4).

Un excès de cas est noté au mois de juin 2012 avec en particulier 10 cas dans le seul département des Alpes-Maritimes (figure 2), mais sans détection de source commune de contamination.

Les cas notifiés en Paca-Corse ne représentent qu'une partie des situations pour lesquelles une investigation environnementale est réalisée. A titre d'exemple, la délégation territoriale du Var investigate beaucoup plus de cas que les seuls cas notifiés dans son département (cas notifiés dans d'autres départements mais présents dans le Var pendant la période supposée d'exposition).

Retour sur 2011 en Paca

- **Nombre de cas : 133** (-25 % par rapport à 2010)
- **Incidence : 2,7** pour 100 000 habitants (1,9 en France)
- **Sex-ratio (H/F) : 2,2** (91/42)
- **Age moyen : 64,9** ans
- **Létalité : 14 %** (18 décès)
- **76 %** des cas avec au moins un **facteur favorisant**
- **Culture** effectuée dans **11 %** des cas

Tableau 1 - Répartition mensuelle des cas de légionellose, Paca, janvier à octobre 2012

mois	nombre de cas	%
janvier	15	13%
février	8	7%
Mars	5	4%
avril	6	5%
mai	13	12%
juin	20	18%
Juillet	10	9%
août	8	7%
septembre	13	12%
octobre *	15	13%
novembre		
décembre		
total	113	100 %

* Données du mois d'octobre non consolidées

Tableau 2 - Répartition par département des notifications de cas de légionellose, Paca, janvier à octobre 2012

département	nombre de cas	taux d'incidence pour 100 000 hab.
Alpes-de-Haute-Provence	4	2,5
Hautes-Alpes	3	2,2
Alpes-Maritimes	34	3,1
Bouches-du-Rhône	35	1,8
Var	30	3,0
Vaucluse	7	1,3
total	113	2,3

Figure 1 - Répartition des cas de légionellose par classe d'âge, Paca, janvier à octobre 2012





Figure 2 - Comparaison mensuelle entre 2011 et 2012 des cas de légionellose, Paca



| SNS - PRINCIPAUX INDICATEURS SUIVIS |

Données du 9 au 15 novembre 2012

Source des données / Indicateur	04	05	06	13	83	84	2A	2B
SAMU / Total d'affaires	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SAMU / Transports médicalisés	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SAMU / Transports non médicalisés	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SERVICES DES URGENCES* / Total de passages	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SERVICES DES URGENCES* / Passages d'enfants de moins de 1 an	NI	NI	➔	➔	➔	➔	NI	ND
SERVICES DES URGENCES* / Passages de personnes de 75 ans et plus	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SERVICES DES URGENCES* / Hospitalisations après un passage aux urgences	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SOS MEDECINS / Total consultations			➔	➔	➔	➔	➔	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 2 ans			➔	➔	➔	➔	➔	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 15 ans			➔	➔	➔	➔	➔	
SOS MEDECINS / Consultations de personnes de 75 ans et plus			➔	➔	➔	➔	➔	
SDIS - BMP / Total sorties pour secours à personne				➔				
SDIS - BMP / Sorties pour affections médicales à domicile				➔				

➔ Pas de tendance particulière

➔ Tendance à la hausse (+2σ)

➔ Tendance à la baisse (-2σ)

➔ Forte hausse (+3σ)

➔ Forte baisse (-3σ)

ND Donnée non disponible

NI Donnée non interprétable en raison des faibles effectifs

* établissements sentinelles (51 établissements sur l'inter région) / Informations sur la [méthode d'interprétation](#) en dernière page

| SNS — ESTIMATION DE LA PART DES NON-RESIDENTS |


Introduction - Les régions Paca et Corse sont des régions très touristiques. Certains départements voient leur population tripler à certains moments de l'année. Les activités suivies dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par le tourisme. Afin de faciliter l'analyse de ces données et l'interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans l'inter région. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population présente, la Cire a souhaité, à titre expérimental, mesurer et suivre au travers des résumés de passages aux urgences (RPU), la part des passages de personnes ne résidant pas dans l'inter région.

Méthodologie - L'étude est pour l'instant limitée à la région Paca. Pour la Corse, les hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia ont intégré le réseau Oscour® récemment. Les données RPU de ces 2 établissements seront analysées prochainement. L'étude en Paca est basée sur les 24 services des urgences fournissant des RPU en routine depuis plus d'un an. La part de passages aux urgences des personnes ne résidant pas dans la région Paca est calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU.

Résultats - Comme le montre la figure ci-contre, la part des passages aux urgences de personnes ne résidant pas dans la région Paca est très variable tout au long de l'année : si elle était inférieure à 5 % au mois de janvier, elle a dépassé les 20 % en plein été.

La proportion de passages aux urgences des personnes résidant habituellement hors de la région Paca est de 5,1 % cette semaine.

Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région Paca sur les 52 dernières semaines



| Signalements enregistrés dans ORAGES |

La veille sanitaire est menée au sein des Agences régionales de santé (ARS) via les plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires à partir de signaux transmis par leurs partenaires et les signaux issus des systèmes de surveillance.

Le nécessaire partage en temps réel des signaux et des informations relatives à leur traitement entre les différents professionnels au sein des plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires requiert la mise en place d'outils de partage d'informations.

Les ARS Paca et Corse se sont dotées d'un système d'information régional partagé, dénommé Orages (Outil de recueil, d'analyse et de gestion des événements sanitaires), dédié à l'enregistrement et au traitement des signalements et alertes sanitaires survenant sur leur territoire.

Les principaux objectifs d'un tel système sont de :

- permettre l'enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires ;
- partager en temps réel au niveau régional les informations relatives aux signaux sanitaires (réception, validation, évaluation et gestion) ;
- faciliter la rétro information des acteurs de la veille sanitaire.

Le tableau ci-dessous présente les différents signaux enregistrés dans l'application sur les régions Paca et Corse sur les 5 dernières semaines et pour le cumul des semaines précédentes depuis début 2012. Les MDO « tuberculose », « VIH », « Hépatite B » ne sont pas consignées dans ORAGES. L'utilisation de l'outil pour les signaux environnementaux est pour l'instant limitée.

Seuls les signaux validés sont présentés dans le tableau.

Les signaux présentés dans ce tableau ne sont pas uniquement des signaux notifiés dans les régions Paca et Corse. Il peut s'agir de signalements d'autres régions qui ont demandé une intervention des services de l'ARS Paca ou de l'ARS Corse (vérification d'expositions pour la légionellose, recherche de contacts pour un cas d'IIM...).

Récapitulatif des signalements par type et par semaine de signalement sur les 5 dernières semaines en Paca et en Corse

(dernière interrogation de la base le 16 novembre 2012 à 14:00)

	2012 Total semaines antérieures		2012-42		2012-43		2012-44		2012-45		2012-46	
	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E
Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatite A	31	1	3	0	1	0	2	0	1	0	1	0
Infections invasives à méningocoques	27	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Légionellose	125	1	5	1	8	0	5	0	6	0	7	0
Listériose	16	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Rougeole	41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Toxi-infection alimentaire collective	87	1	1	1	2	0	3	0	1	0	1	0
Epidémie de GEA	40	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Epidémie d'IRA	82	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Autre(s) infectieux	82	28	3	0	3	0	2	0	1	2	0	0
Autres signaux	65	4	1	0	1	0	2	0	0	0	4	0

| Dispositif de surveillance non spécifique |

En juin 2005, la Cire Sud a mis en place pour les régions Paca et Corse un **système de surveillance non spécifique basé sur un réseau pérenne de partenaires**. Ce système constitue le socle de la veille sanitaire régionale, adaptable à toutes situations particulières comme notamment lors des plans canicule (2005 à 2011), durant la coupe du monde de rugby à Marseille (2007) et lors d'épidémies hivernales (grippe, bronchiolite...).

Des **indicateurs de mortalité, de morbidité et d'activité**, collectés par les partenaires du système sont **analysés au quotidien**. Le noyau commun à tous les départements est constitué par les principaux états civils et hôpitaux (en particulier les services des urgences et les Samu).

Les **objectifs** du dispositif sont :

- d'identifier précocement des événements sanitaires pouvant nécessiter une réponse adaptée ;
- de fédérer autour de ce système de surveillance un réseau de partenaires pérenne ;
- de participer à tout système de surveillance spécifique mise en place dans le cadre de plans, d'événements exceptionnels ou lors d'épidémies.

Méthode d'interprétation

Les résultats de la surveillance présentés dans les tableaux sont issus d'une méthode statistique appelée « **cartes de contrôle pour données individuelles** ». Les seuils sont définis à partir de l'activité moyenne et la moyenne des différences d'activité des 12 semaines précédentes. Un intervalle est alors estimé pour cette moyenne dont les bornes constituent les seuils utilisés. Pour chaque indicateur, la valeur moyenne quotidienne de la semaine analysée est comparée aux valeurs seuils définies (seuils à 2 et 3 écarts-types).

D'autres outils complémentaires ont été développés par la Cire afin de faciliter l'interprétation des données de la surveillance.

Site Internet de l'ARS Paca : [Veille sanitaire](#)

| Dispositif de surveillance des intoxications au CO |

Le système de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone a été mis en place au cours du 2ème trimestre 2005. Il est piloté au niveau national par l'InVS.

Les objectifs du dispositif sont :

- **d'alerter** afin de prendre les mesures de gestion du risque immédiates en soustrayant les personnes exposées de la source et de prévenir les récidives ;
- **de décrire** la répartition spatio-temporelle des intoxications au CO, les circonstances de survenue de ces intoxications et leurs facteurs de risque ;
- **d'évaluer** l'efficacité générale de la politique de prévention.

Tout signalement d'intoxication au CO suspectée ou avérée doit être transmis dans les meilleurs délais à l'Agence régionale de santé, hors incendie.

Il donne lieu à une **enquête environnementale** par les services Santé-Environnement des délégations territoriales de l'ARS ou les services communaux d'hygiène et de santé et à une **enquête médicale** par le Centre antipoison et de toxicovigilance de Marseille pour la région Paca et par les médecins et infirmières de l'ARS pour la Corse.

L'enquête médicale permet de confirmer l'intoxication au CO et de décrire la gravité des symptômes et la prise en charge des personnes intoxiquées.

L'enquête environnementale a pour but d'identifier la source d'intoxication, de mettre en sécurité l'installation, de définir les éventuels travaux à effectuer et d'éviter ainsi les récidives.

Pour signaler : [fiche de signalement](#) à transmettre par fax au 04 13 55 83 44

En savoir plus : site Internet de l'ARS Paca

[Surveillance des intoxications au CO](#)
[Prévention des intoxications au CO](#)

Le point épidémio

La Cire Sud remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :

Etats civils des régions Paca et Corse.

Régie municipale des pompes funèbres de Marseille.

Samu des régions Paca et Corse.

Etablissements de santé des régions Paca et Corse.

SOS Médecins de Cannes, Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Gardanne-Trets, Toulon-Fréjus, Avignon, Ajaccio.

SDIS des Bouches-du-Rhône et Bataillon des marins pompiers de Marseille.

Association réseau bronchiolite asthme mucoviscidose Paca [ARBAM Paca](#)

Agences régionales de santé (ARS) [Paca](#) et [Corse](#)

Observatoire régional des urgences Paca [ORU Paca](#)

Cliniciens et LABM des régions Paca et Corse.

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

EID-méditerranée

CAPTIV de Marseille

Si vous désirez recevoir par mail **VEILLE HEBDO**, merci d'envoyer un message à ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr

Diffusion

ARS Paca - Cire Sud
132 boulevard de Paris,
CS 50039,
13331 Marseille Cedex 03
☎ 04 13 55 81 01
☎ 04 13 55 83 47
ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr