

Pratiques de dépistage des hépatites virales par les médecins généralistes en France métropolitaine en 2009

A. Gautier, C. Jestin (Inpes, Saint-Denis, France)

Introduction

En France métropolitaine, on estime que 500 000 adultes seraient atteints d'une hépatite chronique B ou C. Bien que le dépistage soit recommandé aux personnes présentant des facteurs de risques, la moitié des personnes infectées l'ignoraient en 2004⁽¹⁾. Renforcer le dépistage des hépatites virales est une priorité du plan national de lutte contre les hépatites virales B et C.

Connaître les pratiques de dépistage des médecins généralistes (MG) en fonction des facteurs de risques est un préalable nécessaire pour proposer des recommandations et faciliter leurs mises en oeuvre.

Méthode

Les résultats présentés sont issus du Baromètre santé médecins généralistes 2009⁽²⁾, enquête déclarative, menée par téléphone auprès d'omnipraticiens exerçant une activité libérale en France métropolitaine.

L'échantillon a été constitué par tirage aléatoire simple dans les fichiers de la société Cegedim®. Les interviews ont été réalisées entre novembre 2008 et janvier 2009. Au total, 2083 médecins ont répondu à l'ensemble du questionnaire (taux de participation de 57,1%). 1898 l'ont fait par téléphone ; 185 ont préféré répondre par internet, solution proposée à tout médecin ayant refusé l'entretien téléphonique.

Le questionnaire d'une durée moyenne de 25 minutes comportait deux séries de questions sur les pratiques de dépistages des hépatites virales B et C. Les données présentées n'ont pas été redressées, les caractéristiques de l'échantillon étant proches des données disponibles via les fichiers administratifs de la Cnamts (Snir) et de la Drees (Adeli).

Résultats

Prescription du dépistage de l'Hépatite C

Les médecins généralistes interrogés proposent fréquemment le dépistage de l'hépatite C aux usagers de drogues par voie intraveineuse (76,6% déclarent leur proposer de manière systématique) ainsi qu'aux personnes transfusées avant 1992 (59,5%).

A l'inverse, les MG proposent de manière moins fréquente ce dépistage aux personnes ayant une asthénie importante et durable (28,4% leur proposant systématiquement), ainsi qu'aux personnes ayant subi un acte chirurgical ou médical invasifs (17,6%).

Prescription du dépistage de l'Hépatite B

La proposition de dépistage de l'hépatite B est proposée aux usagers de drogues par voie intraveineuse et nasale par 73,1% des MG. Plus de la moitié des médecins déclare proposer ce dépistage de manière systématique à l'entourage familial d'un patient porteur de l'Antigène HBs positif (61,8%) ainsi qu'aux personnes ayant des comportements sexuels à risques (55,9%). En revanche, la proposition de ce dépistage est moins régulière pour les personnes originaires d'un pays de forte endémie (Asie, Afrique subsaharienne...) ainsi que pour celles en situation de précarité : respectivement, un peu plus d'un généraliste sur trois (38,6%) et un sur sept (14,3%) déclare le faire systématiquement.

Figure 1 : Proposition de sérologie du virus de l'hépatite C selon les caractéristiques du patient (en %)





Figure 2 : Proposition de sérologie du virus de l'hépatite B selon les caractéristiques du patient (en %)



Les MG de plus de 50 ans participants à un réseau de santé (notamment lorsqu'il s'agit d'un réseau hépatites) déclarent plus que les autres proposer systématiquement le dépistage des hépatites virales B ou C.

Conclusion

Les résultats de cette enquête montrent que les pratiques de dépistage des hépatites B et C des médecins interrogés sont en accord avec les recommandations pour certaines expositions à risque. Le dépistage du VHC pourrait cependant être amélioré notamment pour les personnes tatouées ou ayant un piercing. Le dépistage du VHB pourrait être plus souvent proposé aux personnes originaires d'un pays d'endémie ou en situation de précarité.



Références

(1) Meffre C., Le Strat Y., Delarocque-Astagneau E., Antona D., Desenclos J.-C., Prévalence des hépatites B et C en France en 2004. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire, 2007 : 114p.

(2) Gautier A., dir. Baromètre santé médecins généralistes 2009. Saint-Denis : Inpes, coll. Baromètres santé, 2011 : 266p.