


Surveillance des épidémies hivernales

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS)




Évolution régionale : ➔

Activité en baisse, épidémie terminée

Page 2

GASTRO-ENTERITE




Évolution régionale : ➔

Activité en hausse, phase post-épidémique

Page 3

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Évolution régionale : ➔

Activité en baisse, 13^{ème} semaine épidémique

Page 4

Autres surveillances régionales

Mortalité toutes causes (données Insee) : En S10, la mortalité toutes causes (tous âges et 65 ans ou plus) est au-dessus des valeurs attendues à cette période. **page 8**

Faits marquants

Grippe : Au niveau national : L'épidémie de grippe persiste en France métropolitaine. Une nette diminution des indicateurs de l'activité grippale est cependant observée en semaine 11. Le taux de consultations pour syndrome grippal estimé à partir des données du Réseau Sentinelles est de 108/100 000 habitants [Intervalle de confiance à 95% : 93-123], incidence inférieure aux données consolidées de la semaine 10 (143/100 000 habitants [Intervalle de confiance à 95% : 128-158]).

Au niveau régional : L'activité grippale est en baisse en Centre-Val de Loire. Entre S45-2017 et S10-2018, 116 admissions en réanimation pour grippe grave ont été signalées au CHRU de Tours et au CHR d'Orléans, dont 6 en S10-2018.

Rougeole

Au niveau national

Entre le 6 novembre 2017 et le 19 mars 2018, 1 077 cas de rougeole ont été déclarés dans 64 départements de France, dont 47 % en région Nouvelle-Aquitaine. Ces 1 077 cas ont entraîné 229 hospitalisations, dont 99 formes compliquées, 10 admissions en réanimations et **1 décès**. Ceci porte à 21 le nombre de décès par rougeole depuis 2008. 87 % des cas sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés. Plusieurs foyers de cas groupés sont actuellement signalés dans des communautés précaires peu ou non vaccinées, des crèches, des établissements scolaires et des établissements de santé. Plus d'informations sont disponibles [ici](#).

Au niveau régional

Attention, les données régionales présentées jusqu'à la semaine dernière étaient issues des données brutes de l'ARS. Dorénavant seront présentées les données traitées par Santé publique France. Il peut y avoir des divergences liées au délai de transmission des données.

Entre le 6 novembre 2017 et le 19 mars 2018, **38** cas de rougeole ont été déclarés en région Centre-Val de Loire : 29 en Indre-et-Loire, 7 en Eure-et-Loir et 2 dans le Cher.* Parmi les cas, 28 sont des enfants et 10 des adultes ; 27 n'étaient pas à jour de leurs 2 doses de vaccin ROR. Un cas groupé en établissement scolaire impliquant 4 enfants a été identifié en Indre-et-Loire. L'ARS et ses partenaires mettent en œuvre des mesures préventives, notamment la vaccination des sujets-contacts autour des cas.

Se protéger contre la rougeole : la vaccination


La rougeole peut entraîner des **complications respiratoires et neurologiques graves**. Elle est très contagieuse : **1 personne atteinte peut contaminer jusqu'à 20 personnes**. La vaccination est la meilleure protection individuelle et collective.

Le calendrier vaccinal comporte l'injection d'une première dose à l'âge de 12 mois et d'une seconde à l'âge de 16-18 mois ; **cette vaccination est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2018**. Un rattrapage vaccinal est recommandé pour tout sujet né depuis 1980 et âgé de plus de 18 mois non à jour dans ses vaccinations.

La vaccination ROR est contre-indiquée pendant la grossesse.

Personnes à risque : les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an sont à risque de subir des formes graves de rougeole. Ils peuvent cependant être protégés indirectement par la vaccination de leur entourage.

La vaccination des professionnels de santé est essentielle.



* Ces chiffres ne tiennent pas compte des cas initialement déclarés, mais infirmés par la suite.

Pour en savoir plus : [Calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique](#), et <http://www.info-rougeole.fr/vaccination.html>

**CIRE
Centre-Val de Loire**

Le point épidémio

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

L'épidémie de bronchiolite est terminée en région Centre-Val de Loire.

Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est en baisse en S11, avec 6 consultations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, soit 4,2 % de l'activité pour cette classe d'âge. L'activité est comparable à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en baisse en S11, avec 13 passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, soit 3,5 % de l'activité pour cette classe d'âge. L'activité est inférieure à celle observée l'année précédente sur la même période. La part de la bronchiolite parmi les hospitalisations est de 9,8 %.




Figure 1- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 2- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018

Semaine	Nombre d'hospitalisations	Pourcentage de variation (S -1)	Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations
2018-S11	5	-16.7%	9.8%
2018-S10	6	-14.3%	11.1%

Tableau 1- Hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Centre-Val de Loire

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

Prévention de la bronchiolite

La **bronchiolite** est une maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (jouets, tétines, doudous...).

La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- **Se laver les mains** et demander à toute personne qui approche le nourrisson de se laver les mains, surtout avant de préparer les biberons et les repas ;
- **Éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics** très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...) ;
- **Nettoyer régulièrement les objets** avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...) ;
- **Aérer la chambre** régulièrement ;
- **Éviter le contact avec les personnes enrhumées** et les lieux enfumés.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).

GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGÜES

L'épidémie de gastro-entérite et de diarrhées aiguës est en phase post-épidémique en région Centre-Val de Loire.

Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est en hausse en S11, avec 201 consultations pour gastro-entérite aiguë (GEA), soit 7,9 % de l'activité totale. L'activité est comparable à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en légère baisse en S11, avec 142 passages aux urgences pour GEA, soit 1,8 % de l'activité totale. L'activité est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Réseau Sentinelles** : L'incidence des diarrhées aiguës vues en consultation de médecine générale est en hausse en S11, avec 115 cas pour 100 000 habitants (IC95% [62 ; 168]). L'incidence est comparable à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Surveillance des GEA en Ehpad** : Les Ehpad de la région ont signalé 32 épisodes de cas groupés de GEA depuis le début de la surveillance en S40-2017, dont 2 en S11-2018.




Figure 3- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour GEA, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018



Figure 4- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour GEA, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 5- Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 habitants) des diarrhées aiguës, Réseau Sentinelles, Centre-Val de Loire, 2015-2018

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la gastro-entérite : [cliquez ici](#)

Prévention de la gastro-entérite

Les GEA hivernales sont surtout d'origine virale. Elles se manifestent, après une période d'incubation variant de 24 à 72 heures, par de la diarrhée et des vomissements qui peuvent s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales et parfois de fièvre. La durée de la maladie est de l'ordre de quelques jours. La principale complication est la déshydratation aiguë qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène :

- **Se laver soigneusement et fréquemment les mains** (eau et savon, ou produit hydro-alcoolique). Les mains constituant le vecteur le plus important de la transmission des virus entériques, c'est l'une des meilleures façons d'en limiter la transmission.
- **Nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces** à risque élevé de transmission (en particulier dans les services de pédiatrie et les institutions accueillant des personnes âgées). Certains virus sont très résistants dans l'environnement et sur les surfaces.
- **Lors de la préparation des repas, appliquer des mesures d'hygiène strictes** (lavage soigneux des mains) avant la préparation des aliments et à la sortie des toilettes (en particulier dans les collectivités : institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches...) ; **l'éviction des personnels malades** (cuisines, soignants...) permet d'éviter ou de limiter les épidémies d'origine alimentaire.

La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la **réhydratation précoce** à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).

La région Centre-Val de Loire est en phase épidémique pour la 13^{ème} semaine consécutive.

Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est en baisse en S11, avec 59 consultations pour grippe, soit 2,3 % de l'activité totale. L'activité est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en légère baisse en S11, avec 61 passages aux urgences pour grippe, soit 0,8 % de l'activité totale. L'activité est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Réseau Sentinelles** : L'incidence des syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale est en diminution en S11, avec 65 cas pour 100 000 habitants (IC95% [31 ; 99]). L'incidence est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Surveillance des IRA en Ehpad** : Les Ehpad de la région ont signalé 51 épisodes de cas groupés d'IRA depuis le début de la surveillance en S40-2017, dont 6 en S11-2018.
- **Surveillance des cas graves en réanimation** : Les services de réanimation et les unités de soins continus du CHRU de Tours et du CHR d'Orléans ont signalé 116 cas graves de grippe depuis le début de la surveillance en S45-2017, dont 8 en S10-2018. Parmi ces cas, 77 sont en lien avec une grippe de type A et 35 avec une grippe de type B (non typé pour 4 cas). Trois cas concernent des enfants de moins de 15 ans. Plus de la moitié des cas ont été admis en réanimation de S51-2017 à S02-2018.




Figure 6- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour grippe, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 7- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour grippe, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 8- Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 habitants) des syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, Centre-Val de Loire, 2015-2018

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la grippe : [cliquez ici](#)

Prévention de la grippe

La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus *Influenzae*. Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre 2 types, A et B, se divisant eux-mêmes en deux sous-types. Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact avec des objets contaminés. Les lieux confinés et très fréquentés sont propices à la transmission de ces virus.

La prévention de la grippe repose sur :

- **Les mesures d'hygiène simples :**

- Concernant le malade, il est recommandé, dès le début des symptômes, de : - limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier les personnes à risque ; - se couvrir la bouche à chaque fois qu'il tousse ; - se couvrir le nez à chaque fois qu'il éternue ; - se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d'un couvercle ; - ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique jeté dans une poubelle recouverte d'un couvercle. Tous ces gestes doivent être suivis d'un lavage des mains à l'eau et au savon ou, à défaut, avec un produit hydro-alcoolique.
- Concernant l'entourage du malade, il est recommandé de : - éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne à risque ; - se laver les mains à l'eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ; - nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

- **La vaccination :** elle est recommandée pour toutes les personnes de 65 ans et plus, pour certaines personnes considérées comme fragiles car souffrant de pathologies chroniques (affections respiratoires ou cardiovasculaires, diabète, obésité morbide...), pour les femmes enceintes afin qu'elles se protègent elles-mêmes et protègent leur enfant, ainsi que pour l'entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque graves.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).


Des vidéos pour comprendre la grippe : symptômes, transmission gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres : [cliquez ici](#).

Devenez acteur de la surveillance de la grippe : [cliquez ici](#).

GrippeNet.fr permet à chacun de participer à la surveillance et à la recherche sur la grippe en France, de façon anonyme, volontaire et directement en ligne. Pas besoin d'être malade pour participer !


Le réseau Sentinelles, coordonné par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), et en collaboration avec Santé publique France, permet le recueil, l'analyse, la prévision et la redistribution de données épidémiologiques hebdomadaires issues de l'activité des médecins généralistes libéraux sur le territoire métropolitain.

Données nationales du réseau Sentinelles



Données de l'antenne Centre du réseau Sentinelles

En semaine 11 (du 12/03/2018 au 18/03/2018), parmi les 61 médecins généralistes inscrits au réseau Sentinelles en région Centre, 17 ont participé à la surveillance des indicateurs du réseau. L'activité rapportée par ces médecins était faible pour les syndromes grippaux, et modérée pour les diarrhées aiguës et la varicelle.



Appel à participation

Vous êtes médecin généraliste et vous êtes sensible à l'épidémiologie et à la recherche en médecine générale, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur le réseau Sentinelles. (Vous pouvez contacter Mathieu Rivière, l'animateur du réseau pour votre région aux coordonnées ci-dessous)

Mathieu Rivière



02 38 74 40 05




mathieu.riviere@jplesp.upmc.fr

Au niveau national : En S11-2018, en médecine ambulatoire (Sentinelles), 69% des 75 prélèvements sont positifs pour la grippe. Cette proportion est relativement stable par rapport à celle de la semaine 10 (70%). En milieu hospitalier (Renal), la proportion de prélèvements positifs pour grippe est de 20% (données préliminaires), proportion nettement inférieure à celle de la semaine 10 (25%).

Au niveau régional : En S11-2018, les virus circulants majoritairement identifiés au laboratoire de virologie du CHRU de Tours étaient les virus de la grippe B (27 %), les rhinovirus (14 %), les metapneumovirus de l'homme (5 %) et les virus de la grippe A (4 %). Le pourcentage de détections positives pour grippe est en légère baisse (31 % en S11, contre 35 % en S10).

Données issues de l'analyse des prélèvements respiratoires par PCR multiplex (Allplex™, Seegene)



* Nombre de prélèvements réalisés, non exclusif : un même prélèvement peut être positif pour plusieurs virus. Source : Laboratoire de virologie.

Figure 9- Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par le laboratoire de virologie du CHRU de Tours

MORTALITE TOUTES CAUSES

Synthèse des données disponibles :

En S10, les données de l'Insee concernant la mortalité toutes causes (pour tous âges et pour les sujets de 65 ans ou plus) sont au-dessus des valeurs attendues à cette période.




Figure 10- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, Insee, Centre-Val de Loire




Figure 11- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Insee, Centre-Val de Loire

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)

ANALYSE REGIONALE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Selon les prévisions, la qualité de l'air sera moyenne en cette fin de semaine, avec un indice de qualité de l'air ATMO à 3-4.




Figure 12- Analyse régionale de la pollution atmosphérique

Source : Cartographie réalisée par Lig'Air - Ocarina/Prevair (<http://www.ligair.fr/cartographies>)

L'indice ATMO est calculé pour une journée et qualifie la qualité de l'air global pour une zone géographique.

Le calcul est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution atmosphérique :

ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, particules en suspension.

L'indice ATMO ou indicateur de la qualité de l'air est égal au plus grand des quatre sous-indices.

	Nombre de cas et localisation	Commentaires
Maladies à déclaration obligatoire		
Infection invasive à méningocoque	1 cas dans le Loiret	1 adolescent de 18 ans
Rougeole	3 cas en Eure-et-Loir 1 cas dans l'Indre 10 cas en Indre-et-Loire	1 garçon de 10 ans 1 fille de 11 ans 1 femme de 55 ans 1 patient contact d'un cas index 1 homme de 28 ans 1 femme de 26 ans 1 fille de 12 ans 1 adolescente de 15 ans 1 fille d'un an 1 femme de 28 ans 1 garçon de 6 ans 1 fille de 4 ans 1 homme de 34 ans 1 femme de 31 ans
Suspicion de TIAC	1 événement dans l'Indre 2 événements en Indre-et-Loire	27 personnes intoxiquées dans un établissement médico-social 73 élèves d'une école maternelle et primaire ont été intoxiqués 5 personnes intoxiquées après avoir mangé dans un restaurant
Tuberculose	1 cas en Eure-et-Loir 2 cas en Indre-et-Loire 2 cas dans le Loiret	1 femme de 80 ans 1 homme de 42 ans 1 fille de 5 ans 1 femme de 30 ans 1 homme de 74 ans
Infection tuberculeuse latente	1 cas dans le Cher	1 adolescent de 15 ans
Légionellose	1 cas en Eure-et-Loir	1 homme de 81 ans
Listériose	1 cas dans le Cher	1 homme de 85 ans
Hépatite A	3 cas dans l'Indre	1 homme de 56 ans 1 homme de 49 ans 1 homme de 43 ans
Maladies sans déclaration obligatoire		
Infection respiratoire aiguë en collectivité pour personnes âgées	2 événements en Eure-et-Loir 1 événement en Indre-et-Loire 2 événements dans l'Indre 1 événement en Indre-et-Loire 1 événement dans le Loiret	13 résidents malades 9 résidents malades, dont 2 hospitalisés et 1 membre du personnel 6 résidents et 1 membre du personnel malades 6 résidents et 1 membre du personnel malades 7 résidents malades 24 résidents malades
Gastro entérite aiguë en collectivité pour personnes âgées	1 événement en Indre-et-Loire 1 événement dans le Loiret	11 résidents et 1 membre du personnel malades 14 résidents et 1 membre du personnel malades
Gale	1 cas dans l'Indre	1 membre du personnel d'un établissement scolaire
Infection associée aux soins	3 événements en Indre-et-Loire 1 événement dans le Loiret	9 cas de gripes dans un service de soins de suite et rééducation 22 cas de grippe dans un service de soins de suite et rééducation 7 cas de grippe dans un service psychiatrie 5 cas de gastro entérite dans un service hépato-gastro entérologie
Suspicion de Coronavirus	1 cas en Eure-et-Loir	Cas non confirmé

Tableau 2- Synthèse des signalements d'événements sanitaires dans la région Centre-Val de Loire du 12/03/2018 au 18/03/2018

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) :

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par Santé publique France. Il couvre actuellement environ 88 % de l'activité des services d'urgences en France, 90 % de l'activité SOS Médecins, 80 % des décès quotidiens et 6 % de la certification électronique des décès. Les données des consultations sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- **Les données des associations SOS Médecins** (Bourges, Orléans et Tours pour la région Centre-Val de Loire) : ces associations assurent une activité de continuité et de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et les médecins traitants. Ses médecins interviennent 24h/24, en visite à domicile ou en centre de consultation.
- **Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour® – Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : les urgentistes consultent 24h/24 au sein de l'établissement de santé. Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à Santé publique France sous forme de résumé de passage aux urgences (RPU). Les nombres sont calculés à établissements non constants.
- **La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées de la région (qui représente près 79 % des décès de la région)** : un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé EuroMOMO (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.
- **Les données de certification des décès** (CépiDc – Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis aux agences régionales de santé (ARS) et au CépiDc de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) par voie papier ou voie électronique, puis à Santé publique France.

Les données de virologie présentées ici sont les données transmises par le laboratoire de virologie du CHRU de Tours, issues de l'analyse des prélèvements respiratoires par PCR multiplex (Allplex™, Seegene). Les échantillons sont transmis par les services du CHRU ainsi que par différents établissements extérieurs (CH Amboise, Centre Bois-Gibert, CRF Bel Air, Maison de retraite de Beaune, CH Bourges, CH Blois, CHLS La Membrolle, Luynes SSR SEHPA, CH Chinon).

La surveillance des cas graves de grippe fait partie de la surveillance de la grippe en milieu hospitalier. En région Centre-Val de Loire, les professionnels des services de réanimation adultes et pédiatriques du CHRU de Tours et du CHR d'Orléans signalent à la Cire l'ensemble des patients admis dans leur service pour grippe (confirmée biologiquement ou suspectée devant une forme clinique grave sans autre étiologie identifiée, dont le tableau clinique et l'anamnèse évoquent le diagnostic de grippe).

La surveillance des IRA et GEA en Ehpad : le médecin coordonnateur ou la personne « référent épidémie » de chaque Ehpad signale à l'ARS via une fiche de signalement standardisée tout cas groupé d'IRA ou de GEA, défini comme la survenue d'au moins 5 cas d'IRA ou de GEA d'origine infectieuse dans un délai de 4 jours, parmi les personnes résidentes de l'établissement. La transmission à l'ARS se fait par mail à ars45-alerte@ars-sante.fr ou par fax au 02 34 00 02 58.

Les regroupements syndromiques suivis sont composés :

- Pour la grippe ou syndrome grippal : codes J09, J10, J11 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Pour la bronchiolite : codes J210, J218 et J219, chez les enfants de moins de 2 ans ;
- Pour la GEA : codes A08, A09 et leurs dérivés.

Pour les regroupements syndromiques précédents, depuis la saison hivernale 2016-2017, la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de **méthodes statistiques** appliquées à 2 ou 3 sources de données (SOS Médecins, Oscour® et, selon la pathologie, réseau Sentinelles). Sont appliquées jusqu'à trois méthodes statistiques, selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique « de Serfling » sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées ; (ii) un modèle de régression périodique « robuste » avec pondération des journées selon leur valeur ; et (iii) un modèle de Markov.

Point qualité des données – S09-2018

	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = participation au dispositif depuis la semaine S40-2014	3 / 3 associations	21 / 25 services d'urgence
Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements	92,4 %	44,9 %

Le point épidémiolo

Remerciements à nos partenaires :

- Les 25 services d'urgences du réseau Oscour®
- Les associations SOS Médecins de Bourges, Orléans et Tours
- Le réseau Sentinelles
- Les systèmes de surveillance spécifique :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérites aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées
 - Analyses virologiques réalisées aux CHRU de Tours
- L'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire et ses délégations départementales
- GCS Télésanté Centre
- Les Samu
- Les services d'état civil des 9 communes informatisées
- Lig'Air
- Météo France
- Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)



Directeur de la publication

François Bourdillon
Directeur général
Santé publique France

Responsable de la Cire

Dominique Jeannel

Comité de rédaction

Esra Morvan
Jean-Rodrigue Ndong
Isa Palloure
Julie Wendling
Marie Ansoborlo

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr
Twitter : @sante-prevention

Diffusion

Cire Centre-Val de Loire
Tél. 02 38 77 47 81
cire-cvl@santepubliquefrance.fr