Épidémiologie récente des infections invasives à méningocoques en France

Anne Perrocheau

InVS

Surveillance des infections invasives à méningocoque (IIM)

- **Signalement**

- **Système d'alerte : Dépistage précoce des cas groupés, d'émergence d'une souche particulière, détection de situation locale d'hyperendémicité**
- **Tableau de bord et analyses hebdomadaires (séro groupe, age, évolution, par départements).**

- **Notification**

- **Fiche de déclaration obligatoire (DO)**
- **Suivi des tendances**
- **Impact des recommandations**

Signalement et notification

définition de cas

1985- Juillet 2000

- Isolement de *N.meningitidis* dans le sang ou le LCR
- Antigènes solubles dans le sang, le LCR ou les urines

Août 2000

- Isolement de *N. meningitidis* dans un site stérile
- Diplocoques gram - à l'examen direct du LCR
- Purpura fulminans
- LCR évocateur de méningite bactérienne purulente et accompagné de :
 - d'éléments purpuriques cutanés
 - d'ags dans le sang, les urines ou le LCR
 - D'une PCR positive LCR ou sérum

Cas groupés et seuils d'alerte

- Au moins trois cas en moins de 3 mois, sans contact direct, dans une même communauté
ET
Taux d'incidence $\geq 10 / 100\ 000$
- Nombre important de cas avec critères de gravité inhabituels dans un intervalle de temps court

Méningocoque de sérogroupe C

- Au moins 5 cas dans un même communauté pendant 52 semaines
ET
Taux d'incidence $\geq 2 / 100\ 000$

Evolution des IIM en France 1985-2003

Evolution des sérogroupes, IIM France 1985-2003

Cas de sérotype C selon l'âge 1998-2003

Evolution des décès et de la létalité des IIM en France 1985-2003

■ Décès — Létalité (%)

Taux d'incidence des IIM par département, France 2003

* Les taux pour 100000 habitants sont calculés sur les populations totales du recensement de l'INSEE de 1999.

Cas groupés d'IIM B à Metz, juin-juillet 2003

- 7 cas en 3 semaines (4 groupe B, 2 méningites bactériennes, 1 purpura fulminans)
- 6 résidant un même quartier, incidence : 33 / 100 000
- Cas index + 2 cousins, 2 contacts scolaires, 1 ami, 1 cas sans contact connu
- Taux d'incidence cas sans contact direct 10 j avant le début des signes : 17 / 100 000 habitants
- Souche B14:P1,7,16, complexe clonal ET5

=> Chimio prophylaxie des habitants de la zone de résidence des 6 cas + campement 7ème cas

Cas groupés d'IIM B en Seine-Maritime 30/04/2003-30/04/2004

- **33 cas d'IIM, incidence 2,8 / 100 000 habitants**
- **20 cas de séro groupe B (61%)**
- **12 / 16 souches de B typées sont de B 14:P1,7,16 (ET5)**
- **Bassin d'habitation de Dieppe (53 000 habitants) :**
 - **11 cas B, incidence : 17,5 / 100 000**
 - **9 cas B 14:P1,7,16 : incidence 14,3 / 100 000**

Conclusion

- En 2003, stabilité du nombre de cas confirmés biologiquement par rapport à 2002
- Diminution des cas de sérogroupe C
- Diminution de la létalité
- 2 foyers d'hyper-endémie dus à une même souche de sérogroupe B