



NOTE

D'après des renseignements communiqués à l'O.M.S., une épidémie de **fièvre jaune** sévit au **Nigeria** depuis la fin du mois d'octobre 1986, où des cas ont été dépistés aux alentours de Makurdi, dans l'État de Benue. A la fin du mois de novembre 1986, 3 000 cas et 300 décès avaient été enregistrés dans l'État de Benue, mais des informations plus récentes font

état d'une extension de l'épidémie vers le sud, jusqu'à l'État voisin de Cross River où se seraient produits, jusqu'à présent, 160 décès supplémentaires.

Une campagne de vaccination de masse a été entreprise d'urgence par les autorités sanitaires nationales.

SITUATION EN FRANCE

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE SEPTEMBRE 1986

| | MALADIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------------|------------|------|-----------|-----------|
| | Typhoïde | Dysenterie Sigmoïde | Méningite à méningocoques | Brucellose | Tétanos | Tuberculose | Toxi-infection alimentaire | Hépatite virale | Teigne | Scarlatine | Rougeole | Poliomyélite | Rickettsiose | Diphthérie | Leptospirose | Lèpre | Paludisme | Tularémie | Dysenterie amibienne | Coqueluche | SIDA | Choléra | |
| Alsace | 4 | 1 | | | | 16 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aquitaine | 2 | | | 1 | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Auvergne | | | 4 | | | 11 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourgogne | 3 | | | | | 24 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bretagne | 2 | 2 | 1 | | 2 | 41 | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Centre | 1 | | 4 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Champagne-Ardenne | 2 | 2 | | | 2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corse | | | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franche-Comté | 4 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ile-de-France | 41 | 2 | 2 | | | 273 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 13 | | | | 16 | 18 | |
| Languedoc-Roussillon | 3 | 5 | 3 | 2 | | 10 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Limousin | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lorraine | 8 | 2 | | | | 9 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Midi-Pyrénées | 14 | 1 | 3 | | | 15 | 3 | 18 | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| Nord-Pas-de-Calais | 6 | 1 | 2 | 1 | | 85 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basse-Normandie | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| Haute-Normandie | 2 | | 3 | | | 32 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Pays-de-la-Loire | 4 | | 3 | | | 38 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Picardie | 4 | | | 1 | | 16 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poitou-Charentes | 4 | | | | 3 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 | | 11 | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 18 | 1 |
| Rhône-Alpes | 15 | 3 | 3 | | 1 | 39 | | 5 | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | 2 |
| TOTAL | 140 | 19 | 43 | 8 | 10 | 765 | 13 | 44 | 3 | 7 | | | 16 | 1 | 3 | 1 | 21 | | | 2 | | 41 | 23 |
| Martinique | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guyane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Réunion | | | | | | 6 | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | 9 | |
| TOTAL | | 2 | | | | 7 | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | | | | 9 | | | |

LE POINT SUR...

Rapport du Centre National de Référence du Pneumocoque (1985) Dr GESLIN

Pendant l'année 1985, nous avons poursuivi et développé nos activités antérieures :

- I - Sérotypie du Pneumocoque.
- II - Relevé des sensibilités du Pneumocoque aux antibiotiques.

Ces activités (I et II), réalisées les années antérieures, se sont amplifiées et coordonnées à la demande du Ministère pour la deuxième année sous la forme d'un « Réseau de Surveillance nationale perma-

nent des infections à Pneumocoque » mis en place au début de l'année 1984 avec la collaboration du G. E. E. P.

- III - Recherche des antigènes pneumococciques dans les produits pathologiques.
- IV - Constitution d'une collection complète de souches couvrant l'ensemble des 83 sérotypes pneumococciques.
- V - Titrage des anticorps pneumococciques par la technique ELISA.
- VI - Utilisation d'antisérums pneumococciques préparés sur le lapin pour fabri-

quer des réactifs Latex pneumocoque pour la sérotypie.

SÉROTYPIE DU PNEUMOCOQUE SENSIBILITÉ DU PNEUMOCOQUE AUX ANTIBIOTIQUES

RÉSEAU DE SURVEILLANCE NATIONALE PERMANENT DES INFECTIONS A PNEUMOCOQUE

Ce réseau fait suite à un relevé annuel des souches de pneumocoques responsables